

Tableau 2
Les dix principales causes de décès infantiles, selon le sexe, Canada¹

	Décès									
	2004		2003		2002		2001		2000	
	rang ³	nombre								
Les deux sexes										
Total, toutes les causes de décès infantiles² (A00-Y89)	.	1 775	.	1 765	.	1 762	.	1 739	.	1 737
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	1	412	1	423	1	427	1	436	1	426
Anomalies liées à une brièveté de la gestation et un poids insuffisant à la naissance, non classés ailleurs (P07)	2	252	2	218	2	250	2	194	2	162
Nouveau-né affecté par les complications de la grossesse chez la mère (P01)	3	143	3	120	3	111	3	131	5	86
Nouveau-né affecté par des complications concernant le placenta, le cordon ombilical et les membranes (P02)	4	106	4	98	5	90	5	86	3	124
Syndrome de la mort subite du nourrisson (R95)	5	84	5	96	3	111	4	112	4	121
Hypoxie intra-utérine et asphyxie obstétricale (P20-P21)	6	71	6	82	6	56	6	69	6	65
Nouveau-né affecté par d'autres complications du travail et de l'accouchement (P03)	7	64	8	52	8	45	10	37	11	28
Hémorragies néonatales (P50-P52, P54)	8	53	7	60	7	55	9	47	8	58
Détresse respiratoire du nouveau-né (P22)	9	46	9	44	9	40	8	48	7	59
Infection bactérienne du nouveau-né (P36)	10	31	10	41	10	38	7	58	9	50
	rang ³	pourcentage								
Total, toutes les causes de décès infantiles² (A00-Y89)	.	100,0								
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	1	23,2	1	24,0	1	24,2	1	25,1	1	24,5
Anomalies liées à une brièveté de la gestation et un poids insuffisant à la naissance, non classés ailleurs (P07)	2	14,2	2	12,4	2	14,2	2	11,2	2	9,3
Nouveau-né affecté par les complications de la grossesse chez la mère (P01)	3	8,1	3	6,8	3	6,3	3	7,5	5	5,0
Nouveau-né affecté par des complications concernant le placenta, le cordon ombilical et les membranes (P02)	4	6,0	4	5,6	5	5,1	5	4,9	3	7,1
Syndrome de la mort subite du nourrisson (R95)	5	4,7	5	5,4	3	6,3	4	6,4	4	7,0
Hypoxie intra-utérine et asphyxie obstétricale (P20-P21)	6	4,0	6	4,6	6	3,2	6	4,0	6	3,7
Nouveau-né affecté par d'autres complications du travail et de l'accouchement (P03)	7	3,6	8	2,9	8	2,6	10	2,1	11	1,6
Hémorragies néonatales (P50-P52, P54)	8	3,0	7	3,4	7	3,1	9	2,7	8	3,3
Détresse respiratoire du nouveau-né (P22)	9	2,6	9	2,5	9	2,3	8	2,8	7	3,4
Infection bactérienne du nouveau-né (P36)	10	1,7	10	2,3	10	2,2	7	3,3	9	2,9
	rang ³	taux infantile ^{4,5}								
Total, toutes les causes de décès infantiles² (A00-Y89)	.	526,6	.	526,6	.	535,9	.	521,1	.	529,8
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	1	122,2	1	126,2	1	129,9	1	130,6	1	129,9
Anomalies liées à une brièveté de la gestation et un poids insuffisant à la naissance, non classés ailleurs (P07)	2	74,8	2	65,0	2	76,0	2	58,1	2	49,4
Nouveau-né affecté par les complications de la grossesse chez la mère (P01)	3	42,4	3	35,8	3	33,8	3	39,3	5	26,2
Nouveau-né affecté par des complications concernant le placenta, le cordon ombilical et les membranes (P02)	4	31,4	4	29,2	5	27,4	5	25,8	3	37,8
Syndrome de la mort subite du nourrisson (R95)	5	24,9	5	28,6	3	33,8	4	33,6	4	36,9
Hypoxie intra-utérine et asphyxie obstétricale (P20-P21)	6	21,1	6	24,5	6	17,0	6	20,7	6	19,8
Nouveau-né affecté par d'autres complications du travail et de l'accouchement (P03)	7	19,0	8	15,5	8	13,7	10	11,1	11	8,5
Hémorragies néonatales (P50-P52, P54)	8	15,7	7	17,9	7	16,7	9	14,1	8	17,7
Détresse respiratoire du nouveau-né (P22)	9	13,6	9	13,1	9	12,2	8	14,4	7	18,0
Infection bactérienne du nouveau-né (P36)	10	9,2	10	12,2	10	11,6	7	17,4	9	15,3

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2 – suite

Les dix principales causes de décès infantiles, selon le sexe, Canada 1

	Décès									
	2004		2003		2002		2001		2000	
	rang ³	nombre								
Hommes										
Total, toutes les causes de décès infantiles² (A00-Y89)	.	953	.	983	.	980	.	997	.	986
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	1	203	1	224	1	217	1	246	1	240
Anomalies liées à une brièveté de la gestation et un poids insuffisant à la naissance, non classés ailleurs (P07)	2	121	2	115	2	148	2	119	2	93
Nouveau-né affecté par les complications de la grossesse chez la mère (P01)	3	74	3	77	4	58	3	70	5	46
Nouveau-né affecté par des complications concernant le placenta, le cordon ombilical et les membranes (P02)	4	57	4	61	5	47	5	46	4	68
Syndrome de la mort subite du nourrisson (R95)	4	57	5	59	3	68	4	69	3	71
Hypoxie intra-utérine et asphyxie obstétricale (P20-P21)	6	40	6	50	7	29	7	34	8	35
Nouveau-né affecté par d'autres complications du travail et de l'accouchement (P03)	7	30	9	24	8	24	11	16	11	17
Hémorragies néonatales (P50-P52, P54)	7	30	7	38	6	32	9	29	7	36
Détresse respiratoire du nouveau-né (P22)	9	28	8	28	9	23	8	30	6	39
Maladies de l'appareil circulatoire (I00-I99)	10	16	11	19	13	16	15	11	15	10
Entérocolite nécrosante du nouveau-né (P77)	10	16	12	14	18	7	14	12	18	8
	rang ³	pourcentage								
Total, toutes les causes de décès infantiles² (A00-Y89)	.	100,0								
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	1	21,3	1	22,8	1	22,1	1	24,7	1	24,3
Anomalies liées à une brièveté de la gestation et un poids insuffisant à la naissance, non classés ailleurs (P07)	2	12,7	2	11,7	2	15,1	2	11,9	2	9,4
Nouveau-né affecté par les complications de la grossesse chez la mère (P01)	3	7,8	3	7,8	4	5,9	3	7,0	5	4,7
Nouveau-né affecté par des complications concernant le placenta, le cordon ombilical et les membranes (P02)	4	6,0	4	6,2	5	4,8	5	4,6	4	6,9
Syndrome de la mort subite du nourrisson (R95)	4	6,0	5	6,0	3	6,9	4	6,9	3	7,2
Hypoxie intra-utérine et asphyxie obstétricale (P20-P21)	6	4,2	6	5,1	7	3,0	7	3,4	8	3,5
Nouveau-né affecté par d'autres complications du travail et de l'accouchement (P03)	7	3,1	9	2,4	8	2,4	11	1,6	11	1,7
Hémorragies néonatales (P50-P52, P54)	7	3,1	7	3,9	6	3,3	9	2,9	7	3,7
Détresse respiratoire du nouveau-né (P22)	9	2,9	8	2,8	9	2,3	8	3,0	6	4,0
Maladies de l'appareil circulatoire (I00-I99)	10	1,7	11	1,9	13	1,6	15	1,1	15	1,0
Entérocolite nécrosante du nouveau-né (P77)	10	1,7	12	1,4	18	0,7	14	1,2	18	0,8
	rang ³	taux infantile ^{4,5}								
Total, toutes les causes de décès infantiles² (A00-Y89)	.	550,4	.	572,5	.	580,4	.	582,5	.	585,6
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	1	117,2	1	130,5	1	128,5	1	143,7	1	142,5
Anomalies liées à une brièveté de la gestation et un poids insuffisant à la naissance, non classés ailleurs (P07)	2	69,9	2	67,0	2	87,7	2	69,5	2	55,2
Nouveau-né affecté par les complications de la grossesse chez la mère (P01)	3	42,7	3	44,8	4	34,4	3	40,9	5	27,3
Nouveau-né affecté par des complications concernant le placenta, le cordon ombilical et les membranes (P02)	4	32,9	4	35,5	5	27,8	5	26,9	4	40,4
Syndrome de la mort subite du nourrisson (R95)	4	32,9	5	34,4	3	40,3	4	40,3	3	42,2
Hypoxie intra-utérine et asphyxie obstétricale (P20-P21)	6	23,1	6	29,1	7	17,2	7	19,9	8	20,8
Nouveau-né affecté par d'autres complications du travail et de l'accouchement (P03)	7	17,3	9	14,0	8	14,2	11	9,3	11	10,1
Hémorragies néonatales (P50-P52, P54)	7	17,3	7	22,1	6	19,0	9	16,9	7	21,4
Détresse respiratoire du nouveau-né (P22)	9	16,2	8	16,3	9	13,6	8	17,5	6	23,2
Maladies de l'appareil circulatoire (I00-I99)	10	9,2	11	11,1	13	9,5	15	6,4	15	5,9
Entérocolite nécrosante du nouveau-né (P77)	10	9,2	12	8,2	18	4,1	14	7,0	18	4,8

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2 – suite

Les dix principales causes de décès infantiles, selon le sexe, Canada 1

	Décès									
	2004		2003		2002		2001		2000	
	rang ³	nombre								
Femmes										
Total, toutes les causes de décès infantiles 2 (A00-Y89)	.	822	.	782	.	782	.	742	.	751
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	1	209	1	199	1	210	1	190	1	186
Anomalies liées à une brièveté de la gestation et un poids insuffisant à la naissance, non classés ailleurs (P07)	2	131	2	103	2	102	2	75	2	69
Nouveau-né affecté par les complications de la grossesse chez la mère (P01)	3	69	3	43	3	53	3	61	5	40
Nouveau-né affecté par des complications concernant le placenta, le cordon ombilical et les membranes (P02)	4	49	4	37	4	43	5	40	3	56
Nouveau-né affecté par d'autres complications du travail et de l'accouchement (P03)	5	34	7	28	8	21	7	21	12	11
Hypoxie intra-utérine et asphyxie obstétricale (P20-P21)	6	31	6	32	6	27	6	35	6	30
Syndrome de la mort subite du nourrisson (R95)	7	27	4	37	4	43	4	43	4	50
Hémorragies néonatales (P50-P52, P54)	8	23	8	22	7	23	9	18	8	22
Détresse respiratoire du nouveau-né (P22)	9	18	11	17	9	17	9	18	9	20
Infection bactérienne du nouveau-né (P36)	9	18	9	17	10	15	7	21	7	25
	rang ³	pourcentage								
Total, toutes les causes de décès infantiles 2 (A00-Y89)	.	100,0								
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	1	25,4	1	25,4	1	26,9	1	25,6	1	24,8
Anomalies liées à une brièveté de la gestation et un poids insuffisant à la naissance, non classés ailleurs (P07)	2	15,9	2	13,2	2	13,0	2	10,1	2	9,2
Nouveau-né affecté par les complications de la grossesse chez la mère (P01)	3	8,4	3	5,5	3	6,8	3	8,2	5	5,3
Nouveau-né affecté par des complications concernant le placenta, le cordon ombilical et les membranes (P02)	4	6,0	4	4,7	4	5,5	5	5,4	3	7,5
Nouveau-né affecté par d'autres complications du travail et de l'accouchement (P03)	5	4,1	7	3,6	8	2,7	7	2,8	12	1,5
Hypoxie intra-utérine et asphyxie obstétricale (P20-P21)	6	3,8	6	4,1	6	3,5	6	4,7	6	4,0
Syndrome de la mort subite du nourrisson (R95)	7	3,3	4	4,7	4	5,5	4	5,8	4	6,7
Hémorragies néonatales (P50-P52, P54)	8	2,8	8	2,8	7	2,9	9	2,4	8	2,9
Détresse respiratoire du nouveau-né (P22)	9	2,2	11	2,0	9	2,2	9	2,4	9	2,7
Infection bactérienne du nouveau-né (P36)	9	2,2	9	2,2	10	1,9	7	2,8	7	3,3
	rang ³	taux infantile ^{4,5}								
Total, toutes les causes de décès infantiles 2 (A00-Y89)	.	501,5	.	478,3	.	488,9	.	456,4	.	470,9
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	1	127,5	1	121,7	1	131,3	1	116,9	1	116,6
Anomalies liées à une brièveté de la gestation et un poids insuffisant à la naissance, non classés ailleurs (P07)	2	79,9	2	63,0	2	63,8	2	46,1	2	43,3
Nouveau-né affecté par les complications de la grossesse chez la mère (P01)	3	42,1	3	26,3	3	33,1	3	37,5	5	25,1
Nouveau-né affecté par des complications concernant le placenta, le cordon ombilical et les membranes (P02)	4	29,9	4	22,6	4	26,9	5	24,6	3	35,1
Nouveau-né affecté par d'autres complications du travail et de l'accouchement (P03)	5	20,7	7	17,1	8	13,1	7	12,9	12	6,9
Hypoxie intra-utérine et asphyxie obstétricale (P20-P21)	6	18,9	6	19,6	6	16,9	6	21,5	6	18,8
Syndrome de la mort subite du nourrisson (R95)	7	16,5	4	22,6	4	26,9	4	26,4	4	31,4
Hémorragies néonatales (P50-P52, P54)	8	14,0	8	13,5	7	14,4	9	11,1	8	13,8
Détresse respiratoire du nouveau-né (P22)	9	11,0	11	9,8	9	10,6	9	11,1	9	12,5
Infection bactérienne du nouveau-né (P36)	9	11,0	9	10,4	10	9,4	7	12,9	7	15,7

1. La répartition géographique des décès dans ce tableau est fondée sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée. Les chiffres dans ce tableau excluent les décès de non-résidents du Canada.
2. Un décès infantile est le décès d'un enfant âgé de moins d'un an.
3. Le classement des principales causes de décès est fondé sur le nombre de décès infantiles.
4. Le taux de mortalité infantile est le nombre de décès d'enfants de moins d'un an pendant une année donnée pour 100 000 naissances vivantes pendant la même année.
5. Le calcul des taux de mortalité dans ce tableau utilise les naissances vivantes de l'année civile comme dénominateur (voir la publication « Naissances » numéro 84F0210XIF au catalogue).

Note(s) : Voir les sections « Introduction », « Glossaire » et « Définitions, sources de données et méthodes ».

Source(s) : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Base de données sur les décès (Tableau CANSIM 102-0562).