

Tableau 1-2

Les dix principales causes de décès, selon certains groupes d'âge et le sexe, Canada¹ — 1 à 14 ans²

	Décès									
	2007		2006		2005		2004		2003	
	rang ³	nombre								
Les deux sexes										
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	...	754	...	757	...	791	...	740	...	811
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	1	219	1	206	1	233	1	229	1	265
Tumeurs malignes (C00-C97)	2	131	2	121	2	116	2	133	2	114
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	3	63	3	57	3	68	3	65	3	67
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	4	33	4	31	4	44	4	28	5	27
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	5	27	6	27	5	31	5	26	4	31
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	6	19	5	28	6	22	6	24	7	20
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	7	14	7	15	7	17	7	9	6	25
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	8	12	8	13	9	7	7	9	8	16
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	9	10	11	5	10	6	11	4	10	9
Septicémie (A40-A41)	10	8	9	9	11	5	10	6	10	9
	rang ³	pourcentage								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	...	100,0								
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	1	29,0	1	27,2	1	29,5	1	30,9	1	32,7
Tumeurs malignes (C00-C97)	2	17,4	2	16,0	2	14,7	2	18,0	2	14,1
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	3	8,4	3	7,5	3	8,6	3	8,8	3	8,3
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	4	4,4	4	4,1	4	5,6	4	3,8	5	3,3
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	5	3,6	6	3,6	5	3,9	5	3,5	4	3,8
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	6	2,5	5	3,7	6	2,8	6	3,2	7	2,5
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	7	1,9	7	2,0	7	2,1	7	1,2	6	3,1
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	8	1,6	8	1,7	9	0,9	7	1,2	8	2,0
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	9	1,3	11	0,7	10	0,8	11	0,5	10	1,1
Septicémie (A40-A41)	10	1,1	9	1,2	11	0,6	10	0,8	10	1,1
	rang ³	taux par âge ⁴								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	...	14,4	...	14,3	...	14,8	...	13,7	...	14,9
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	1	4,2	1	3,9	1	4,4	1	4,2	1	4,9
Tumeurs malignes (C00-C97)	2	2,5	2	2,3	2	2,2	2	2,5	2	2,1
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	3	1,2	3	1,1	3	1,3	3	1,2	3	1,2
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	4	0,6	4	0,6	4	0,8	4	0,5	5	0,5
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	5	0,5	6	0,5	5	0,6	5	0,5	4	0,6
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	6	0,4	5	0,5	6	0,4	6	0,4	7	0,4
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	7	0,3	7	0,3	7	0,3	7	0,2	6	0,5
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	8	0,2	8	0,2	9	0,1	7	0,2	8	0,3
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	9	0,2	11	0,1	10	0,1	11	0,1	10	0,2
Septicémie (A40-A41)	10	0,2	9	0,2	11	0,1	10	0,1	10	0,2

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-2 – suite

Les dix principales causes de décès, selon certains groupes d'âge et le sexe, Canada 1 — 1 à 14 ans²

	Décès									
	2007		2006		2005		2004		2003	
	rang ³	nombre								
Hommes										
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	...	418	...	434	...	476	...	437	...	483
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	1	125	1	136	1	146	1	158	1	166
Tumeurs malignes (C00-C97)	2	70	2	73	2	64	2	70	2	75
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	3	34	3	28	3	36	3	40	3	35
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	4	18	5	13	5	19	4	17	5	19
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	5	13	5	13	6	13	6	12	6	11
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	6	12	4	14	4	21	5	16	4	21
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	7	7	7	7	7	9	7	7	6	11
Septicémie (A40-A41)	8	5	9	4	10	4	8	3	13	3
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	8	5	8	6	8	7	8	3	8	7
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	10	4	9	4	9	6	15	1	21	0
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	10	4	20	0	13	3	15	1	13	3
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	10	4	16	1	13	3	11	2	12	4
	rang ³	pourcentage								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	...	100,0								
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	1	29,9	1	31,3	1	30,7	1	36,2	1	34,4
Tumeurs malignes (C00-C97)	2	16,7	2	16,8	2	13,4	2	16,0	2	15,5
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	3	8,1	3	6,5	3	7,6	3	9,2	3	7,2
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	4	4,3	5	3,0	5	4,0	4	3,9	5	3,9
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	5	3,1	5	3,0	6	2,7	6	2,7	6	2,3
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	6	2,9	4	3,2	4	4,4	5	3,7	4	4,3
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	7	1,7	7	1,6	7	1,9	7	1,6	6	2,3
Septicémie (A40-A41)	8	1,2	9	0,9	10	0,8	8	0,7	13	0,6
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	8	1,2	8	1,4	8	1,5	8	0,7	8	1,4
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	10	1,0	9	0,9	9	1,3	15	0,2	21	0,0
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	10	1,0	20	0,0	13	0,6	15	0,2	13	0,6
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	10	1,0	16	0,2	13	0,6	11	0,5	12	0,8
	rang ³	taux par âge ⁴								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	...	15,5	...	16,0	...	17,4	...	15,8	...	17,3
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	1	4,6	1	5,0	1	5,3	1	5,7	1	6,0
Tumeurs malignes (C00-C97)	2	2,6	2	2,7	2	2,3	2	2,5	2	2,7
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	3	1,3	3	1,0	3	1,3	3	1,4	3	1,3
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	4	0,7	5	0,5	5	0,7	4	0,6	5	0,7
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	5	0,5	5	0,5	6	0,5	6	0,4	6	0,4
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	6	0,4	4	0,5	4	0,8	5	0,6	4	0,8
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	7	0,3	7	0,3	7	0,3	7	0,3	6	0,4
Septicémie (A40-A41)	8	0,2	9	0,1	10	0,1	8	0,1	13	0,1
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	8	0,2	8	0,2	8	0,3	8	0,1	8	0,3
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	10	0,1	9	0,1	9	0,2	15	0,0	21	0,0
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	10	0,1	20	0,0	13	0,1	15	0,0	13	0,1
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	10	0,1	16	0,0	13	0,1	11	0,1	12	0,1

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-2 – suite

Les dix principales causes de décès, selon certains groupes d'âge et le sexe, Canada 1 — 1 à 14 ans²

	Décès									
	2007		2006		2005		2004		2003	
	rang ³	nombre								
Femmes										
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	...	336	...	323	...	315	...	303	...	328
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	1	94	1	70	1	87	1	71	1	99
Tumeurs malignes (C00-C97)	2	61	2	48	2	52	2	63	2	39
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	3	29	3	29	3	32	3	25	3	32
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	4	15	6	13	5	10	6	10	5	10
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	4	15	4	18	4	25	5	11	8	8
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	6	7	8	7	17	0	7	6	6	9
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	6	7	7	8	7	8	12	2	4	14
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	8	6	10	4	9	3	12	2	10	5
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	8	6	5	15	6	9	4	12	6	9
Septicémie (A40-A41)	10	3	9	5	11	1	9	3	9	6
	rang ³	pourcentage								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	...	100,0								
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	1	28,0	1	21,7	1	27,6	1	23,4	1	30,2
Tumeurs malignes (C00-C97)	2	18,2	2	14,9	2	16,5	2	20,8	2	11,9
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	3	8,6	3	9,0	3	10,2	3	8,3	3	9,8
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	4	4,5	6	4,0	5	3,2	6	3,3	5	3,0
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	4	4,5	4	5,6	4	7,9	5	3,6	8	2,4
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	6	2,1	8	2,2	17	0,0	7	2,0	6	2,7
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	6	2,1	7	2,5	7	2,5	12	0,7	4	4,3
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	8	1,8	10	1,2	9	1,0	12	0,7	10	1,5
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	8	1,8	5	4,6	6	2,9	4	4,0	6	2,7
Septicémie (A40-A41)	10	0,9	9	1,5	11	0,3	9	1,0	9	1,8
	rang ³	taux par âge ⁴								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	...	13,2	...	12,5	...	12,1	...	11,5	...	12,3
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	1	3,7	1	2,7	1	3,3	1	2,7	1	3,7
Tumeurs malignes (C00-C97)	2	2,4	2	1,9	2	2,0	2	2,4	2	1,5
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	3	1,1	3	1,1	3	1,2	3	0,9	3	1,2
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	4	0,6	6	0,5	5	0,4	6	0,4	5	0,4
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	4	0,6	4	0,7	4	1,0	5	0,4	8	0,3
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	6	0,3	8	0,3	17	0,0	7	0,2	6	0,3
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	6	0,3	7	0,3	7	0,3	12	0,1	4	0,5
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	8	0,2	10	0,2	9	0,1	12	0,1	10	0,2
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	8	0,2	5	0,6	6	0,3	4	0,5	6	0,3
Septicémie (A40-A41)	10	0,1	9	0,2	11	0,0	9	0,1	9	0,2

1. La répartition géographique des décès dans ce tableau est fondée sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée. Les chiffres dans ce tableau excluent les décès de non-résidents du Canada.

2. Pour « Âge au décès, 1 à 14 ans », le calcul du taux de mortalité utilise les estimations de population des 0 à 14 ans moins les naissances vivantes de l'année civile.

3. Le classement des principales causes de décès repose sur le nombre de décès.

4. Le taux de mortalité par âge pour 100 000 personnes utilise comme dénominateur l'estimation de population présentée à l'annexe 3.

Note(s) : Voir les sections « Introduction », « Glossaire » et « Définitions, sources de données et méthodes ».

Source(s) : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Base de données sur les décès (Tableau CANSIM 102-0561).