

Tableau 2
Les dix principales causes de décès infantiles, selon le sexe, Canada¹

	Décès									
	2007		2006		2005		2004		2003	
	rang ³	nombre	rang ³	nombre	rang ³	nombre	rang ³	nombre	rang ³	nombre
Les deux sexes										
Total, toutes les causes de décès infantiles² (A00-Y89)	...	1 881	...	1 771	...	1 863	...	1 775	...	1 765
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	1	408	1	409	1	447	1	412	1	423
Anomalies liées à une brièveté de la gestation et un poids insuffisant à la naissance, non classés ailleurs (P07)	2	249	2	228	2	224	2	252	2	218
Nouveau-né affecté par les complications de la grossesse chez la mère (P01)	3	181	3	147	3	170	3	143	3	120
Syndrome de la mort subite du nourrisson (R95)	4	113	5	106	4	112	5	84	5	96
Nouveau-né affecté par des complications concernant le placenta, le cordon ombilical et les membranes (P02)	5	107	4	131	5	93	4	106	4	98
Hypoxie intra-utérine et asphyxie obstétricale (P20-P21)	6	70	7	50	6	79	6	71	6	82
Hémorragies néonatales (P50-P52, P54)	7	58	6	58	8	53	8	53	7	60
Détresse respiratoire du nouveau-né (P22)	8	38	8	38	9	46	9	46	9	44
Infection bactérienne du nouveau-né (P36)	8	38	10	32	10	37	10	31	10	41
Entérocolite nécrosante du nouveau-né (P77)	10	35	13	21	11	31	12	25	11	31
	rang ³	pourcentage	rang ³	pourcentage	rang ³	pourcentage	rang ³	pourcentage	rang ³	pourcentage
Total, toutes les causes de décès infantiles² (A00-Y89)	...	100,0	...	100,0	...	100,0	...	100,0	...	100,0
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	1	21,7	1	23,1	1	24,0	1	23,2	1	24,0
Anomalies liées à une brièveté de la gestation et un poids insuffisant à la naissance, non classés ailleurs (P07)	2	13,2	2	12,9	2	12,0	2	14,2	2	12,4
Nouveau-né affecté par les complications de la grossesse chez la mère (P01)	3	9,6	3	8,3	3	9,1	3	8,1	3	6,8
Syndrome de la mort subite du nourrisson (R95)	4	6,0	5	6,0	4	6,0	5	4,7	5	5,4
Nouveau-né affecté par des complications concernant le placenta, le cordon ombilical et les membranes (P02)	5	5,7	4	7,4	5	5,0	4	6,0	4	5,6
Hypoxie intra-utérine et asphyxie obstétricale (P20-P21)	6	3,7	7	2,8	6	4,2	6	4,0	6	4,6
Hémorragies néonatales (P50-P52, P54)	7	3,1	6	3,3	8	2,8	8	3,0	7	3,4
Détresse respiratoire du nouveau-né (P22)	8	2,0	8	2,1	9	2,5	9	2,6	9	2,5
Infection bactérienne du nouveau-né (P36)	8	2,0	10	1,8	10	2,0	10	1,7	10	2,3
Entérocolite nécrosante du nouveau-né (P77)	10	1,9	13	1,2	11	1,7	12	1,4	11	1,8
	rang ³	taux infantile ^{4,5}	rang ³	taux infantile ^{4,5}	rang ³	taux infantile ^{4,5}	rang ³	taux infantile ^{4,5}	rang ³	taux infantile ^{4,5}
Total, toutes les causes de décès infantiles² (A00-Y89)	...	511,3	...	499,4	...	544,5	...	526,6	...	526,6
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	1	110,9	1	115,3	1	130,6	1	122,2	1	126,2
Anomalies liées à une brièveté de la gestation et un poids insuffisant à la naissance, non classés ailleurs (P07)	2	67,7	2	64,3	2	65,5	2	74,8	2	65,0
Nouveau-né affecté par les complications de la grossesse chez la mère (P01)	3	49,2	3	41,5	3	49,7	3	42,4	3	35,8
Syndrome de la mort subite du nourrisson (R95)	4	30,7	5	29,9	4	32,7	5	24,9	5	28,6
Nouveau-né affecté par des complications concernant le placenta, le cordon ombilical et les membranes (P02)	5	29,1	4	36,9	5	27,2	4	31,4	4	29,2
Hypoxie intra-utérine et asphyxie obstétricale (P20-P21)	6	19,0	7	14,1	6	23,1	6	21,1	6	24,5
Hémorragies néonatales (P50-P52, P54)	7	15,8	6	16,4	8	15,5	8	15,7	7	17,9
Détresse respiratoire du nouveau-né (P22)	8	10,3	8	10,7	9	13,4	9	13,6	9	13,1
Infection bactérienne du nouveau-né (P36)	8	10,3	10	9,0	10	10,8	10	9,2	10	12,2
Entérocolite nécrosante du nouveau-né (P77)	10	9,5	13	5,9	11	9,1	12	7,4	11	9,2

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2 – suite

Les dix principales causes de décès infantiles, selon le sexe, Canada 1

	Décès									
	2007		2006		2005		2004		2003	
	rang ³	nombre	rang ³	nombre	rang ³	nombre	rang ³	nombre	rang ³	nombre
Hommes										
Total, toutes les causes de décès infantiles² (A00-Y89)	...	1 043	...	983	...	1 030	...	953	...	983
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	1	224	1	222	1	241	1	203	1	224
Anomalies liées à une brièveté de la gestation et un poids insuffisant à la naissance, non classés ailleurs (P07)	2	125	2	122	2	114	2	121	2	115
Nouveau-né affecté par les complications de la grossesse chez la mère (P01)	3	116	3	81	3	93	3	74	3	77
Syndrome de la mort subite du nourrisson (R95)	4	65	4	70	4	72	4	57	5	59
Nouveau-né affecté par des complications concernant le placenta, le cordon ombilical et les membranes (P02)	5	53	5	63	5	55	4	57	4	61
Hypoxie intra-utérine et asphyxie obstétricale (P20-P21)	6	45	7	32	6	42	6	40	6	50
Hémorragies néonatales (P50-P52, P54)	7	33	6	35	7	29	7	30	7	38
Détresse respiratoire du nouveau-né (P22)	8	24	8	22	10	22	9	28	8	28
Infection bactérienne du nouveau-né (P36)	9	20	9	19	9	25	13	13	9	24
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59)	9	20	10	16	13	14	14	12	13	13
	rang ³	pourcentage	rang ³	pourcentage	rang ³	pourcentage	rang ³	pourcentage	rang ³	pourcentage
Total, toutes les causes de décès infantiles² (A00-Y89)	...	100,0	...	100,0	...	100,0	...	100,0	...	100,0
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	1	21,5	1	22,6	1	23,4	1	21,3	1	22,8
Anomalies liées à une brièveté de la gestation et un poids insuffisant à la naissance, non classés ailleurs (P07)	2	12,0	2	12,4	2	11,1	2	12,7	2	11,7
Nouveau-né affecté par les complications de la grossesse chez la mère (P01)	3	11,1	3	8,2	3	9,0	3	7,8	3	7,8
Syndrome de la mort subite du nourrisson (R95)	4	6,2	4	7,1	4	7,0	4	6,0	5	6,0
Nouveau-né affecté par des complications concernant le placenta, le cordon ombilical et les membranes (P02)	5	5,1	5	6,4	5	5,3	4	6,0	4	6,2
Hypoxie intra-utérine et asphyxie obstétricale (P20-P21)	6	4,3	7	3,3	6	4,1	6	4,2	6	5,1
Hémorragies néonatales (P50-P52, P54)	7	3,2	6	3,6	7	2,8	7	3,1	7	3,9
Détresse respiratoire du nouveau-né (P22)	8	2,3	8	2,2	10	2,1	9	2,9	8	2,8
Infection bactérienne du nouveau-né (P36)	9	1,9	9	1,9	9	2,4	13	1,4	9	2,4
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59)	9	1,9	10	1,6	13	1,4	14	1,3	13	1,3
	rang ³	taux infantile ^{4,5}	rang ³	taux infantile ^{4,5}	rang ³	taux infantile ^{4,5}	rang ³	taux infantile ^{4,5}	rang ³	taux infantile ^{4,5}
Total, toutes les causes de décès infantiles² (A00-Y89)	...	553,8	...	539,4	...	587,3	...	550,4	...	572,5
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	1	118,9	1	121,8	1	137,4	1	117,2	1	130,5
Anomalies liées à une brièveté de la gestation et un poids insuffisant à la naissance, non classés ailleurs (P07)	2	66,4	2	66,9	2	65,0	2	69,9	2	67,0
Nouveau-né affecté par les complications de la grossesse chez la mère (P01)	3	61,6	3	44,4	3	53,0	3	42,7	3	44,8
Syndrome de la mort subite du nourrisson (R95)	4	34,5	4	38,4	4	41,1	4	32,9	5	34,4
Nouveau-né affecté par des complications concernant le placenta, le cordon ombilical et les membranes (P02)	5	28,1	5	34,6	5	31,4	4	32,9	4	35,5
Hypoxie intra-utérine et asphyxie obstétricale (P20-P21)	6	23,9	7	17,6	6	23,9	6	23,1	6	29,1
Hémorragies néonatales (P50-P52, P54)	7	17,5	6	19,2	7	16,5	7	17,3	7	22,1
Détresse respiratoire du nouveau-né (P22)	8	12,7	8	12,1	10	12,5	9	16,2	8	16,3
Infection bactérienne du nouveau-né (P36)	9	10,6	9	10,4	9	14,3	13	7,5	9	14,0
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59)	9	10,6	10	8,8	13	8,0	14	6,9	13	7,6

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2 – suite

Les dix principales causes de décès infantiles, selon le sexe, Canada 1

	Décès									
	2007		2006		2005		2004		2003	
	rang ³	nombre	rang ³	nombre	rang ³	nombre	rang ³	nombre	rang ³	nombre
Femmes										
Total, toutes les causes de décès infantiles² (A00-Y89)	...	838	...	788	...	833	...	822	...	782
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	1	184	1	187	1	206	1	209	1	199
Anomalies liées à une brièveté de la gestation et un poids insuffisant à la naissance, non classés ailleurs (P07)	2	124	2	106	2	110	2	131	2	103
Nouveau-né affecté par les complications de la grossesse chez la mère (P01)	3	65	4	66	3	77	3	69	3	43
Nouveau-né affecté par des complications concernant le placenta, le cordon ombilical et les membranes (P02)	4	54	3	68	5	38	4	49	4	37
Syndrome de la mort subite du nourrisson (R95)	5	48	5	36	4	40	7	27	4	37
Hypoxie intra-utérine et asphyxie obstétricale (P20-P21)	6	25	8	18	6	37	6	31	6	32
Hémorragies néonatales (P50-P52, P54)	6	25	6	23	8	24	8	23	8	22
Infection bactérienne du nouveau-né (P36)	8	18	11	13	11	12	9	18	9	17
Entérocolite nécrosante du nouveau-né (P77)	8	18	12	12	12	9	13	9	9	17
Détresse respiratoire du nouveau-né (P22)	10	14	9	16	8	24	9	18	11	16
	rang ³	pourcentage	rang ³	pourcentage	rang ³	pourcentage	rang ³	pourcentage	rang ³	pourcentage
Total, toutes les causes de décès infantiles² (A00-Y89)	...	100,0	...	100,0	...	100,0	...	100,0	...	100,0
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	1	22,0	1	23,7	1	24,7	1	25,4	1	25,4
Anomalies liées à une brièveté de la gestation et un poids insuffisant à la naissance, non classés ailleurs (P07)	2	14,8	2	13,5	2	13,2	2	15,9	2	13,2
Nouveau-né affecté par les complications de la grossesse chez la mère (P01)	3	7,8	4	8,4	3	9,2	3	8,4	3	5,5
Nouveau-né affecté par des complications concernant le placenta, le cordon ombilical et les membranes (P02)	4	6,4	3	8,6	5	4,6	4	6,0	4	4,7
Syndrome de la mort subite du nourrisson (R95)	5	5,7	5	4,6	4	4,8	7	3,3	4	4,7
Hypoxie intra-utérine et asphyxie obstétricale (P20-P21)	6	3,0	8	2,3	6	4,4	6	3,8	6	4,1
Hémorragies néonatales (P50-P52, P54)	6	3,0	6	2,9	8	2,9	8	2,8	8	2,8
Infection bactérienne du nouveau-né (P36)	8	2,1	11	1,6	11	1,4	9	2,2	9	2,2
Entérocolite nécrosante du nouveau-né (P77)	8	2,1	12	1,5	12	1,1	13	1,1	9	2,2
Détresse respiratoire du nouveau-né (P22)	10	1,7	9	2,0	8	2,9	9	2,2	11	2,0
	rang ³	taux infantile ^{4,5}	rang ³	taux infantile ^{4,5}	rang ³	taux infantile ^{4,5}	rang ³	taux infantile ^{4,5}	rang ³	taux infantile ^{4,5}
Total, toutes les causes de décès infantiles² (A00-Y89)	...	466,8	...	457,1	...	499,4	...	501,5	...	478,3
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	1	102,5	1	108,5	1	123,5	1	127,5	1	121,7
Anomalies liées à une brièveté de la gestation et un poids insuffisant à la naissance, non classés ailleurs (P07)	2	69,1	2	61,5	2	65,9	2	79,9	2	63,0
Nouveau-né affecté par les complications de la grossesse chez la mère (P01)	3	36,2	4	38,3	3	46,2	3	42,1	3	26,3
Nouveau-né affecté par des complications concernant le placenta, le cordon ombilical et les membranes (P02)	4	30,1	3	39,4	5	22,8	4	29,9	4	22,6
Syndrome de la mort subite du nourrisson (R95)	5	26,7	5	20,9	4	24,0	7	16,5	4	22,6
Hypoxie intra-utérine et asphyxie obstétricale (P20-P21)	6	13,9	8	10,4	6	22,2	6	18,9	6	19,6
Hémorragies néonatales (P50-P52, P54)	6	13,9	6	13,3	8	14,4	8	14,0	8	13,5
Infection bactérienne du nouveau-né (P36)	8	10,0	11	7,5	11	7,2	9	11,0	9	10,4
Entérocolite nécrosante du nouveau-né (P77)	8	10,0	12	7,0	12	5,4	13	5,5	9	10,4
Détresse respiratoire du nouveau-né (P22)	10	7,8	9	9,3	8	14,4	9	11,0	11	9,8

- La répartition géographique des décès dans ce tableau est fondée sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée. Les chiffres dans ce tableau excluent les décès de non-résidents du Canada.
- Un décès infantile est le décès d'un enfant âgé de moins d'un an.
- Le classement des principales causes de décès est fondé sur le nombre de décès infantiles.
- Le taux de mortalité infantile est le nombre de décès d'enfants de moins d'un an pendant une année donnée pour 100 000 naissances vivantes pendant la même année.
- Le calcul des taux de mortalité dans ce tableau utilise les naissances vivantes de l'année civile comme dénominateur (voir la publication « Naissances » numéro 84F0210XIF au catalogue).

Note(s) : Voir les sections « Introduction », « Glossaire » et « Définitions, sources de données et méthodes ».

Source(s) : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Base de données sur les décès (Tableau CANSIM 102-0562).