

Tableau 2-15

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 65 à 69 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)^{7, 8, 9}	17 561	10 721	6 840	1 248,2	1 573,0	943,1
Infections à la salmonelle (A01-A02)	1	1	0	0,1	0,1	0,0
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	58	32	26	4,1	4,7	3,6
Tuberculose (A16-A19)	4	2	2	0,3	0,3	0,3
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	3	2	1	0,2	0,3	0,1
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	1	0	1	0,1	0,0	0,1
Coqueluche (A37)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infection à méningocoques (A39)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Septicémie (A40-A41)	159	89	70	11,3	13,1	9,7
Syphilis (A50-A53)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	32	18	14	2,3	2,6	1,9
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	6	6	0	0,4	0,9	0,0
Paludisme (B50-B54)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ¹⁰	41	21	20	2,9	3,1	2,8
Tumeurs malignes (C00-C97)	8 294	4 739	3 555	589,5	695,3	490,1
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	117	85	32	8,3	12,5	4,4
Tumeur maligne de l'oesophage (C15)	257	206	51	18,3	30,2	7,0
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	191	139	52	13,6	20,4	7,2
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	824	512	312	58,6	75,1	43,0
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	232	166	66	16,5	24,4	9,1
Tumeur maligne du pancréas (C25)	473	285	188	33,6	41,8	25,9
Tumeur maligne du larynx (C32)	63	57	6	4,5	8,4	0,8
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	2 813	1 619	1 194	199,9	237,5	164,6
Mélanome malin de la peau (C43)	121	83	38	8,6	12,2	5,2
Tumeur maligne du sein (C50)	505	6	499	35,9	0,9	68,8
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	32	4,4
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	114	15,7
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	185	25,5
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	280	41,1	...
Tumeurs malignes du rein et du bassinnet du rein (C64-C65)	160	114	46	11,4	16,7	6,3
Tumeur maligne de la vessie (C67)	158	120	38	11,2	17,6	5,2
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	215	135	80	15,3	19,8	11,0
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	700	427	273	49,8	62,6	37,6
Maladie de Hodgkin (C81)	18	7	11	1,3	1,0	1,5
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	294	180	114	20,9	26,4	15,7
Leucémie (C91-C95)	222	142	80	15,8	20,8	11,0
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	165	97	68	11,7	14,2	9,4
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	1	1	0	0,1	0,1	0,0

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-15 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 65 à 69 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	854	505	349	60,7	74,1	48,1
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	104	59	45	7,4	8,7	6,2
Anémies (D50-D64)	21	15	6	1,5	2,2	0,8
Diabète sucré (E10-E14)	604	394	210	42,9	57,8	29,0
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	8	6	2	0,6	0,9	0,3
Malnutrition (E40-E46)	8	6	2	0,6	0,9	0,3
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Méningite (G00, G03)	6	3	3	0,4	0,4	0,4
Maladie de Parkinson (G20-G21)	50	31	19	3,6	4,5	2,6
Maladie d'Alzheimer (G30)	81	39	42	5,8	5,7	5,8
Maladies cardiovasculaires graves (I00-I78)	4 171	2 887	1 284	296,5	423,6	177,0
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	3 248	2 329	919	230,9	341,7	126,7
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques (I00-I09)	35	9	26	2,5	1,3	3,6
Cardiopathie hypertensive (I11)	37	23	14	2,6	3,4	1,9
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	3	1	2	0,2	0,1	0,3
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	2 574	1 911	663	183,0	280,4	91,4
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	1 186	877	309	84,3	128,7	42,6
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	79	55	24	5,6	8,1	3,3
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	1 309	979	330	93,0	143,6	45,5
Athérosclérose cardiovasculaire, décrite ainsi (I25.0)	163	126	37	11,6	18,5	5,1
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	1 146	853	293	81,5	125,2	40,4
Autres cardiopathies (I26-I51)	599	385	214	42,6	56,5	29,5
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	10	7	3	0,7	1,0	0,4
Maladies du péricarde et myocardite aiguë (I30-I31, I40)	6	3	3	0,4	0,4	0,4
Insuffisance cardiaque (I50)	143	87	56	10,2	12,8	7,7
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	440	288	152	31,3	42,3	21,0
Hypertension essentielle et néphropathie hypertensive (I10, I12, I15)	64	42	22	4,5	6,2	3,0
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	656	374	282	46,6	54,9	38,9
Athérosclérose (I70)	27	19	8	1,9	2,8	1,1
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	176	123	53	12,5	18,0	7,3
Anévrisme aortique et dissection (I71)	115	91	24	8,2	13,4	3,3
Autres maladies des artères, des artérioles et des capillaires (I72-I78)	61	32	29	4,3	4,7	4,0
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	34	21	13	2,4	3,1	1,8
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	191	105	86	13,6	15,4	11,9
Grippe (J09-J11)	28	13	15	2,0	1,9	2,1
Pneumopathie (J12-J18)	163	92	71	11,6	13,5	9,8
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	2	1	1	0,1	0,1	0,1
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	1	1	0	0,1	0,1	0,0
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	1	0	1	0,1	0,0	0,1
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	821	462	359	58,4	67,8	49,5
Bronchite, chronique et non précisée (J40-J42)	8	3	5	0,6	0,4	0,7
Emphysème (J43)	70	43	27	5,0	6,3	3,7
Asthme (J45-J46)	13	5	8	0,9	0,7	1,1
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	730	411	319	51,9	60,3	44,0
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	7	7	0	0,5	1,0	0,0

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-15 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 65 à 69 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	62	32	30	4,4	4,7	4,1
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	213	151	62	15,1	22,2	8,5
Ulcère gastro-duodénal (K25-K28)	31	17	14	2,2	2,5	1,9
Maladies de l'appendice (K35-K38)	6	3	3	0,4	0,4	0,4
Hernies (K40-K46)	17	9	8	1,2	1,3	1,1
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	341	248	93	24,2	36,4	12,8
Maladie alcoolique du foie (K70)	183	149	34	13,0	21,9	4,7
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie (K73-K74)	158	99	59	11,2	14,5	8,1
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	20	12	8	1,4	1,8	1,1
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	165	98	67	11,7	14,4	9,2
Syndrome néphritique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	14	11	3	1,0	1,6	0,4
Insuffisance rénale (N17-N19)	151	87	64	10,7	12,8	8,8
Autres maladies des reins (N25, N27)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	5	3	2	0,4	0,4	0,3
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	3	0,4	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	2	0,3
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	0	0,0
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	0	0,0
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	0	0,0
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	21	12	9	1,5	1,8	1,2
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	83	47	36	5,9	6,9	5,0
Toutes autres maladies (résiduel) ¹¹	1 343	764	579	95,5	112,1	79,8
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	366	243	123	26,0	35,7	17,0
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	88	60	28	6,3	8,8	3,9
Accidents de véhicule à moteur ¹²	74	46	28	5,3	6,7	3,9
Autres accidents de transport terrestre ¹³	7	7	0	0,5	1,0	0,0
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	7	7	0	0,5	1,0	0,0
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	278	183	95	19,8	26,8	13,1
Chutes (W00-W19)	138	87	51	9,8	12,8	7,0
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	1	1	0	0,1	0,1	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	15	11	4	1,1	1,6	0,6
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	10	6	4	0,7	0,9	0,6

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-15 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 65 à 69 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	49	34	15	3,5	5,0	2,1
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	65	44	21	4,6	6,5	2,9
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	138	112	26	9,8	16,4	3,6
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	38	36	2	2,7	5,3	0,3
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	100	76	24	7,1	11,2	3,3
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	11	6	5	0,8	0,9	0,7
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	3	2	1	0,2	0,3	0,1
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	8	4	4	0,6	0,6	0,6
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	23	16	7	1,6	2,3	1,0
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	2	2	0	0,1	0,3	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	21	14	7	1,5	2,1	1,0
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	16	7	9	1,1	1,0	1,2

1. Le nombre de décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
2. Âge au dernier anniversaire précédant le décès.
3. Pour « Âge au décès, moins d'un an », le taux de mortalité utilise les naissances vivantes de l'année civile.
4. Pour « Âge au décès, 1 à 4 ans », le taux de mortalité utilise les estimations de population des 0 à 4 ans moins les naissances vivantes de l'année civile.
5. Pour « Âge au décès », chaque groupe d'âge à l'exception de « Tous les âges », le taux de mortalité représente le taux de mortalité par âge ou le nombre de décès dans un groupe d'âge particulier pendant une année donnée pour 100 000 personnes dans le même groupe d'âge au 1er juillet de la même année.
6. À partir de 2005, les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité sont présentées à l'appendice II de la publication « Mortalité : liste sommaire des causes » (numéro 84F0209XIF au catalogue).
7. La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
8. Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)
9. « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics ».
10. Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision, et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
11. Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
12. Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
13. Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.

Note(s) : Voir la section Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.

Source(s) : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès (Tableau CANSIM 102-0551) et l'appendice II.