

N° 84F0209X au catalogue

Mortalité : liste sommaire des causes

2008



Statistique
Canada

Statistics
Canada

Canada

Comment obtenir d'autres renseignements

Pour toute demande de renseignements au sujet de ce produit ou sur l'ensemble des données et des services de Statistique Canada, visiter notre site Web à www.statcan.gc.ca. Vous pouvez également communiquer avec nous par courriel à infostats@statcan.gc.ca ou par téléphone entre 8 h 30 et 16 h 30 du lundi au vendredi aux numéros suivants :

Centre de contact national de Statistique Canada

Numéros sans frais (Canada et États-Unis) :

Service de renseignements	1-800-263-1136
Service national d'appareils de télécommunications pour les malentendants	1-800-363-7629
Télécopieur	1-877-287-4369

Appels locaux ou internationaux :

Service de renseignements	1-613-951-8116
Télécopieur	1-613-951-0581

Programme des services de dépôt

Service de renseignements	1-800-635-7943
Télécopieur	1-800-565-7757

Comment accéder à ce produit

Le produit n° 84F0209X au catalogue est disponible gratuitement sous format électronique. Pour obtenir un exemplaire, il suffit de visiter notre site Web à www.statcan.gc.ca et de parcourir par « Ressource clé » > « Publications ».

Normes de service à la clientèle

Statistique Canada s'engage à fournir à ses clients des services rapides, fiables et courtois. À cet égard, notre organisme s'est doté de *normes de service à la clientèle* que les employés observent. Pour obtenir une copie de ces normes de service, veuillez communiquer avec Statistique Canada au numéro sans frais 1-800-263-1136. Les normes de service sont aussi publiées sur le site www.statcan.gc.ca sous « À propos de nous » > « Notre organisme » > « Offrir des services aux Canadiens ».

Mortalité : liste sommaire des causes

2008

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada

© Ministre de l'Industrie, 2011

Tous droits réservés. Le contenu de la présente publication électronique peut être reproduit en tout ou en partie, et par quelque moyen que ce soit, sans autre permission de Statistique Canada, sous réserve que la reproduction soit effectuée uniquement à des fins d'étude privée, de recherche, de critique, de compte rendu ou en vue d'en préparer un résumé destiné aux journaux et/ou à des fins non commerciales. Statistique Canada doit être cité comme suit : Source (ou « Adapté de », s'il y a lieu) : Statistique Canada, année de publication, nom du produit, numéro au catalogue, volume et numéro, période de référence et page(s). Autrement, il est interdit de reproduire le contenu de la présente publication, ou de l'emmagasiner dans un système d'extraction, ou de le transmettre sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, reproduction électronique, mécanique, photographique, pour quelque fin que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable des Services d'octroi de licences, Division de la gestion de l'information, Statistique Canada, Ottawa, Ontario, Canada K1A 0T6.

Octobre 2011

N° 84F0209X au catalogue

ISSN 1718-3952

Périodicité : annuelle

Ottawa

This publication is also available in English.

Note de reconnaissance

Le succès du système statistique du Canada repose sur un partenariat bien établi entre Statistique Canada et la population, les entreprises, les administrations canadiennes et les autres organismes. Sans cette collaboration et cette bonne volonté, il serait impossible de produire des statistiques précises et actuelles.

Information pour l'utilisateur

Signes conventionnels

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications de Statistique Canada :

- . indisponible pour toute période de référence
- .. indisponible pour une période de référence précise
- ... n'ayant pas lieu de figurer
- 0 zéro absolu ou valeur arrondie à zéro
- 0^s valeur arrondie à 0 (zéro) là où il y a une distinction importante entre le zéro absolu et la valeur arrondie
- p provisoire
- r révisé
- x confidentiel en vertu des dispositions de la *Loi sur la statistique*
- E à utiliser avec prudence
- F trop peu fiable pour être publié
- * valeur significativement différente de l'estimation pour la catégorie de référence ($p < 0,05$)

Remerciements

Statistique Canada tient à manifester sa gratitude envers les provinces et territoires qui nous ont fourni, de leurs registres des statistiques de l'état civil, les données sur la mortalité qui apparaissent dans ce rapport.

Introduction

Cette publication contient des tableaux statistiques qui présentent le nombre de décès selon l'âge, le sexe et la cause initiale de décès regroupée pour le Canada, les provinces et les territoires. Les tableaux incluent aussi les taux de mortalité selon l'âge et les taux de mortalité normalisés selon l'âge (Taux comparatifs de mortalité selon l'âge) pour chaque groupe de causes initiales de décès.

Note aux lecteurs

Le 16 novembre 2011, le tableau suivant a été modifié :
Le tableau explicatif 1-4 pour la Nouvelle-Écosse
Pour de plus amples renseignements, communiquez avec nous infostats@statcan.gc.ca

Note sur le contenu

La cause initiale de décès est classifiée selon la Dixième révision de la Classification internationale des maladies (CIM-10) de 2000 jusqu'à présent. La cause initiale de décès était classifiée selon la Neuvième révision de la Classification internationale de maladies (CIM-9) de 1979 à 1999.

Note sur l'histoire

Ce produit remplace **Mortalité, liste sommaire des causes**, numéro 84F0209XPB au catalogue (publié pour les données de 1997 à 1999) et numéro 84F0209XIB au catalogue (pour les données de 1997).

Publication, parution des données pour 2008

Cette parution de la publication annuelle en HTML et PDF contient des tableaux de données pour l'année 2008.

Données de 2000 à 2008 dans CANSIM, disponibles dès la première parution de la publication

L'accès gratuit aux données de 2000 à 2008 est permis via une interface spéciale de CANSIM. L'accès direct aux tableaux CANSIM se fait de trois façons différentes dans le produit HTML :

Section **Tableaux** :

- Tableaux CANSIM connexes
- Tableaux individuels, dans la Source

Section **Produits connexes** :

- Choisis parmi les tableaux de CANSIM de Statistique Canada

Table des matières

Faits saillants	6
Produits connexes	8
Tableaux statistiques	
1 Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie	12
1-1 Canada	12
1-2 Terre-Neuve-et-Labrador	15
1-3 Île-du-Prince-Édouard	18
1-4 Nouvelle-Écosse	21
1-5 Nouveau-Brunswick	24
1-6 Québec	27
1-7 Ontario	30
1-8 Manitoba	33
1-9 Saskatchewan	36
1-10 Alberta	39
1-11 Colombie-Britannique	42
1-12 Yukon	45
1-13 Territoires du Nord-Ouest	48
1-14 Nunavut	51
2 Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada	54
2-1 Moins d'un an	54
2-2 1 à 4 ans	58
2-3 5 à 9 ans	62
2-4 10 à 14 ans	66
2-5 15 à 19 ans	70
2-6 20 à 24 ans	74
2-7 25 à 29 ans	78
2-8 30 à 34 ans	82
2-9 35 à 39 ans	86
2-10 40 à 44 ans	90
2-11 45 à 49 ans	94
2-12 50 à 54 ans	98
2-13 55 à 59 ans	102

Table des matières – suite

2-14	60 à 64 ans	106
2-15	65 à 69 ans	110
2-16	70 à 74 ans	114
2-17	75 à 79 ans	118
2-18	80 à 84 ans	122
2-19	85 à 89 ans	126
2-20	90 ans et plus	130

Qualité des données, concepts et méthodologie

Définitions	134
Notes explicatives pour les tableaux	137

Appendice

I	Liste sommaire des causes de décès	138
II	Estimations postcensitaires de la population	141

Graphiques

1.	Taux de mortalité normalisé pour le cancer et pour les maladies cardiovasculaires graves, Canada, 2000 à 2008	7
----	---	---

Faits saillants

- En 2008, 70 558 décès au Canada étaient attribuables au cancer, ce qui représente une hausse de 1,4 % par rapport à 2007. Ces décès étaient légèrement plus élevés que les 69 648 décès attribuables aux maladies cardiovasculaires graves.
- Les décès dus aux maladies cardiovasculaires graves ont augmenté de 0,2 % par rapport à l'année précédente.
- Ces deux causes de décès représentaient 59 % de l'ensemble des décès au Canada en 2008.

Tendances pour deux causes de décès, 2000 à 2008

- De 2000 à 2008, les décès attribuables au cancer ont augmenté, alors que les décès attribuables aux maladies cardiovasculaires graves ont décliné de 2000 à 2006.
- L'effet de ces tendances a eu pour conséquence qu'en 2007 les décès causés par le cancer ont dépassé les décès causés par les maladies cardiovasculaires graves.
- Chez les hommes, les décès attribuables au cancer ont dépassé les décès attribuables aux maladies cardiovasculaires graves en 2005.
- Dans le cas des femmes, bien que l'écart ait rétréci entre les décès dus aux maladies cardiovasculaires graves et les décès dus au cancer, les décès attribuables aux maladies cardiovasculaires graves étaient toujours plus nombreux que ceux causés par le cancer en 2008.

Tableau 1
Décès dus au cancer et aux maladies cardiovasculaires graves selon le sexe, Canada, 2000 à 2008

	Les deux sexes		Hommes		Femmes	
	Cancer	Maladies cardiovasculaires graves	Cancer	Maladies cardiovasculaires graves	Cancer	Maladies cardiovasculaires graves
2000	62 672	76 046	33 360	37 914	29 312	38 132
2001	63 774	74 441	34 023	36 912	29 751	37 529
2002	65 103	74 209	34 415	36 605	30 688	37 604
2003	65 990	73 827	34 701	37 004	31 289	36 823
2004	66 947	72 338	35 156	35 847	31 791	36 491
2005	67 343	71 338	35 481	35 198	31 862	36 140
2006	67 807	68 715	35 624	34 214	32 183	34 501
2007	69 595	69 503	36 569	34 508	33 026	34 995
2008	70 558	69 648	37 077	34 739	33 481	34 909

Source(s) : Statistique Canada, tableau CANSIM 102-0551.

Taux de mortalité normalisés selon l'âge pour le cancer et pour les maladies cardiovasculaires graves, 2000 à 2008


- Pour contrôler les effets du vieillissement de la population, les comparaisons dans le temps sont possibles en utilisant le « taux de mortalité normalisé selon l'âge ». Ce taux élimine les effets des différences dans les structures par âge de la population au sein des régions et au fil du temps.

- Depuis 2000, les taux de mortalité normalisés selon l'âge pour le cancer et pour les maladies cardiovasculaires graves ont convergé jusqu'en 2004. En 2005, le taux de mortalité normalisé du cancer a surpassé celui des maladies cardiovasculaires graves.
- L'écart entre les deux causes de décès s'accroît depuis 2005.
- Chez les hommes, le taux de mortalité normalisé du cancer a surpassé celui des maladies cardiovasculaires graves en 2006.
- Dans le cas des femmes, le taux de mortalité normalisé du cancer a dépassé celui des maladies cardiovasculaires graves en 2003.
- En 2008, l'écart entre les taux normalisés de ces deux causes de décès était plus grand chez les femmes que chez les hommes.

Graphique 1

Taux de mortalité normalisé pour le cancer et pour les maladies cardiovasculaires graves, Canada, 2000 à 2008

décès pour 100 000 personnes



Note(s) : Taux de mortalité normalisé selon l'âge d'après une population type (population canadienne de 1991) pour 100 000 personnes.

Source(s) : Statistique Canada, tableau CANSIM 102-0552.

Produits connexes

Choisis parmi les publications de Statistique Canada

82-221-X	Indicateurs de la santé
84-208-X	Causes de décès
84-548-X	Comparabilité de la CIM-10 et de la CIM-9 pour les statistiques de la mortalité au Canada
84F0211X	Décès

Choisis parmi les tableaux de CANSIM de Statistique Canada

102-0521	Décès, selon la cause, Chapitre I : Certaines maladies infectieuses et parasitaires (A00 à B99), le groupe d'âge et le sexe, Canada, annuel
102-0522	Décès, selon la cause, Chapitre II : Tumeurs (C00 à D48), le groupe d'âge et le sexe, Canada, annuel
102-0523	Décès, selon la cause, Chapitre III : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire (D50 à D89), le groupe d'âge et le sexe, Canada, annuel
102-0524	Décès, selon la cause, Chapitre IV : Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (E00 à E90), le groupe d'âge et le sexe, Canada, annuel
102-0525	Décès, selon la cause, Chapitre V : Troubles mentaux et du comportement (F00 à F99), le groupe d'âge et le sexe, Canada, annuel
102-0526	Décès, selon la cause, Chapitre VI : Maladies du système nerveux (G00 à G99), le groupe d'âge et le sexe, Canada, annuel
102-0527	Décès, selon la cause, Chapitre VII : Maladies de l'oeil et de ses annexes (H00 à H59), le groupe d'âge et le sexe, Canada, annuel
102-0528	Décès, selon la cause, Chapitre VIII : Maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde (H60 à H95), le groupe d'âge et le sexe, Canada, annuel
102-0529	Décès, selon la cause, Chapitre IX : Maladies de l'appareil circulatoire (I00 à I99), le groupe d'âge et le sexe, Canada, annuel
102-0530	Décès, selon la cause, Chapitre X : Maladies de l'appareil respiratoire (J00 à J99), le groupe d'âge et le sexe, Canada, annuel
102-0531	Décès, selon la cause, Chapitre XI : Maladies de l'appareil digestif (K00 à K93), le groupe d'âge et le sexe, Canada, annuel

102-0532	Décès, selon la cause, Chapitre XII : Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (L00 à L99), le groupe d'âge et le sexe, Canada, annuel
102-0533	Décès, selon la cause, Chapitre XIII : Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif (M00 à M99), le groupe d'âge et le sexe, Canada, annuel
102-0534	Décès, selon la cause, Chapitre XIV : Maladies de l'appareil génito-urinaire (N00 à N99), le groupe d'âge et le sexe, Canada, annuel
102-0535	Décès, selon la cause, Chapitre XV : Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00 à O99), le groupe d'âge et le sexe, Canada, annuel
102-0536	Décès, selon la cause, Chapitre XVI : Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00 à P96), le groupe d'âge et le sexe, Canada, annuel
102-0537	Décès, selon la cause, Chapitre XVII : Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00 à Q99), le groupe d'âge et le sexe, Canada, annuel
102-0538	Décès, selon la cause, Chapitre XVIII : Symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00 à R99), le groupe d'âge et le sexe, Canada, annuel
102-0540	Décès, selon la cause, Chapitre XX : Causes externes de morbidité et de mortalité (V01 à Y89), le groupe d'âge et le sexe, Canada, annuel
102-0551	Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, annuel
102-0552	Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes et le sexe, Canada, provinces et territoires, annuel

Choisis parmi les enquêtes de Statistique Canada

3231	Statistique de l'état civil - Base de données sur les naissances
3233	Statistique de l'état civil - Base de données sur les décès
3604	Estimations de la population selon l'âge et le sexe pour le Canada, les provinces et les territoires

Choisis parmi les tableaux sommaires de Statistique Canada

- *Taux de mortalité infantile, par province et territoire*
- *Suicides et taux de suicide selon le sexe et l'âge*
- *Espérance de vie à la naissance, selon le sexe, par province*
- *Espérance de vie à la naissance et à 65 ans, selon le sexe et la géographie*
- *Taux de mortalité normalisés, selon certaines causes de décès et le sexe*
- *Principales causes de décès, selon le sexe*

Tableaux statistiques

Tableau 1-1
Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Canada¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)^{3, 4, 5}	238 617	120 426	118 191	716,2	729,0	703,6	531,3	652,6	436,0
Infections à la salmonelle (A01-A02)	7	1	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Shigellose et amibiase (A03, A06)	1	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	1 094	445	649	3,3	2,7	3,9	2,3	2,5	2,1
Tuberculose (A16-A19)	92	52	40	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	70	40	30	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	22	12	10	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
Coqueluche (A37)	1	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	3	2	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infection à méningocoques (A39)	14	7	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Septicémie (A40-A41)	2 135	1 011	1 124	6,4	6,1	6,7	4,7	5,5	4,2
Syphilis (A50-A53)	5	4	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	446	292	154	1,3	1,8	0,9	1,0	1,4	0,7
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	407	313	94	1,2	1,9	0,6	1,1	1,6	0,5
Paludisme (B50-B54)	2	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ⁶	497	241	256	1,5	1,5	1,5	1,2	1,3	1,0
Tumeurs malignes (C00-C97)	70 558	37 077	33 481	211,8	224,5	199,3	163,6	197,0	139,9
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	1 105	749	356	3,3	4,5	2,1	2,6	3,9	1,5
Tumeur maligne de l'oesophage (C15)	1 732	1 357	375	5,2	8,2	2,2	4,0	7,0	1,5
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	1 949	1 164	785	5,9	7,0	4,7	4,5	6,2	3,2
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	7 842	4 254	3 588	23,5	25,8	21,4	17,9	22,5	14,2
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	1 898	1 227	671	5,7	7,4	4,0	4,4	6,4	2,8
Tumeur maligne du pancréas (C25)	3 800	1 897	1 903	11,4	11,5	11,3	8,8	10,0	7,8
Tumeur maligne du larynx (C32)	460	372	88	1,4	2,3	0,5	1,1	2,0	0,4
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	18 704	10 336	8 368	56,1	62,6	49,8	44,2	54,7	36,2
Mélanome malin de la peau (C43)	901	568	333	2,7	3,4	2,0	2,2	3,0	1,5
Tumeur maligne du sein (C50)	5 006	51	4 955	15,0	0,3	29,5	11,5	0,3	20,9
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	361	2,1	1,7
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	794	4,7	3,4
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	1 641	9,8	7,0
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	3 720	22,5	20,3	...
Tumeurs malignes du rein et du bassinnet du rein (C64-C65)	1 680	1 055	625	5,0	6,4	3,7	3,9	5,5	2,6
Tumeur maligne de la vessie (C67)	1 872	1 330	542	5,6	8,1	3,2	4,2	7,2	2,0
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	1 863	1 043	820	5,6	6,3	4,9	4,6	5,5	3,8
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	6 278	3 445	2 833	18,8	20,9	16,9	14,7	18,4	11,8
Maladie de Hodgkin (C81)	101	59	42	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	2 555	1 390	1 165	7,7	8,4	6,9	5,9	7,3	4,8
Leucémie (C91-C95)	2 395	1 360	1 035	7,2	8,2	6,2	5,6	7,4	4,3
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	1 219	629	590	3,7	3,8	3,5	2,8	3,3	2,4
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	8	7	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	8 952	4 509	4 443	26,9	27,3	26,5	20,5	24,2	17,7
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	1 390	719	671	4,2	4,4	4,0	3,1	3,9	2,5
Anémies (D50-D64)	512	184	328	1,5	1,1	2,0	1,1	1,0	1,1
Diabète sucré (E10-E14)	7 521	3 904	3 617	22,6	23,6	21,5	16,7	20,9	13,4
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	239	92	147	0,7	0,6	0,9	0,5	0,5	0,5
Malnutrition (E40-E46)	209	77	132	0,6	0,5	0,8	0,4	0,4	0,4
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	30	15	15	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
Méningite (G00, G03)	55	35	20	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1
Maladie de Parkinson (G20-G21)	1 869	1 048	821	5,6	6,3	4,9	3,9	5,7	2,8
Maladie d'Alzheimer (G30)	6 573	1 967	4 606	19,7	11,9	27,4	12,8	10,8	13,8
Maladies cardiovasculaires graves (I00-I78)	69 648	34 739	34 909	209,1	210,3	207,8	147,3	187,1	115,4
Maladies du coeur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	50 722	26 688	24 034	152,2	161,6	143,1	107,9	143,2	79,7

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-1 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Canada¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies									
rhumatismales chroniques (I00-I09)	476	164	312	1,4	1,0	1,9	1,1	0,9	1,2
Cardiopathie hypertensive (I11)	671	281	390	2,0	1,7	2,3	1,4	1,5	1,3
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	113	45	68	0,3	0,3	0,4	0,2	0,2	0,2
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	36 934	20 567	16 367	110,9	124,5	97,4	79,0	109,6	54,5
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	15 929	9 109	6 820	47,8	55,1	40,6	34,5	48,3	23,4
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	1 001	503	498	3,0	3,0	3,0	2,1	2,6	1,7
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	20 004	10 955	9 049	60,0	66,3	53,9	42,4	58,7	29,5
Athérosclérose cardiovasculaire, décrite ainsi (I25.0)	1 573	964	609	4,7	5,8	3,6	3,5	5,1	2,2
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	18 431	9 991	8 440	55,3	60,5	50,2	38,9	53,7	27,3
Autres cardiopathies (I26-I51)	12 528	5 631	6 897	37,6	34,1	41,1	26,2	30,9	22,5
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	82	41	41	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Maladies du péricarde et myocardite aiguë (I30-I31, I40)	108	70	38	0,3	0,4	0,2	0,3	0,4	0,2
Insuffisance cardiaque (I50)	4 476	1 906	2 570	13,4	11,5	15,3	8,9	10,6	7,7
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	7 862	3 614	4 248	23,6	21,9	25,3	16,8	19,7	14,4
Hypertension essentielle et néphropathie hypertensive (I10, I12, I15)	1 553	576	977	4,7	3,5	5,8	3,1	3,2	3,0
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	13 870	5 650	8 220	41,6	34,2	48,9	28,8	30,8	27,0
Athérosclérose (I70)	850	342	508	2,6	2,1	3,0	1,7	1,9	1,5
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	2 653	1 483	1 170	8,0	9,0	7,0	5,8	8,0	4,2
Anévrisme aortique et dissection (I71)	1 668	1 036	632	5,0	6,3	3,8	3,7	5,6	2,3
Autres maladies des artères, des artérioles et des capillaires (I72-I78)	985	447	538	3,0	2,7	3,2	2,1	2,4	1,9
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	297	121	176	0,9	0,7	1,0	0,7	0,7	0,7
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	5 386	2 471	2 915	16,2	15,0	17,4	11,0	13,7	9,3
Grippe (J09-J11)	272	107	165	0,8	0,6	1,0	0,5	0,6	0,5
Pneumopathie (J12-J18)	5 114	2 364	2 750	15,3	14,3	16,4	10,4	13,1	8,8
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	86	41	45	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	54	25	29	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	32	16	16	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	10 923	5 742	5 181	32,8	34,8	30,8	23,7	31,4	18,9
Bronchite, chronique et non précisée (J40-J42)	123	57	66	0,4	0,3	0,4	0,3	0,3	0,2
Emphysème (J43)	631	354	277	1,9	2,1	1,6	1,4	1,9	1,1
Asthme (J45-J46)	259	83	176	0,8	0,5	1,0	0,6	0,5	0,7
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	9 910	5 248	4 662	29,7	31,8	27,8	21,4	28,7	16,9
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	90	77	13	0,3	0,5	0,1	0,2	0,4	0,1
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	1 629	873	756	4,9	5,3	4,5	3,4	4,8	2,5
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	2 614	1 398	1 216	7,8	8,5	7,2	5,8	7,6	4,6
Ulcère gastro-duodénal (K25-K28)	433	243	190	1,3	1,5	1,1	0,9	1,3	0,7
Maladies de l'appendice (K35-K38)	42	21	21	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Hernies (K40-K46)	294	139	155	0,9	0,8	0,9	0,6	0,8	0,5
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	2 748	1 809	939	8,2	11,0	5,6	6,5	9,1	4,2
Maladie alcoolique du foie (K70)	1 472	1 060	412	4,4	6,4	2,5	3,5	5,2	1,9
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie (K73-K74)	1 276	749	527	3,8	4,5	3,1	3,0	3,9	2,3
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	363	180	183	1,1	1,1	1,1	0,8	1,0	0,6
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	3 846	1 931	1 915	11,5	11,7	11,4	8,0	10,6	6,5
Syndrome néphritique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	20	11	9	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	121	57	64	0,4	0,3	0,4	0,2	0,3	0,2
Insuffisance rénale (N17-N19)	3 702	1 862	1 840	11,1	11,3	11,0	7,7	10,2	6,2
Autres maladies des reins (N25, N27)	3	1	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	117	32	85	0,4	0,2	0,5	0,2	0,2	0,3
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	88	0,5	0,5	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	11	0,1	0,0
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	34	0,2	0,3
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	5	0,0	0,0

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-1 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Canada¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	29	0,2	0,2
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	1 107	598	509	3,3	3,6	3,0	4,2	4,4	4,0
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	893	452	441	2,7	2,7	2,6	2,9	2,9	2,8
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	2 311	1 140	1 171	6,9	6,9	7,0	5,5	6,5	4,4
Toutes autres maladies (résiduel) ⁷	26 797	11 021	15 776	80,4	66,7	93,9	56,7	60,1	53,3
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	10 234	6 105	4 129	30,7	37,0	24,6	25,4	34,8	16,6
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	2 940	2 135	805	8,8	12,9	4,8	8,5	12,6	4,5
Accidents de véhicule à moteur ⁸	2 628	1 863	765	7,9	11,3	4,6	7,6	11,0	4,3
Autres accidents de transport terrestre ⁹	68	58	10	0,2	0,4	0,1	0,2	0,3	0,1
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	244	214	30	0,7	1,3	0,2	0,7	1,2	0,2
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	7 294	3 970	3 324	21,9	24,0	19,8	16,9	22,2	12,0
Chutes (W00-W19)	3 098	1 488	1 610	9,3	9,0	9,6	6,4	8,1	5,1
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	20	20	0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	275	225	50	0,8	1,4	0,3	0,8	1,4	0,3
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	275	163	112	0,8	1,0	0,7	0,8	0,9	0,6
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	1 441	939	502	4,3	5,7	3,0	4,0	5,3	2,6
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	2 185	1 135	1 050	6,6	6,9	6,3	4,8	6,4	3,5
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	3 705	2 777	928	11,1	16,8	5,5	10,4	15,8	5,1
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	518	498	20	1,6	3,0	0,1	1,4	2,7	0,1
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	3 187	2 279	908	9,6	13,8	5,4	9,0	13,1	5,0
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	575	452	123	1,7	2,7	0,7	1,8	2,8	0,8
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	197	175	22	0,6	1,1	0,1	0,7	1,2	0,1
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	378	277	101	1,1	1,7	0,6	1,1	1,6	0,6
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	16	15	1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	690	457	233	2,1	2,8	1,4	1,9	2,6	1,3
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	8	6	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	682	451	231	2,0	2,7	1,4	1,9	2,6	1,3
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	1	1	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	218	108	110	0,7	0,7	0,7	0,5	0,6	0,5

1. La répartition géographique des décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
2. À partir de 2005, les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité sont présentées à l'appendice II de la publication « Mortalité : liste sommaire des causes » (numéro 84F0209XIF au catalogue).
3. La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
4. Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10) « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics ».
5. « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics ».
6. Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
7. Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
8. Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
9. Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.

Note(s) : Voir la section Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.

Source(s) : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès (Tableau CANSIM 102-0552) et l'appendice II.

Tableau 1-2
Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Terre-Neuve-et-Labrador¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)^{3, 4, 5}	4 539	2 315	2 224	896,7	931,8	862,8	661,9	811,2	547,6
Infections à la salmonelle (A01-A02)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	7	3	4	1,4	1,2	1,6	1,1	1,0	1,0
Tuberculose (A16-A19)	3	2	1	0,6	0,8	0,4	0,4	0,7	0,2
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	2	1	1	0,4	0,4	0,4	0,2	0,4	0,2
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	1	1	0	0,2	0,4	0,0	0,2	0,3	0,0
Coqueluche (A37)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infection à méningocoques (A39)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Septicémie (A40-A41)	33	18	15	6,5	7,2	5,8	4,9	6,2	4,2
Syphilis (A50-A53)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	2	1	1	0,4	0,4	0,4	0,3	0,2	0,4
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	1	1	0	0,2	0,4	0,0	0,2	0,4	0,0
Paludisme (B50-B54)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ⁶	6	2	4	1,2	0,8	1,6	1,0	0,7	1,3
Tumeurs malignes (C00-C97)	1 263	702	561	249,5	282,6	217,6	182,2	229,5	149,1
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	18	13	5	3,6	5,2	1,9	2,7	4,1	1,5
Tumeur maligne de l'oesophage (C15)	29	26	3	5,7	10,5	1,2	4,2	8,5	0,7
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	50	29	21	9,9	11,7	8,1	7,1	9,4	5,3
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	145	84	61	28,6	33,8	23,7	20,6	26,3	16,0
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	31	21	10	6,1	8,5	3,9	4,3	5,9	2,8
Tumeur maligne du pancréas (C25)	70	37	33	13,8	14,9	12,8	9,8	11,6	8,7
Tumeur maligne du larynx (C32)	9	7	2	1,8	2,8	0,8	1,4	2,2	0,6
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	311	199	112	61,4	80,1	43,5	45,2	62,6	30,5
Mélanome malin de la peau (C43)	13	9	4	2,6	3,6	1,6	1,9	3,2	0,9
Tumeur maligne du sein (C50)	92	2	90	18,2	0,8	34,9	12,9	0,6	23,5
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	7	2,7	2,2
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	13	5,0	3,6
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	27	10,5	7,3
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	71	28,6	26,2	...
Tumeurs malignes du rein et du bassinnet du rein (C64-C65)	34	18	16	6,7	7,2	6,2	5,1	6,0	4,4
Tumeur maligne de la vessie (C67)	24	17	7	4,7	6,8	2,7	3,4	6,9	1,7
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	40	20	20	7,9	8,1	7,8	5,3	5,4	5,2
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	98	49	49	19,4	19,7	19,0	14,7	16,2	13,6
Maladie de Hodgkin (C81)	2	2	0	0,4	0,8	0,0	0,3	0,7	0,0
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	40	21	19	7,9	8,5	7,4	5,9	7,1	4,8
Leucémie (C91-C95)	34	17	17	6,7	6,8	6,6	5,3	5,5	5,3
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	22	9	13	4,3	3,6	5,0	3,2	3,0	3,5
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	181	100	81	35,8	40,3	31,4	26,4	34,3	20,5
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	41	19	22	8,1	7,6	8,5	5,9	6,6	5,4
Anémies (D50-D64)	15	9	6	3,0	3,6	2,3	2,0	4,0	1,3
Diabète sucré (E10-E14)	246	94	152	48,6	37,8	59,0	34,9	32,2	35,9
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	4	3	1	0,8	1,2	0,4	0,5	1,1	0,2
Malnutrition (E40-E46)	1	1	0	0,2	0,4	0,0	0,1	0,4	0,0
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	3	2	1	0,6	0,8	0,4	0,4	0,7	0,2
Méningite (G00, G03)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladie de Parkinson (G20-G21)	34	20	14	6,7	8,1	5,4	4,9	6,9	3,3
Maladie d'Alzheimer (G30)	118	37	81	23,3	14,9	31,4	16,5	14,7	17,8
Maladies cardiovasculaires graves (I00-I78)	1 468	716	752	290,0	288,2	291,7	207,6	250,9	170,6
Maladies du coeur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	1 019	518	501	201,3	208,5	194,4	143,7	178,9	114,1

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-2 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Terre-Neuve-et-Labrador¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies									
rhumatismales chroniques (I00-I09)	10	3	7	2,0	1,2	2,7	1,5	1,0	2,0
Cardiopathie hypertensive (I11)	22	6	16	4,3	2,4	6,2	3,0	2,2	3,3
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	5	1	4	1,0	0,4	1,6	0,7	0,4	1,0
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	745	419	326	147,2	168,7	126,5	104,6	143,0	74,5
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	271	164	107	53,5	66,0	41,5	38,2	54,6	24,6
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	16	7	9	3,2	2,8	3,5	2,2	2,1	2,1
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	458	248	210	90,5	99,8	81,5	64,3	86,4	47,8
Athérosclérose cardiovasculaire, décrite ainsi (I25.0)	107	59	48	21,1	23,7	18,6	15,1	19,2	11,5
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	351	189	162	69,3	76,1	62,8	49,1	67,2	36,3
Autres cardiopathies (I26-I51)	237	89	148	46,8	35,8	57,4	33,8	32,3	33,3
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladies du péricarde et myocardite aiguë (I30-I31, I40)	2	1	1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5
Insuffisance cardiaque (I50)	105	30	75	20,7	12,1	29,1	14,6	11,3	15,5
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	130	58	72	25,7	23,3	27,9	18,8	20,6	17,3
Hypertension essentielle et néphropathie hypertensive (I10, I12, I15)	49	20	29	9,7	8,1	11,3	6,8	7,4	6,3
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	320	126	194	63,2	50,7	75,3	45,3	45,7	43,3
Athérosclérose (I70)	14	7	7	2,8	2,8	2,7	1,9	3,1	1,3
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	66	45	21	13,0	18,1	8,1	9,9	15,9	5,6
Anévrisme aortique et dissection (I71)	38	29	9	7,5	11,7	3,5	5,7	10,0	2,4
Autres maladies des artères, des artérioles et des capillaires (I72-I78)	28	16	12	5,5	6,4	4,7	4,2	5,9	3,1
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	9	2	7	1,8	0,8	2,7	1,3	0,5	1,9
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	76	35	41	15,0	14,1	15,9	10,8	13,2	9,1
Grippe (J09-J11)	5	0	5	1,0	0,0	1,9	0,7	0,0	1,1
Pneumopathie (J12-J18)	71	35	36	14,0	14,1	14,0	10,1	13,2	8,0
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	3	2	1	0,6	0,8	0,4	0,4	1,1	0,2
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	3	2	1	0,6	0,8	0,4	0,4	1,1	0,2
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	237	144	93	46,8	58,0	36,1	33,8	52,2	22,2
Bronchite, chronique et non précisée (J40-J42)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Emphysème (J43)	8	6	2	1,6	2,4	0,8	1,1	1,9	0,5
Asthme (J45-J46)	5	1	4	1,0	0,4	1,6	0,7	0,4	0,9
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	224	137	87	44,3	55,1	33,8	31,9	49,9	20,8
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	20	11	9	4,0	4,4	3,5	2,8	4,0	1,9
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	41	20	21	8,1	8,1	8,1	6,2	7,0	5,2
Ulcère gastro-duodénal (K25-K28)	5	5	0	1,0	2,0	0,0	0,7	1,7	0,0
Maladies de l'appendice (K35-K38)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hernies (K40-K46)	3	2	1	0,6	0,8	0,4	0,4	0,7	0,2
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	28	20	8	5,5	8,1	3,1	4,0	6,1	2,3
Maladie alcoolique du foie (K70)	8	6	2	1,6	2,4	0,8	1,1	1,6	0,6
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie (K73-K74)	20	14	6	4,0	5,6	2,3	2,9	4,4	1,8
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	7	4	3	1,4	1,6	1,2	1,0	1,6	0,6
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	89	55	34	17,6	22,1	13,2	12,6	19,7	8,1
Syndrome néphritique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	3	2	1	0,6	0,8	0,4	0,4	0,7	0,2
Insuffisance rénale (N17-N19)	85	52	33	16,8	20,9	12,8	12,1	18,6	7,9
Autres maladies des reins (N25, N27)	1	1	0	0,2	0,4	0,0	0,1	0,4	0,0
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	1	0	1	0,2	0,0	0,4	0,1	0,0	0,2
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	3	1,2	1,5	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	0	0,0	0,0
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	0	0,0	0,0
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	0	0,0	0,0

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-2 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Terre-Neuve-et-Labrador¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	0	0,0	0,0
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	15	6	9	3,0	2,4	3,5	4,4	3,5	5,4
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	19	11	8	3,8	4,4	3,1	4,5	5,5	3,4
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	49	24	25	9,7	9,7	9,7	7,5	8,9	6,1
Toutes autres maladies (résiduel) ⁷	482	205	277	95,2	82,5	107,5	69,3	73,6	66,7
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	152	93	59	30,0	37,4	22,9	27,4	36,9	18,1
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	48	36	12	9,5	14,5	4,7	9,8	14,5	5,3
Accidents de véhicule à moteur ⁸	43	31	12	8,5	12,5	4,7	8,6	12,3	5,3
Autres accidents de transport terrestre ⁹	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	5	5	0	1,0	2,0	0,0	1,1	2,3	0,0
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	104	57	47	20,5	22,9	18,2	17,7	22,3	12,8
Chutes (W00-W19)	18	13	5	3,6	5,2	1,9	2,8	4,8	1,4
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	11	11	0	2,2	4,4	0,0	2,1	4,5	0,0
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	14	6	8	2,8	2,4	3,1	3,2	2,7	3,8
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	13	11	2	2,6	4,4	0,8	2,4	4,2	0,7
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	48	16	32	9,5	6,4	12,4	7,1	6,3	6,9
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	42	37	5	8,3	14,9	1,9	8,8	15,2	2,6
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	7	7	0	1,4	2,8	0,0	1,2	2,4	0,0
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	35	30	5	6,9	12,1	1,9	7,6	12,8	2,6
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	5	2	3	1,0	0,8	1,2	1,1	0,9	1,4
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	2	1	1	0,4	0,4	0,4	0,5	0,6	0,3
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	3	1	2	0,6	0,4	0,8	0,7	0,2	1,1
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	5	4	1	1,0	1,6	0,4	0,9	1,6	0,3
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	5	4	1	1,0	1,6	0,4	0,9	1,6	0,3
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	7	3	4	1,4	1,2	1,6	1,1	0,9	1,2

1. La répartition géographique des décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
2. À partir de 2005, les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité sont présentées à l'appendice II de la publication « Mortalité : liste sommaire des causes » (numéro 84F0209XIF au catalogue).
3. La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
4. Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)
5. « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics ».
6. Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
7. Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
8. Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
9. Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.

Note(s) : Voir la section Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.

Source(s) : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès (Tableau CANSIM 102-0552) et l'appendice II.

Tableau 1-3
Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Île-du-Prince-Édouard¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)^{3, 4, 5}	1 201	603	598	860,7	885,3	837,2	574,2	724,8	456,9
Infections à la salmonelle (A01-A02)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	2	0	2	1,4	0,0	2,8	0,7	0,0	1,0
Tuberculose (A16-A19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Coqueluche (A37)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infection à méningocoques (A39)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Septicémie (A40-A41)	9	6	3	6,4	8,8	4,2	4,7	6,9	2,6
Syphilis (A50-A53)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	2	1	1	1,4	1,5	1,4	0,9	0,9	1,0
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Paludisme (B50-B54)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ⁶	3	0	3	2,1	0,0	4,2	1,4	0,0	2,4
Tumeurs malignes (C00-C97)	337	168	169	241,5	246,6	236,6	170,6	195,4	154,3
Tumeurs malignes de la lèvres, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	7	5	2	5,0	7,3	2,8	3,7	6,1	2,0
Tumeur maligne de l'oesophage (C15)	8	7	1	5,7	10,3	1,4	4,2	7,7	0,9
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	5	3	2	3,6	4,4	2,8	2,4	3,6	1,4
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	33	15	18	23,6	22,0	25,2	15,9	17,1	15,1
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	6	2	4	4,3	2,9	5,6	3,3	2,4	4,0
Tumeur maligne du pancréas (C25)	23	7	16	16,5	10,3	22,4	11,9	8,0	14,8
Tumeur maligne du larynx (C32)	2	2	0	1,4	2,9	0,0	1,1	2,2	0,0
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	89	51	38	63,8	74,9	53,2	45,6	59,4	34,6
Mélanome malin de la peau (C43)	4	2	2	2,9	2,9	2,8	2,2	2,4	2,0
Tumeur maligne du sein (C50)	25	1	24	17,9	1,5	33,6	11,8	1,4	20,9
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	1	1,4	1,0
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	4	5,6	4,0
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	8	11,2	8,1
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	18	26,4	21,8	...
Tumeurs malignes du rein et du bassinnet du rein (C64-C65)	11	8	3	7,9	11,7	4,2	5,8	9,2	3,1
Tumeur maligne de la vessie (C67)	13	8	5	9,3	11,7	7,0	6,7	9,1	4,8
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	2	1	1	1,4	1,5	1,4	1,1	1,0	1,2
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	35	19	16	25,1	27,9	22,4	18,6	22,4	15,3
Maladie de Hodgkin (C81)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	16	7	9	11,5	10,3	12,6	8,0	8,2	8,2
Leucémie (C91-C95)	16	10	6	11,5	14,7	8,4	9,0	12,0	6,3
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	3	2	1	2,1	2,9	1,4	1,6	2,2	0,8
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	43	19	24	30,8	27,9	33,6	21,0	21,7	21,1
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	4	4	0	2,9	5,9	0,0	1,8	4,4	0,0
Anémies (D50-D64)	3	1	2	2,1	1,5	2,8	1,4	1,2	1,5
Diabète sucré (E10-E14)	26	15	11	18,6	22,0	15,4	12,7	16,9	8,7
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Malnutrition (E40-E46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Méningite (G00, G03)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladie de Parkinson (G20-G21)	4	2	2	2,9	2,9	2,8	1,8	2,1	1,5
Maladie d'Alzheimer (G30)	31	8	23	22,2	11,7	32,2	12,7	9,8	14,4
Maladies cardiovasculaires graves (I00-I78)	369	190	179	264,4	278,9	250,6	166,1	225,1	120,4
Maladies du coeur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	279	153	126	199,9	224,6	176,4	127,5	181,0	86,7

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-3 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Île-du-Prince-Édouard¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies									
rhumatismales chroniques (I00-I09)	2	1	1	1,4	1,5	1,4	1,2	1,2	1,2
Cardiopathie hypertensive (I11)	2	0	2	1,4	0,0	2,8	0,8	0,0	1,4
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	214	127	87	153,4	186,4	121,8	97,8	148,0	58,0
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	67	44	23	48,0	64,6	32,2	31,5	49,7	15,5
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	147	83	64	105,3	121,9	89,6	66,3	98,3	42,5
Athérosclérose cardiovasculaire, décrite ainsi (I25.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	147	83	64	105,3	121,9	89,6	66,3	98,3	42,5
Autres cardiopathies (I26-I51)	61	25	36	43,7	36,7	50,4	27,8	31,8	26,1
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladies du péricarde et myocarde aiguë (I30-I31, I40)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insuffisance cardiaque (I50)	21	9	12	15,0	13,2	16,8	8,7	11,2	7,7
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	40	16	24	28,7	23,5	33,6	19,1	20,6	18,4
Hypertension essentielle et néphropathie hypertensive (I10, I12, I15)	4	2	2	2,9	2,9	2,8	1,5	2,5	1,2
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	73	29	44	52,3	42,6	61,6	30,8	35,4	26,6
Athérosclérose (I70)	1	0	1	0,7	0,0	1,4	0,4	0,0	0,5
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	12	6	6	8,6	8,8	8,4	5,9	6,2	5,3
Anévrisme aortique et dissection (I71)	8	4	4	5,7	5,9	5,6	3,8	4,0	3,1
Autres maladies des artères, des artérioles et des capillaires (I72-I78)	4	2	2	2,9	2,9	2,8	2,1	2,2	2,2
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	3	1	2	2,1	1,5	2,8	1,5	1,1	2,0
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	61	23	38	43,7	33,8	53,2	25,1	28,2	23,5
Grippe (J09-J11)	4	1	3	2,9	1,5	4,2	1,6	1,2	1,4
Pneumopathie (J12-J18)	57	22	35	40,8	32,3	49,0	23,5	27,0	22,1
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	44	25	19	31,5	36,7	26,6	21,2	29,6	14,3
Bronchite, chronique et non précisée (J40-J42)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Emphysème (J43)	2	1	1	1,4	1,5	1,4	0,9	1,2	0,4
Asthme (J45-J46)	2	0	2	1,4	0,0	2,8	0,9	0,0	1,5
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	40	24	16	28,7	35,2	22,4	19,4	28,4	12,3
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	9	5	4	6,4	7,3	5,6	4,6	6,9	2,5
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	12	8	4	8,6	11,7	5,6	6,3	9,3	3,4
Ulcère gastro-duodénal (K25-K28)	3	2	1	2,1	2,9	1,4	1,6	2,1	1,1
Maladies de l'appendice (K35-K38)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hernies (K40-K46)	1	0	1	0,7	0,0	1,4	0,4	0,0	0,5
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	16	9	7	11,5	13,2	9,8	8,5	10,4	6,8
Maladie alcoolique du foie (K70)	1	1	0	0,7	1,5	0,0	0,7	1,5	0,0
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie (K73-K74)	15	8	7	10,7	11,7	9,8	7,7	9,0	6,8
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	2	1	1	1,4	1,5	1,4	1,0	1,2	0,9
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	28	17	11	20,1	25,0	15,4	12,9	20,6	8,4
Syndrome néphritique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insuffisance rénale (N17-N19)	28	17	11	20,1	25,0	15,4	12,9	20,6	8,4
Autres maladies des reins (N25, N27)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	0	0,0	0,0	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	0	0,0	0,0
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	0	0,0	0,0
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	0	0,0	0,0

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-3 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Île-du-Prince-Édouard¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	0	0,0	0,0
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	1	0	1	0,7	0,0	1,4	1,0	0,0	2,0
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	2	2	0	1,4	2,9	0,0	1,5	3,1	0,0
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	18	7	11	12,9	10,3	15,4	7,3	8,7	5,9
Toutes autres maladies (résiduel) ⁷	131	56	75	93,9	82,2	105,0	59,0	67,6	55,1
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	61	38	23	43,7	55,8	32,2	34,9	51,3	18,7
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	20	16	4	14,3	23,5	5,6	15,8	25,7	6,2
Accidents de véhicule à moteur ⁸	20	16	4	14,3	23,5	5,6	15,8	25,7	6,2
Autres accidents de transport terrestre ⁹	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	41	22	19	29,4	32,3	26,6	19,1	25,6	12,5
Chutes (W00-W19)	12	6	6	8,6	8,8	8,4	5,4	6,6	4,1
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	3	3	0	2,1	4,4	0,0	1,7	3,4	0,0
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	5	3	2	3,6	4,4	2,8	2,7	3,5	1,9
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	21	10	11	15,0	14,7	15,4	9,3	12,1	6,5
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	12	10	2	8,6	14,7	2,8	8,0	14,8	1,8
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	2	2	0	1,4	2,9	0,0	1,1	2,2	0,0
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	10	8	2	7,2	11,7	2,8	7,0	12,6	1,8
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	1	1	0	0,7	1,5	0,0	1,2	2,4	0,0
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	1	1	0	0,7	1,5	0,0	1,2	2,4	0,0
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	3	2	1	2,1	2,9	1,4	2,0	3,1	1,0
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	3	2	1	2,1	2,9	1,4	2,0	3,1	1,0
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	3	1	2	2,1	1,5	2,8	1,5	1,5	1,2

1. La répartition géographique des décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
2. À partir de 2005, les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité sont présentées à l'appendice II de la publication « Mortalité : liste sommaire des causes » (numéro 84F0209XIF au catalogue).
3. La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
4. Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10) « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics ».
5. Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
6. Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
7. Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
8. Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.

Note(s) : Voir la section Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.

Source(s) : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès (Tableau CANSIM 102-0552) et l'appendice II.

Tableau 1-4
Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Nouvelle-Écosse¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)^{3, 4, 5}	8 220	4 093	4 127	877,5	899,8	856,5	581,7	723,0	473,4
Infections à la salmonelle (A01-A02)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	25	10	15	2,7	2,2	3,1	1,6	1,8	1,5
Tuberculose (A16-A19)	3	2	1	0,3	0,4	0,2	0,2	0,3	0,1
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	3	2	1	0,3	0,4	0,2	0,2	0,3	0,1
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Coqueluche (A37)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	1	0	1	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1
Infection à méningocoques (A39)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Septicémie (A40-A41)	65	21	44	6,9	4,6	9,1	4,5	3,5	5,3
Syphilis (A50-A53)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	13	8	5	1,4	1,8	1,0	0,9	1,2	0,8
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	10	7	3	1,1	1,5	0,6	0,9	1,3	0,6
Paludisme (B50-B54)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ⁶	19	9	10	2,0	2,0	2,1	1,6	1,7	1,6
Tumeurs malignes (C00-C97)	2 475	1 333	1 142	264,2	293,1	237,0	183,6	230,5	150,7
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	43	28	15	4,6	6,2	3,1	3,2	4,8	2,0
Tumeur maligne de l'oesophage (C15)	51	37	14	5,4	8,1	2,9	3,7	6,0	1,9
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	65	42	23	6,9	9,2	4,8	5,1	7,5	3,2
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	258	138	120	27,5	30,3	24,9	18,9	23,7	15,0
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	54	33	21	5,8	7,3	4,4	3,9	5,6	2,7
Tumeur maligne du pancréas (C25)	133	73	60	14,2	16,0	12,5	9,9	12,5	7,8
Tumeur maligne du larynx (C32)	11	9	2	1,2	2,0	0,4	0,8	1,6	0,2
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	668	374	294	71,3	82,2	61,0	51,0	64,2	41,1
Mélanome malin de la peau (C43)	34	18	16	3,6	4,0	3,3	2,6	3,1	2,2
Tumeur maligne du sein (C50)	145	2	143	15,5	0,4	29,7	10,5	0,4	18,8
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	19	3,9	2,8
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	25	5,2	3,3
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	52	10,8	6,6
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	128	28,1	22,6	...
Tumeurs malignes du rein et du bassinnet du rein (C64-C65)	71	49	22	7,6	10,8	4,6	5,3	8,6	2,9
Tumeur maligne de la vessie (C67)	76	57	19	8,1	12,5	3,9	5,3	9,9	1,9
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	63	34	29	6,7	7,5	6,0	5,0	5,9	4,3
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	221	124	97	23,6	27,3	20,1	16,4	21,3	12,8
Maladie de Hodgkin (C81)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	96	49	47	10,2	10,8	9,8	7,1	8,4	6,1
Leucémie (C91-C95)	86	52	34	9,2	11,4	7,1	6,4	9,0	4,7
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	37	21	16	3,9	4,6	3,3	2,7	3,6	1,9
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	2	2	0	0,2	0,4	0,0	0,1	0,3	0,0
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	358	187	171	38,2	41,1	35,5	26,4	32,9	21,2
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	41	20	21	4,4	4,4	4,4	3,1	3,5	2,6
Anémies (D50-D64)	22	5	17	2,3	1,1	3,5	1,5	1,0	1,8
Diabète sucré (E10-E14)	264	132	132	28,2	29,0	27,4	18,7	22,7	15,6
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	6	3	3	0,6	0,7	0,6	0,4	0,5	0,3
Malnutrition (E40-E46)	5	2	3	0,5	0,4	0,6	0,3	0,3	0,3
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	1	1	0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0
Méningite (G00, G03)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladie de Parkinson (G20-G21)	45	24	21	4,8	5,3	4,4	3,0	4,2	2,3
Maladie d'Alzheimer (G30)	283	83	200	30,2	18,2	41,5	17,2	14,6	18,1
Maladies cardiovasculaires graves (I00-I78)	2 440	1 213	1 227	260,5	266,7	254,6	163,7	210,2	126,7
Maladies du coeur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	1 690	906	784	180,4	199,2	162,7	114,4	156,2	82,0

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-4 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Nouvelle-Écosse¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies									
rhumatismales chroniques (I00-I09)	14	4	10	1,5	0,9	2,1	1,0	0,7	1,2
Cardiopathie hypertensive (I11)	33	15	18	3,5	3,3	3,7	2,4	2,7	2,1
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	1	0	1	0,1	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	1 199	700	499	128,0	153,9	103,6	81,6	120,0	51,8
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	473	282	191	50,5	62,0	39,6	32,5	48,5	20,4
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	13	7	6	1,4	1,5	1,2	1,0	1,3	0,8
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	713	411	302	76,1	90,4	62,7	48,2	70,2	30,6
Athérosclérose cardiovasculaire, décrite ainsi (I25.0)	30	17	13	3,2	3,7	2,7	2,0	2,8	1,3
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	683	394	289	72,9	86,6	60,0	46,2	67,4	29,2
Autres cardiopathies (I26-I51)	443	187	256	47,3	41,1	53,1	29,4	32,9	26,8
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	1	1	0	0,1	0,2	0,0	0,1	0,2	0,0
Maladies du péricarde et myocarde aiguë (I30-I31, I40)	4	2	2	0,4	0,4	0,4	0,3	0,4	0,3
Insuffisance cardiaque (I50)	171	67	104	18,3	14,7	21,6	10,7	12,0	9,9
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	267	117	150	28,5	25,7	31,1	18,3	20,3	16,6
Hypertension essentielle et néphropathie hypertensive (I10, I12, I15)	57	21	36	6,1	4,6	7,5	3,6	3,7	3,3
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	537	197	340	57,3	43,3	70,6	34,8	34,7	34,3
Athérosclérose (I70)	24	11	13	2,6	2,4	2,7	1,5	1,9	1,2
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	132	78	54	14,1	17,1	11,2	9,3	13,6	5,9
Anévrisme aortique et dissection (I71)	85	58	27	9,1	12,8	5,6	6,1	10,2	3,0
Autres maladies des artères, des artérioles et des capillaires (I72-I78)	47	20	27	5,0	4,4	5,6	3,2	3,4	2,9
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	6	1	5	0,6	0,2	1,0	0,5	0,1	0,7
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	194	86	108	20,7	18,9	22,4	11,9	15,4	10,2
Grippe (J09-J11)	11	2	9	1,2	0,4	1,9	0,6	0,4	0,7
Pneumopathie (J12-J18)	183	84	99	19,5	18,5	20,5	11,3	15,1	9,5
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	1	0	1	0,1	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	1	0	1	0,1	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	421	231	190	44,9	50,8	39,4	28,7	40,8	21,9
Bronchite, chronique et non précisée (J40-J42)	5	2	3	0,5	0,4	0,6	0,3	0,3	0,3
Emphysème (J43)	20	11	9	2,1	2,4	1,9	1,4	2,0	1,1
Asthme (J45-J46)	7	3	4	0,7	0,7	0,8	0,4	0,5	0,3
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	389	215	174	41,5	47,3	36,1	26,6	37,9	20,2
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	7	7	0	0,7	1,5	0,0	0,5	1,2	0,0
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	33	16	17	3,5	3,5	3,5	2,3	2,9	1,9
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	93	46	47	9,9	10,1	9,8	6,5	8,1	5,6
Ulcère gastro-duodénal (K25-K28)	12	9	3	1,3	2,0	0,6	0,8	1,5	0,3
Maladies de l'appendice (K35-K38)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hernies (K40-K46)	5	1	4	0,5	0,2	0,8	0,3	0,2	0,4
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	86	56	30	9,2	12,3	6,2	6,5	9,0	4,3
Maladie alcoolique du foie (K70)	40	31	9	4,3	6,8	1,9	3,0	5,0	1,3
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie (K73-K74)	46	25	21	4,9	5,5	4,4	3,5	4,0	3,0
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	12	8	4	1,3	1,8	0,8	0,8	1,4	0,4
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	133	63	70	14,2	13,9	14,5	9,1	11,2	7,6
Syndrome néphritique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	5	4	1	0,5	0,9	0,2	0,4	0,7	0,1
Insuffisance rénale (N17-N19)	128	59	69	13,7	13,0	14,3	8,7	10,5	7,5
Autres maladies des reins (N25, N27)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	4	0,9	0,7	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	2	0,4	0,3
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	1	0,2	0,2
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	0	0,0	0,0

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-4 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Nouvelle-Écosse¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	1	0,2	0,2
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	14	5	9	1,5	1,1	1,9	2,2	1,5	2,9
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	23	12	11	2,5	2,6	2,3	2,4	2,3	2,5
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	46	23	23	4,9	5,1	4,8	3,9	4,1	3,7
Toutes autres maladies (résiduel) ⁷	849	318	531	90,6	69,9	110,2	55,6	56,4	53,3
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	440	239	201	47,0	52,5	41,7	36,0	49,1	24,1
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	102	75	27	10,9	16,5	5,6	11,1	17,2	5,6
Accidents de véhicule à moteur ⁸	91	64	27	9,7	14,1	5,6	9,9	14,5	5,6
Autres accidents de transport terrestre ⁹	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	11	11	0	1,2	2,4	0,0	1,3	2,6	0,0
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	338	164	174	36,1	36,1	36,1	24,9	31,9	18,5
Chutes (W00-W19)	206	75	131	22,0	16,5	27,2	12,7	13,5	12,0
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	6	6	0	0,6	1,3	0,0	0,7	1,5	0,0
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	14	11	3	1,5	2,4	0,6	1,1	1,9	0,4
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	68	44	24	7,3	9,7	5,0	7,1	9,8	4,6
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	44	28	16	4,7	6,2	3,3	3,3	5,2	1,5
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	96	78	18	10,2	17,1	3,7	9,5	16,1	3,3
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	14	14	0	1,5	3,1	0,0	1,1	2,3	0,0
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	82	64	18	8,8	14,1	3,7	8,4	13,8	3,3
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	17	14	3	1,8	3,1	0,6	1,7	2,9	0,6
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	2	2	0	0,2	0,4	0,0	0,2	0,5	0,0
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	15	12	3	1,6	2,6	0,6	1,5	2,4	0,6
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	1	1	0	0,1	0,2	0,0	0,1	0,2	0,0
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	1	1	0	0,1	0,2	0,0	0,1	0,2	0,0
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	1	1	0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	11	4	7	1,2	0,9	1,5	1,0	0,7	1,2

1. La répartition géographique des décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
2. À partir de 2005, les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité sont présentées à l'appendice II de la publication « Mortalité : liste sommaire des causes » (numéro 84F0209XIF au catalogue).
3. La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
4. Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)
5. « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics ».
6. Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
7. Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
8. Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
9. Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.

Note(s) : Voir la section Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.

Source(s) : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès (Tableau CANSIM 102-0552) et l'appendice II.

Tableau 1-5
Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Nouveau-Brunswick¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)^{3, 4, 5}	6 450	3 256	3 194	863,6	888,1	839,9	575,6	720,5	462,4
Infections à la salmonelle (A01-A02)	1	0	1	0,1	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	19	7	12	2,5	1,9	3,2	1,7	1,6	1,9
Tuberculose (A16-A19)	1	0	1	0,1	0,0	0,3	0,1	0,0	0,2
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	1	0	1	0,1	0,0	0,3	0,1	0,0	0,2
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Coqueluche (A37)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infection à méningocoques (A39)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Septicémie (A40-A41)	50	26	24	6,7	7,1	6,3	4,6	6,0	3,7
Syphilis (A50-A53)	1	0	1	0,1	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	4	3	1	0,5	0,8	0,3	0,5	0,6	0,4
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	1	1	0	0,1	0,3	0,0	0,2	0,4	0,0
Paludisme (B50-B54)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ⁶	13	5	8	1,7	1,4	2,1	1,1	1,0	1,2
Tumeurs malignes (C00-C97)	1 894	1 069	825	253,6	291,6	217,0	178,1	232,2	137,7
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	32	21	11	4,3	5,7	2,9	3,1	4,4	1,8
Tumeur maligne de l'oesophage (C15)	44	32	12	5,9	8,7	3,2	4,2	6,8	2,0
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	48	32	16	6,4	8,7	4,2	4,5	6,9	2,6
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	155	85	70	20,8	23,2	18,4	14,3	18,5	11,3
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	38	27	11	5,1	7,4	2,9	3,5	5,6	1,8
Tumeur maligne du pancréas (C25)	107	55	52	14,3	15,0	13,7	9,9	11,7	8,3
Tumeur maligne du larynx (C32)	18	15	3	2,4	4,1	0,8	1,7	3,0	0,5
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	605	380	225	81,0	103,6	59,2	57,2	81,6	37,7
Mélanome malin de la peau (C43)	26	20	6	3,5	5,5	1,6	2,6	4,2	1,3
Tumeur maligne du sein (C50)	122	2	120	16,3	0,5	31,6	11,6	0,5	20,9
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	8	2,1	1,4
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	21	5,5	3,3
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	39	10,3	6,9
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	113	30,8	25,1	...
Tumeurs malignes du rein et du bassinnet du rein (C64-C65)	49	28	21	6,6	7,6	5,5	4,6	5,9	3,5
Tumeur maligne de la vessie (C67)	36	25	11	4,8	6,8	2,9	3,2	5,5	1,5
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	46	27	19	6,2	7,4	5,0	4,4	5,5	3,3
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	160	87	73	21,4	23,7	19,2	15,5	19,3	12,4
Maladie de Hodgkin (C81)	4	2	2	0,5	0,5	0,5	0,4	0,5	0,4
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	73	43	30	9,8	11,7	7,9	7,3	9,6	5,3
Leucémie (C91-C95)	50	31	19	6,7	8,5	5,0	4,7	6,7	3,3
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	33	11	22	4,4	3,0	5,8	3,0	2,4	3,5
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	227	120	107	30,4	32,7	28,1	21,4	27,5	17,1
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	45	25	20	6,0	6,8	5,3	4,0	5,7	2,7
Anémies (D50-D64)	18	6	12	2,4	1,6	3,2	1,6	1,4	1,8
Diabète sucré (E10-E14)	199	98	101	26,6	26,7	26,6	17,5	21,0	15,3
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	6	0	6	0,8	0,0	1,6	0,5	0,0	0,9
Malnutrition (E40-E46)	5	0	5	0,7	0,0	1,3	0,4	0,0	0,7
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	1	0	1	0,1	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1
Méningite (G00, G03)	3	2	1	0,4	0,5	0,3	0,4	0,5	0,2
Maladie de Parkinson (G20-G21)	44	24	20	5,9	6,5	5,3	3,7	5,3	2,5
Maladie d'Alzheimer (G30)	170	54	116	22,8	14,7	30,5	13,1	11,9	13,7
Maladies cardiovasculaires graves (I00-I78)	1 829	876	953	244,9	238,9	250,6	152,6	189,2	125,0
Maladies du coeur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	1 335	671	664	178,7	183,0	174,6	111,4	144,6	86,1

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-5 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Nouveau-Brunswick¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies									
rhumatismales chroniques (I00-I09)	10	3	7	1,3	0,8	1,8	0,9	0,6	1,1
Cardiopathie hypertensive (I11)	8	3	5	1,1	0,8	1,3	0,6	0,7	0,4
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	5	2	3	0,7	0,5	0,8	0,4	0,4	0,4
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	866	476	390	115,9	129,8	102,6	72,4	101,3	50,4
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	408	232	176	54,6	63,3	46,3	34,7	49,1	23,5
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	28	12	16	3,7	3,3	4,2	2,3	2,7	2,1
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	430	232	198	57,6	63,3	52,1	35,5	49,5	24,8
Athérosclérose cardiovasculaire, décrite ainsi (I25.0)	5	2	3	0,7	0,5	0,8	0,4	0,5	0,3
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	425	230	195	56,9	62,7	51,3	35,1	49,0	24,5
Autres cardiopathies (I26-I51)	446	187	259	59,7	51,0	68,1	37,1	41,6	33,7
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	2	0	2	0,3	0,0	0,5	0,3	0,0	0,6
Maladies du péricarde et myocardite aiguë (I30-I31, I40)	4	3	1	0,5	0,8	0,3	0,4	0,6	0,1
Insuffisance cardiaque (I50)	186	74	112	24,9	20,2	29,5	14,0	16,3	12,3
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	254	110	144	34,0	30,0	37,9	22,4	24,7	20,7
Hypertension essentielle et néphropathie hypertensive (I10, I12, I15)	38	12	26	5,1	3,3	6,8	2,9	2,7	2,8
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	366	143	223	49,0	39,0	58,6	30,4	31,2	29,9
Athérosclérose (I70)	13	4	9	1,7	1,1	2,4	1,1	0,9	1,2
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	77	46	31	10,3	12,5	8,2	6,8	9,9	5,0
Anévrisme aortique et dissection (I71)	45	27	18	6,0	7,4	4,7	4,0	5,7	2,9
Autres maladies des artères, des artérioles et des capillaires (I72-I78)	32	19	13	4,3	5,2	3,4	2,8	4,2	2,1
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	10	5	5	1,3	1,4	1,3	0,9	1,2	0,7
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	123	56	67	16,5	15,3	17,6	10,0	12,8	7,6
Grippe (J09-J11)	8	2	6	1,1	0,5	1,6	0,7	0,5	0,7
Pneumopathie (J12-J18)	115	54	61	15,4	14,7	16,0	9,3	12,4	6,9
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	336	176	160	45,0	48,0	42,1	28,9	38,6	23,0
Bronchite, chronique et non précisée (J40-J42)	4	3	1	0,5	0,8	0,3	0,3	0,7	0,1
Emphysème (J43)	15	11	4	2,0	3,0	1,1	1,3	2,4	0,6
Asthme (J45-J46)	6	0	6	0,8	0,0	1,6	0,5	0,0	0,8
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	311	162	149	41,6	44,2	39,2	26,8	35,5	21,5
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	2	2	0	0,3	0,5	0,0	0,2	0,4	0,0
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	24	12	12	3,2	3,3	3,2	1,9	2,7	1,5
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	68	36	32	9,1	9,8	8,4	5,8	7,7	4,5
Ulcère gastro-duodénal (K25-K28)	8	4	4	1,1	1,1	1,1	0,7	0,9	0,5
Maladies de l'appendice (K35-K38)	2	2	0	0,3	0,5	0,0	0,1	0,5	0,0
Hernies (K40-K46)	8	5	3	1,1	1,4	0,8	0,7	1,1	0,5
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	52	36	16	7,0	9,8	4,2	5,1	7,5	2,9
Maladie alcoolique du foie (K70)	29	25	4	3,9	6,8	1,1	2,8	5,1	0,6
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie (K73-K74)	23	11	12	3,1	3,0	3,2	2,3	2,4	2,3
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	6	2	4	0,8	0,5	1,1	0,5	0,4	0,5
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	123	49	74	16,5	13,4	19,5	10,0	11,0	9,5
Syndrome néphritique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insuffisance rénale (N17-N19)	122	49	73	16,3	13,4	19,2	9,9	11,0	9,3
Autres maladies des reins (N25, N27)	1	0	1	0,1	0,0	0,3	0,1	0,0	0,2
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	2	1	1	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	0	0,0	0,0	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	0	0,0	0,0
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	0	0,0	0,0
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	0	0,0	0,0

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-5 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Nouveau-Brunswick¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	0	0,0	0,0
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	15	9	6	2,0	2,5	1,6	2,9	3,4	2,4
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	16	8	8	2,1	2,2	2,1	1,9	2,0	1,7
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	177	65	112	23,7	17,7	29,5	14,5	15,2	13,6
Toutes autres maladies (résiduel) ⁷	767	320	447	102,7	87,3	117,5	65,4	70,5	60,8
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	286	172	114	38,3	46,9	30,0	30,7	42,6	19,2
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	98	73	25	13,1	19,9	6,6	13,1	20,1	6,3
Accidents de véhicule à moteur ⁸	88	66	22	11,8	18,0	5,8	12,0	18,5	5,5
Autres accidents de transport terrestre ⁹	3	2	1	0,4	0,5	0,3	0,3	0,5	0,2
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	7	5	2	0,9	1,4	0,5	0,8	1,1	0,6
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	188	99	89	25,2	27,0	23,4	17,6	22,5	12,9
Chutes (W00-W19)	83	32	51	11,1	8,7	13,4	6,6	7,0	5,6
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	3	2	1	0,4	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	10	8	2	1,3	2,2	0,5	1,0	1,6	0,6
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	44	31	13	5,9	8,5	3,4	5,3	7,8	2,9
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	48	26	22	6,4	7,1	5,8	4,4	5,8	3,5
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	107	85	22	14,3	23,2	5,8	13,2	21,5	5,2
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	33	32	1	4,4	8,7	0,3	3,9	7,7	0,4
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	74	53	21	9,9	14,5	5,5	9,3	13,9	4,8
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	3	3	0	0,4	0,8	0,0	0,3	0,6	0,0
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	3	3	0	0,4	0,8	0,0	0,3	0,6	0,0
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	4	4	0	0,5	1,1	0,0	0,5	0,9	0,0
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	4	4	0	0,5	1,1	0,0	0,5	0,9	0,0
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	13	8	5	1,7	2,2	1,3	1,2	1,8	0,8

1. La répartition géographique des décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
2. À partir de 2005, les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité sont présentées à l'appendice II de la publication « Mortalité : liste sommaire des causes » (numéro 84F0209XIF au catalogue).
3. La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
4. Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10) « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics ».
5. « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics ».
6. Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
7. Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
8. Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
9. Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.

Note(s) : Voir la section Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.

Source(s) : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès (Tableau CANSIM 102-0552) et l'appendice II.

Tableau 1-6
Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Québec¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)^{3, 4, 5}	57 106	28 430	28 676	736,7	740,6	733,0	527,5	653,5	433,0
Infections à la salmonelle (A01-A02)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	374	157	217	4,8	4,1	5,5	3,3	3,8	3,0
Tuberculose (A16-A19)	7	3	4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	6	3	3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	1	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Coqueluche (A37)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infection à méningocoques (A39)	4	1	3	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1
Septicémie (A40-A41)	470	212	258	6,1	5,5	6,6	4,2	5,0	3,8
Syphilis (A50-A53)	1	1	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	68	41	27	0,9	1,1	0,7	0,6	0,8	0,5
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	94	72	22	1,2	1,9	0,6	1,0	1,4	0,5
Paludisme (B50-B54)	1	1	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ⁶	148	78	70	1,9	2,0	1,8	1,4	1,8	1,1
Tumeurs malignes (C00-C97)	19 050	9 939	9 111	245,8	258,9	232,9	179,9	219,7	152,9
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	289	193	96	3,7	5,0	2,5	2,7	4,2	1,6
Tumeur maligne de l'oesophage (C15)	317	257	60	4,1	6,7	1,5	3,0	5,5	1,0
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	568	314	254	7,3	8,2	6,5	5,3	7,0	4,0
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	2 274	1 165	1 109	29,3	30,3	28,3	21,2	25,8	17,8
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	459	282	177	5,9	7,3	4,5	4,4	6,2	2,9
Tumeur maligne du pancréas (C25)	1 007	492	515	13,0	12,8	13,2	9,5	10,8	8,6
Tumeur maligne du larynx (C32)	174	136	38	2,2	3,5	1,0	1,7	3,0	0,6
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	5 829	3 386	2 443	75,2	88,2	62,4	55,5	73,7	42,4
Mélanome malin de la peau (C43)	176	98	78	2,3	2,6	2,0	1,7	2,1	1,4
Tumeur maligne du sein (C50)	1 326	16	1 310	17,1	0,4	33,5	12,5	0,3	22,6
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	69	1,8	1,3
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	216	5,5	3,5
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	404	10,3	6,8
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	730	19,0	17,2	...
Tumeurs malignes du rein et du bassin du rein (C64-C65)	434	271	163	5,6	7,1	4,2	4,1	5,9	2,7
Tumeur maligne de la vessie (C67)	473	338	135	6,1	8,8	3,5	4,3	7,7	2,0
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	506	286	220	6,5	7,4	5,6	5,1	6,2	4,2
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	1 548	847	701	20,0	22,1	17,9	14,8	18,7	11,7
Maladie de Hodgkin (C81)	33	19	14	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4	0,3
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	635	349	286	8,2	9,1	7,3	6,0	7,6	4,8
Leucémie (C91-C95)	563	316	247	7,3	8,2	6,3	5,4	7,1	4,1
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	315	161	154	4,1	4,2	3,9	2,9	3,5	2,5
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	2	2	0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	2 251	1 128	1 123	29,0	29,4	28,7	21,0	25,5	17,9
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	279	154	125	3,6	4,0	3,2	2,5	3,6	1,9
Anémies (D50-D64)	148	48	100	1,9	1,3	2,6	1,2	1,2	1,3
Diabète sucré (E10-E14)	1 514	759	755	19,5	19,8	19,3	13,7	17,0	11,1
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	108	38	70	1,4	1,0	1,8	0,9	0,9	0,9
Malnutrition (E40-E46)	102	37	65	1,3	1,0	1,7	0,9	0,9	0,9
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	6	1	5	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
Méningite (G00, G03)	18	11	7	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1
Maladie de Parkinson (G20-G21)	472	259	213	6,1	6,7	5,4	4,2	6,0	3,0
Maladie d'Alzheimer (G30)	2 081	580	1 501	26,8	15,1	38,4	17,2	14,2	18,6
Maladies cardiovasculaires graves (I00-I78)	14 804	7 295	7 509	191,0	190,0	191,9	130,9	167,1	102,5
Maladies du coeur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	11 139	5 742	5 397	143,7	149,6	137,9	98,8	131,0	73,8

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-6 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Québec¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies									
rhumatismales chroniques (I00-I09)	136	41	95	1,8	1,1	2,4	1,3	0,9	1,5
Cardiopathie hypertensive (I11)	42	18	24	0,5	0,5	0,6	0,4	0,4	0,3
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	31	13	18	0,4	0,3	0,5	0,3	0,3	0,2
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	8 060	4 379	3 681	104,0	114,1	94,1	71,6	99,3	50,2
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	4 532	2 600	1 932	58,5	67,7	49,4	40,8	57,7	27,0
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	407	197	210	5,3	5,1	5,4	3,6	4,5	2,9
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	3 121	1 582	1 539	40,3	41,2	39,3	27,2	37,1	20,3
Athérosclérose cardiovasculaire, décrite ainsi (I25.0)	47	21	26	0,6	0,5	0,7	0,4	0,5	0,3
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	3 074	1 561	1 513	39,7	40,7	38,7	26,8	36,6	20,0
Autres cardiopathies (I26-I51)	2 870	1 291	1 579	37,0	33,6	40,4	25,3	30,1	21,6
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	16	8	8	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1
Maladies du péricarde et myocardite aiguë (I30-I31, I40)	23	13	10	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2
Insuffisance cardiaque (I50)	977	446	531	12,6	11,6	13,6	8,4	10,6	6,8
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	1 854	824	1 030	23,9	21,5	26,3	16,6	19,0	14,5
Hypertension essentielle et néphropathie hypertensive (I10, I12, I15)	241	86	155	3,1	2,2	4,0	2,0	2,0	2,0
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	2 698	1 046	1 652	34,8	27,2	42,2	23,6	24,3	22,4
Athérosclérose (I70)	104	57	47	1,3	1,5	1,2	0,9	1,4	0,6
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	622	364	258	8,0	9,5	6,6	5,6	8,4	3,8
Anévrisme aortique et dissection (I71)	431	265	166	5,6	6,9	4,2	3,9	6,1	2,5
Autres maladies des artères, des artérioles et des capillaires (I72-I78)	191	99	92	2,5	2,6	2,4	1,7	2,3	1,3
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	67	19	48	0,9	0,5	1,2	0,6	0,4	0,7
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	1 180	544	636	15,2	14,2	16,3	10,1	13,3	8,2
Grippe (J09-J11)	75	29	46	1,0	0,8	1,2	0,6	0,8	0,6
Pneumopathie (J12-J18)	1 105	515	590	14,3	13,4	15,1	9,5	12,6	7,6
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	51	26	25	0,7	0,7	0,6	0,4	0,7	0,3
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	43	21	22	0,6	0,5	0,6	0,3	0,6	0,3
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	8	5	3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	2 757	1 410	1 347	35,6	36,7	34,4	24,7	33,4	19,9
Bronchite, chronique et non précisée (J40-J42)	58	28	30	0,7	0,7	0,8	0,5	0,7	0,4
Emphysème (J43)	132	76	56	1,7	2,0	1,4	1,2	1,7	1,0
Asthme (J45-J46)	38	15	23	0,5	0,4	0,6	0,4	0,4	0,4
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	2 529	1 291	1 238	32,6	33,6	31,6	22,6	30,7	18,2
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	14	12	2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,3	0,0
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	456	213	243	5,9	5,5	6,2	4,0	5,1	3,3
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	632	320	312	8,2	8,3	8,0	5,8	7,5	4,7
Ulcère gastro-duodénal (K25-K28)	61	36	25	0,8	0,9	0,6	0,6	0,8	0,3
Maladies de l'appendice (K35-K38)	9	5	4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Hernies (K40-K46)	67	30	37	0,9	0,8	0,9	0,6	0,7	0,5
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	593	393	200	7,7	10,2	5,1	5,6	8,2	3,4
Maladie alcoolique du foie (K70)	248	190	58	3,2	4,9	1,5	2,4	3,9	1,1
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie (K73-K74)	345	203	142	4,5	5,3	3,6	3,2	4,3	2,4
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	94	48	46	1,2	1,3	1,2	0,8	1,2	0,6
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	1 036	534	502	13,4	13,9	12,8	9,0	12,7	6,9
Syndrome néphritique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	5	4	1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	10	6	4	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
Insuffisance rénale (N17-N19)	1 021	524	497	13,2	13,6	12,7	8,9	12,5	6,8
Autres maladies des reins (N25, N27)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	62	19	43	0,8	0,5	1,1	0,5	0,5	0,5
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	14	0,4	0,3	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	2	0,1	0,0
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	7	0,2	0,2
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	1	0,0	0,0
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	6	0,2	0,2

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-6 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Québec¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	244	121	123	3,1	3,2	3,1	4,0	3,9	4,1
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	175	102	73	2,3	2,7	1,9	2,4	2,7	2,0
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	319	159	160	4,1	4,1	4,1	3,1	3,7	2,4
Toutes autres maladies (résiduel) ⁷	6 238	2 563	3 675	80,5	66,8	93,9	55,5	60,3	51,4
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	2 055	1 238	817	26,5	32,2	20,9	21,9	30,8	13,6
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	672	499	173	8,7	13,0	4,4	8,5	12,8	4,3
Accidents de véhicule à moteur ⁸	617	448	169	8,0	11,7	4,3	7,9	11,6	4,2
Autres accidents de transport terrestre ⁹	12	12	0	0,2	0,3	0,0	0,1	0,3	0,0
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	43	39	4	0,6	1,0	0,1	0,5	0,9	0,1
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	1 383	739	644	17,8	19,3	16,5	13,4	18,0	9,4
Chutes (W00-W19)	365	197	168	4,7	5,1	4,3	3,3	4,6	2,3
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	4	4	0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	49	43	6	0,6	1,1	0,2	0,6	1,1	0,2
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	43	25	18	0,6	0,7	0,5	0,5	0,6	0,4
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	219	150	69	2,8	3,9	1,8	2,6	3,7	1,5
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	703	320	383	9,1	8,3	9,8	6,4	8,0	5,0
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	1 152	867	285	14,9	22,6	7,3	13,7	21,0	6,6
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	137	129	8	1,8	3,4	0,2	1,5	2,9	0,2
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	1 015	738	277	13,1	19,2	7,1	12,2	18,1	6,4
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	92	64	28	1,2	1,7	0,7	1,2	1,6	0,7
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	22	17	5	0,3	0,4	0,1	0,3	0,5	0,1
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	70	47	23	0,9	1,2	0,6	0,8	1,1	0,6
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	6	6	0	0,1	0,2	0,0	0,1	0,2	0,0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	62	33	29	0,8	0,9	0,7	0,8	0,8	0,7
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	62	33	29	0,8	0,9	0,7	0,8	0,8	0,7
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	20	5	15	0,3	0,1	0,4	0,2	0,1	0,2

1. La répartition géographique des décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
2. À partir de 2005, les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité sont présentées à l'appendice II de la publication « Mortalité : liste sommaire des causes » (numéro 84F0209XIF au catalogue).
3. La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
4. Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)
5. « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics ».
6. Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
7. Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
8. Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
9. Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.

Note(s) : Voir la section Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.

Source(s) : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès (Tableau CANSIM 102-0552) et l'appendice II.

Tableau 1-7

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Ontario¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)^{3, 4, 5}	88 041	44 153	43 888	680,8	692,4	669,5	512,7	628,0	423,3
Infections à la salmonelle (A01-A02)	5	1	4	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	483	189	294	3,7	3,0	4,5	2,6	2,7	2,5
Tuberculose (A16-A19)	39	23	16	0,3	0,4	0,2	0,2	0,3	0,2
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	25	15	10	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	14	8	6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Coqueluche (A37)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	2	2	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infection à méningocoques (A39)	5	3	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Septicémie (A40-A41)	937	449	488	7,2	7,0	7,4	5,4	6,5	4,7
Syphilis (A50-A53)	2	2	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	180	120	60	1,4	1,9	0,9	1,1	1,5	0,7
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	137	104	33	1,1	1,6	0,5	0,9	1,4	0,5
Paludisme (B50-B54)	1	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ⁶	162	75	87	1,3	1,2	1,3	1,0	1,0	0,9
Tumeurs malignes (C00-C97)	25 940	13 486	12 454	200,6	211,5	190,0	157,7	188,8	135,9
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	420	273	147	3,2	4,3	2,2	2,6	3,8	1,7
Tumeur maligne de l'oesophage (C15)	698	537	161	5,4	8,4	2,5	4,3	7,4	1,6
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	703	421	282	5,4	6,6	4,3	4,2	5,9	3,0
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	2 866	1 585	1 281	22,2	24,9	19,5	17,1	22,2	13,2
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	731	500	231	5,7	7,8	3,5	4,5	6,8	2,5
Tumeur maligne du pancréas (C25)	1 399	716	683	10,8	11,2	10,4	8,5	9,9	7,3
Tumeur maligne du larynx (C32)	147	118	29	1,1	1,9	0,4	0,9	1,6	0,3
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	6 388	3 406	2 982	49,4	53,4	45,5	39,6	47,6	33,6
Mélanome malin de la peau (C43)	411	261	150	3,2	4,1	2,3	2,6	3,6	1,8
Tumeur maligne du sein (C50)	1 914	16	1 898	14,8	0,3	29,0	11,5	0,2	21,0
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	144	2,2	1,7
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	310	4,7	3,5
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	605	9,2	6,7
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	1 417	22,2	20,2	...
Tumeurs malignes du rein et du bassin du rein (C64-C65)	621	380	241	4,8	6,0	3,7	3,8	5,2	2,6
Tumeur maligne de la vessie (C67)	701	488	213	5,4	7,7	3,2	4,1	7,0	2,1
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	707	387	320	5,5	6,1	4,9	4,6	5,4	3,9
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématoïdétique et apparentés (C81-C96)	2 470	1 360	1 110	19,1	21,3	16,9	15,2	19,1	12,1
Maladie de Hodgkin (C81)	34	23	11	0,3	0,4	0,2	0,3	0,4	0,1
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	993	540	453	7,7	8,5	6,9	6,1	7,5	4,9
Leucémie (C91-C95)	953	537	416	7,4	8,4	6,3	5,9	7,7	4,5
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	487	258	229	3,8	4,0	3,5	3,0	3,6	2,5
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématoïdétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	3	2	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	3 288	1 621	1 667	25,4	25,4	25,4	19,7	22,8	17,3
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	504	234	270	3,9	3,7	4,1	2,9	3,3	2,5
Anémies (D50-D64)	148	58	90	1,1	0,9	1,4	0,9	0,9	0,8
Diabète sucré (E10-E14)	3 142	1 668	1 474	24,3	26,2	22,5	18,4	23,4	14,4
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	53	23	30	0,4	0,4	0,5	0,3	0,3	0,3
Malnutrition (E40-E46)	46	17	29	0,4	0,3	0,4	0,2	0,3	0,3
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	7	6	1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0
Méningite (G00, G03)	16	9	7	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Maladie de Parkinson (G20-G21)	761	428	333	5,9	6,7	5,1	4,1	6,1	2,9
Maladie d'Alzheimer (G30)	2 312	694	1 618	17,9	10,9	24,7	11,8	10,0	12,6
Maladies cardiovasculaires graves (I00-I78)	25 959	13 032	12 927	200,7	204,4	197,2	144,6	184,5	112,9
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	18 841	10 010	8 831	145,7	157,0	134,7	105,5	141,3	77,4

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-7 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Ontario¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies									
rhumatismales chroniques (I00-I09)	168	56	112	1,3	0,9	1,7	1,0	0,8	1,2
Cardiopathie hypertensive (I11)	269	121	148	2,1	1,9	2,3	1,5	1,7	1,3
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	26	11	15	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	14 229	7 902	6 327	110,0	123,9	96,5	80,0	110,9	55,6
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	5 701	3 212	2 489	44,1	50,4	38,0	32,4	44,8	22,6
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	366	188	178	2,8	2,9	2,7	2,0	2,5	1,6
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	8 162	4 502	3 660	63,1	70,6	55,8	45,6	63,6	31,4
Athérosclérose cardiovasculaire, décrite ainsi (I25.0)	140	87	53	1,1	1,4	0,8	0,8	1,2	0,5
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	8 022	4 415	3 607	62,0	69,2	55,0	44,8	62,3	31,0
Autres cardiopathies (I26-I51)	4 149	1 920	2 229	32,1	30,1	34,0	22,9	27,8	19,2
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	33	20	13	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2
Maladies du péricarde et myocardite aiguë (I30-I31, I40)	34	26	8	0,3	0,4	0,1	0,2	0,4	0,1
Insuffisance cardiaque (I50)	1 306	565	741	10,1	8,9	11,3	6,9	8,3	6,0
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	2 776	1 309	1 467	21,5	20,5	22,4	15,5	18,7	12,9
Hypertension essentielle et néphropathie hypertensive (I10, I12, I15)	611	222	389	4,7	3,5	5,9	3,2	3,2	3,2
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	5 192	2 162	3 030	40,1	33,9	46,2	28,5	31,0	26,4
Athérosclérose (I70)	369	132	237	2,9	2,1	3,6	1,9	1,9	1,9
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	946	506	440	7,3	7,9	6,7	5,4	7,1	4,0
Anévrisme aortique et dissection (I71)	557	346	211	4,3	5,4	3,2	3,2	4,9	2,0
Autres maladies des artères, des artérioles et des capillaires (I72-I78)	389	160	229	3,0	2,5	3,5	2,2	2,3	2,1
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	109	48	61	0,8	0,8	0,9	0,7	0,7	0,7
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	1 894	848	1 046	14,6	13,3	16,0	10,1	12,2	8,7
Grippe (J09-J11)	110	46	64	0,9	0,7	1,0	0,6	0,7	0,5
Pneumopathie (J12-J18)	1 784	802	982	13,8	12,6	15,0	9,5	11,6	8,2
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	14	5	9	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	5	2	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	9	3	6	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	3 665	1 914	1 751	28,3	30,0	26,7	20,7	27,3	16,6
Bronchite, chronique et non précisée (J40-J42)	38	19	19	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2
Emphysème (J43)	232	130	102	1,8	2,0	1,6	1,4	1,9	1,1
Asthme (J45-J46)	98	27	71	0,8	0,4	1,1	0,6	0,4	0,7
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	3 297	1 738	1 559	25,5	27,3	23,8	18,6	24,8	14,6
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	27	27	0	0,2	0,4	0,0	0,2	0,4	0,0
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	528	294	234	4,1	4,6	3,6	2,8	4,3	2,0
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	975	547	428	7,5	8,6	6,5	5,7	7,8	4,3
Ulcère gastro-duodénal (K25-K28)	187	102	85	1,4	1,6	1,3	1,1	1,4	0,8
Maladies de l'appendice (K35-K38)	20	7	13	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
Hernies (K40-K46)	120	55	65	0,9	0,9	1,0	0,7	0,8	0,6
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	1 072	726	346	8,3	11,4	5,3	6,7	9,6	4,0
Maladie alcoolique du foie (K70)	590	433	157	4,6	6,8	2,4	3,7	5,6	1,9
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie (K73-K74)	482	293	189	3,7	4,6	2,9	3,0	4,0	2,1
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	141	67	74	1,1	1,1	1,1	0,8	0,9	0,7
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	1 323	662	661	10,2	10,4	10,1	7,2	9,5	5,8
Syndrome néphritique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	12	6	6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	65	28	37	0,5	0,4	0,6	0,3	0,4	0,3
Insuffisance rénale (N17-N19)	1 246	628	618	9,6	9,8	9,4	6,8	9,0	5,4
Autres maladies des reins (N25, N27)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	25	5	20	0,2	0,1	0,3	0,1	0,1	0,2
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	38	0,6	0,6	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	1	0,0	0,0
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	16	0,2	0,3
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	1	0,0	0,0
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	15	0,2	0,3

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-7 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Ontario¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	447	259	188	3,5	4,1	2,9	4,5	5,1	3,9
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	362	170	192	2,8	2,7	2,9	3,1	2,9	3,2
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	810	416	394	6,3	6,5	6,0	5,0	6,1	3,9
Toutes autres maladies (résiduel) ⁷	10 155	4 153	6 002	78,5	65,1	91,6	56,4	59,6	53,0
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	3 837	2 131	1 706	29,7	33,4	26,0	23,6	31,4	16,9
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	809	559	250	6,3	8,8	3,8	5,8	8,4	3,4
Accidents de véhicule à moteur ⁸	708	478	230	5,5	7,5	3,5	5,1	7,2	3,1
Autres accidents de transport terrestre ⁹	29	21	8	0,2	0,3	0,1	0,2	0,3	0,1
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	72	60	12	0,6	0,9	0,2	0,5	0,9	0,2
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	3 028	1 572	1 456	23,4	24,7	22,2	17,8	23,0	13,5
Chutes (W00-W19)	1 553	739	814	12,0	11,6	12,4	8,4	10,6	6,7
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	2	2	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	97	71	26	0,8	1,1	0,4	0,7	1,1	0,4
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	84	46	38	0,6	0,7	0,6	0,6	0,7	0,5
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	550	348	202	4,3	5,5	3,1	3,9	5,2	2,7
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	742	366	376	5,7	5,7	5,7	4,2	5,3	3,3
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	1 025	768	257	7,9	12,0	3,9	7,3	11,2	3,6
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	111	106	5	0,9	1,7	0,1	0,8	1,5	0,1
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	914	662	252	7,1	10,4	3,8	6,5	9,7	3,5
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	167	126	41	1,3	2,0	0,6	1,3	2,0	0,7
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	61	55	6	0,5	0,9	0,1	0,5	0,9	0,1
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	106	71	35	0,8	1,1	0,5	0,8	1,1	0,6
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	5	5	0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	222	143	79	1,7	2,2	1,2	1,6	2,1	1,1
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	2	2	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	220	141	79	1,7	2,2	1,2	1,6	2,1	1,1
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	68	37	31	0,5	0,6	0,5	0,4	0,5	0,4

1. La répartition géographique des décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
2. À partir de 2005, les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité sont présentées à l'appendice II de la publication « Mortalité : liste sommaire des causes » (numéro 84F0209XIF au catalogue).
3. La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
4. Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)
5. « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics ».
6. Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
7. Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
8. Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
9. Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.

Note(s) : Voir la section Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.

Source(s) : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès (Tableau CANSIM 102-0552) et l'appendice II.

Tableau 1-8
Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Manitoba¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)^{3, 4, 5}	10 073	5 050	5 023	835,6	842,2	829,0	591,9	736,0	479,3
Infections à la salmonelle (A01-A02)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Shigellose et amibiase (A03, A06)	1	0	1	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	12	4	8	1,0	0,7	1,3	0,6	0,6	0,6
Tuberculose (A16-A19)	3	3	0	0,2	0,5	0,0	0,2	0,4	0,0
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	3	3	0	0,2	0,5	0,0	0,2	0,4	0,0
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Coqueluche (A37)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infection à méningocoques (A39)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Septicémie (A40-A41)	64	30	34	5,3	5,0	5,6	3,5	4,2	3,1
Syphilis (A50-A53)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	8	4	4	0,7	0,7	0,7	0,5	0,5	0,4
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	7	7	0	0,6	1,2	0,0	0,6	1,2	0,0
Paludisme (B50-B54)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ⁶	21	12	9	1,7	2,0	1,5	1,5	1,9	1,1
Tumeurs malignes (C00-C97)	2 654	1 360	1 294	220,2	226,8	213,6	167,5	198,3	147,1
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	26	18	8	2,2	3,0	1,3	1,7	2,7	0,8
Tumeur maligne de l'oesophage (C15)	69	59	10	5,7	9,8	1,7	4,4	8,4	1,1
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	79	57	22	6,6	9,5	3,6	4,9	8,1	2,5
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	299	161	138	24,8	26,9	22,8	19,0	23,4	15,5
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	69	44	25	5,7	7,3	4,1	4,4	6,4	3,0
Tumeur maligne du pancréas (C25)	134	57	77	11,1	9,5	12,7	8,4	8,3	8,2
Tumeur maligne du larynx (C32)	8	8	0	0,7	1,3	0,0	0,6	1,2	0,0
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	629	320	309	52,2	53,4	51,0	40,9	47,4	36,6
Mélanome malin de la peau (C43)	31	20	11	2,6	3,3	1,8	2,1	2,8	1,4
Tumeur maligne du sein (C50)	206	2	204	17,1	0,3	33,7	13,1	0,3	24,1
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	20	3,3	2,8
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	31	5,1	3,3
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	67	11,1	8,1
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	177	29,5	25,3	...
Tumeurs malignes du rein et du bassinnet du rein (C64-C65)	53	34	19	4,4	5,7	3,1	3,3	4,8	2,1
Tumeur maligne de la vessie (C67)	73	52	21	6,1	8,7	3,5	4,2	7,4	1,9
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	53	33	20	4,4	5,5	3,3	3,7	5,1	2,3
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	242	125	117	20,1	20,8	19,3	14,8	18,3	12,2
Maladie de Hodgkin (C81)	5	2	3	0,4	0,3	0,5	0,4	0,4	0,3
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	99	50	49	8,2	8,3	8,1	6,2	7,3	5,3
Leucémie (C91-C95)	89	48	41	7,4	8,0	6,8	5,3	6,9	4,3
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	48	24	24	4,0	4,0	4,0	2,9	3,5	2,3
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	1	1	0	0,1	0,2	0,0	0,1	0,2	0,0
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	388	193	195	32,2	32,2	32,2	24,2	28,4	21,3
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	92	37	55	7,6	6,2	9,1	5,4	5,4	5,7
Anémies (D50-D64)	23	8	15	1,9	1,3	2,5	1,1	1,1	1,0
Diabète sucré (E10-E14)	386	201	185	32,0	33,5	30,5	23,4	29,5	18,3
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	15	5	10	1,2	0,8	1,7	0,8	0,7	1,0
Malnutrition (E40-E46)	10	3	7	0,8	0,5	1,2	0,6	0,4	0,8
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	5	2	3	0,4	0,3	0,5	0,2	0,3	0,2
Méningite (G00, G03)	2	2	0	0,2	0,3	0,0	0,2	0,3	0,0
Maladie de Parkinson (G20-G21)	58	33	25	4,8	5,5	4,1	3,2	4,7	2,1
Maladie d'Alzheimer (G30)	170	52	118	14,1	8,7	19,5	7,9	7,2	8,3
Maladies cardiovasculaires graves (I00-I78)	3 099	1 618	1 481	257,1	269,8	244,4	170,5	231,1	122,0
Maladies du coeur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2 286	1 267	1 019	189,6	211,3	168,2	128,2	181,5	85,6

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-8 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Manitoba¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies									
rhumatismales chroniques (I00-I09)	20	12	8	1,7	2,0	1,3	1,3	1,8	0,9
Cardiopathie hypertensive (I11)	63	27	36	5,2	4,5	5,9	3,3	3,8	2,9
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	7	3	4	0,6	0,5	0,7	0,4	0,4	0,4
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	1 601	951	650	132,8	158,6	107,3	91,7	136,4	55,8
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	604	358	246	50,1	59,7	40,6	34,5	51,2	21,2
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	32	16	16	2,7	2,7	2,6	1,8	2,3	1,4
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	965	577	388	80,0	96,2	64,0	55,4	82,9	33,3
Athérosclérose cardiovasculaire, décrite ainsi (I25.0)	33	17	16	2,7	2,8	2,6	2,0	2,5	1,7
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	932	560	372	77,3	93,4	61,4	53,4	80,4	31,6
Autres cardiopathies (I26-I51)	595	274	321	49,4	45,7	53,0	31,6	39,1	25,6
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	5	2	3	0,4	0,3	0,5	0,3	0,2	0,5
Maladies du péricarde et myocardite aiguë (I30-I31, I40)	5	2	3	0,4	0,3	0,5	0,4	0,3	0,5
Insuffisance cardiaque (I50)	210	88	122	17,4	14,7	20,1	9,8	12,1	8,4
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	375	182	193	31,1	30,4	31,9	21,1	26,5	16,3
Hypertension essentielle et néphropathie hypertensive (I10, I12, I15)	65	20	45	5,4	3,3	7,4	2,8	2,7	2,8
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	618	266	352	51,3	44,4	58,1	32,0	37,5	27,6
Athérosclérose (I70)	21	9	12	1,7	1,5	2,0	1,0	1,3	0,8
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	109	56	53	9,0	9,3	8,7	6,5	8,1	5,2
Anévrisme aortique et dissection (I71)	71	36	35	5,9	6,0	5,8	4,4	5,3	3,6
Autres maladies des artères, des artérioles et des capillaires (I72-I78)	38	20	18	3,2	3,3	3,0	2,1	2,8	1,7
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	21	7	14	1,7	1,2	2,3	1,4	1,1	1,8
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	236	108	128	19,6	18,0	21,1	12,0	15,1	10,0
Grippe (J09-J11)	3	1	2	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1
Pneumopathie (J12-J18)	233	107	126	19,3	17,8	20,8	11,9	15,0	9,9
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	2	2	0	0,2	0,3	0,0	0,1	0,2	0,0
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	1	1	0	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	1	1	0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	444	227	217	36,8	37,9	35,8	24,4	32,5	18,8
Bronchite, chronique et non précisée (J40-J42)	5	0	5	0,4	0,0	0,8	0,2	0,0	0,3
Emphysème (J43)	27	12	15	2,2	2,0	2,5	1,6	1,8	1,5
Asthme (J45-J46)	11	2	9	0,9	0,3	1,5	0,6	0,3	0,8
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	401	213	188	33,3	35,5	31,0	22,0	30,4	16,2
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	1	0	1	0,1	0,0	0,2	0,1	0,0	0,2
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	67	38	29	5,6	6,3	4,8	3,4	5,1	2,4
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	122	66	56	10,1	11,0	9,2	7,2	9,7	5,5
Ulcère gastro-duodénal (K25-K28)	28	16	12	2,3	2,7	2,0	1,7	2,3	1,2
Maladies de l'appendice (K35-K38)	2	0	2	0,2	0,0	0,3	0,2	0,0	0,3
Hernies (K40-K46)	17	8	9	1,4	1,3	1,5	0,9	1,1	0,8
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	120	77	43	10,0	12,8	7,1	8,3	11,3	5,6
Maladie alcoolique du foie (K70)	58	40	18	4,8	6,7	3,0	4,1	5,9	2,5
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie (K73-K74)	62	37	25	5,1	6,2	4,1	4,2	5,5	3,1
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	16	8	8	1,3	1,3	1,3	0,8	1,0	0,6
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	162	75	87	13,4	12,5	14,4	8,9	10,6	8,1
Syndrome néphrotique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	1	0	1	0,1	0,0	0,2	0,1	0,0	0,2
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	2	0	2	0,2	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1
Insuffisance rénale (N17-N19)	159	75	84	13,2	12,5	13,9	8,7	10,6	7,8
Autres maladies des reins (N25, N27)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	3	2	1	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	4	0,7	0,5	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	0	0,0	0,0
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	0	0,0	0,0
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	0	0,0	0,0
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	0	0,0	0,0

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-8 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Manitoba¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	51	27	24	4,2	4,5	4,0	4,7	4,9	4,5
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	52	24	28	4,3	4,0	4,6	4,4	4,1	4,7
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	159	64	95	13,2	10,7	15,7	8,1	9,1	7,6
Toutes autres maladies (résiduel) ⁷	1 178	440	738	97,7	73,4	121,8	62,4	62,6	61,5
Accidents de transport (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	501	292	209	41,6	48,7	34,5	33,8	46,6	21,0
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	115	85	30	9,5	14,2	5,0	9,4	14,1	4,6
Accidents de véhicule à moteur ⁸	100	71	29	8,3	11,8	4,8	8,1	11,7	4,4
Autres accidents de transport terrestre ⁹	3	3	0	0,2	0,5	0,0	0,3	0,5	0,0
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	12	11	1	1,0	1,8	0,2	1,1	1,9	0,2
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	386	207	179	32,0	34,5	29,5	24,4	32,4	16,4
Chutes (W00-W19)	178	68	110	14,8	11,3	18,2	9,2	10,0	8,4
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	2	2	0	0,2	0,3	0,0	0,2	0,3	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	16	14	2	1,3	2,3	0,3	1,5	2,6	0,4
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	20	13	7	1,7	2,2	1,2	1,6	2,2	0,8
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	90	58	32	7,5	9,7	5,3	6,8	9,1	4,4
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	80	52	28	6,6	8,7	4,6	5,1	8,2	2,4
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	157	102	55	13,0	17,0	9,1	12,5	16,4	8,9
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	20	20	0	1,7	3,3	0,0	1,4	2,9	0,0
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	137	82	55	11,4	13,7	9,1	11,1	13,6	8,9
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	61	55	6	5,1	9,2	1,0	5,5	9,6	1,3
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	21	18	3	1,7	3,0	0,5	2,1	3,4	0,7
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	40	37	3	3,3	6,2	0,5	3,5	6,3	0,6
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	1	1	0	0,1	0,2	0,0	0,1	0,2	0,0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	35	20	15	2,9	3,3	2,5	2,9	3,1	2,7
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	3	1	2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,1	0,4
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	32	19	13	2,7	3,2	2,1	2,6	2,9	2,3
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	18	11	7	1,5	1,8	1,2	1,1	1,6	0,8

1. La répartition géographique des décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
2. À partir de 2005, les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité sont présentées à l'appendice II de la publication « Mortalité : liste sommaire des causes » (numéro 84F0209XIF au catalogue).
3. La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
4. Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)
5. « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics ».
6. Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
7. Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
8. Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
9. Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.

Note(s) : Voir la section Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.

Source(s) : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès (Tableau CANSIM 102-0552) et l'appendice II.

Tableau 1-9
Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Saskatchewan¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)^{3, 4, 5}	9 243	4 747	4 496	911,7	943,7	880,2	595,6	747,7	471,0
Infections à la salmonelle (A01-A02)	1	0	1	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	9	4	5	0,9	0,8	1,0	0,4	0,6	0,3
Tuberculose (A16-A19)	6	3	3	0,6	0,6	0,6	0,4	0,4	0,3
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	6	3	3	0,6	0,6	0,6	0,4	0,4	0,3
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Coqueluche (A37)	1	0	1	0,1	0,0	0,2	0,1	0,0	0,2
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infection à méningocoques (A39)	1	0	1	0,1	0,0	0,2	0,1	0,0	0,2
Septicémie (A40-A41)	96	54	42	9,5	10,7	8,2	6,2	8,9	4,1
Syphilis (A50-A53)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	14	5	9	1,4	1,0	1,8	1,2	0,9	1,5
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	16	10	6	1,6	2,0	1,2	1,8	2,2	1,4
Paludisme (B50-B54)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ⁶	18	8	10	1,8	1,6	2,0	1,2	1,3	0,9
Tumeurs malignes (C00-C97)	2 255	1 229	1 026	222,4	244,3	200,9	159,0	194,6	132,4
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	23	18	5	2,3	3,6	1,0	1,7	2,9	0,8
Tumeur maligne de l'oesophage (C15)	59	49	10	5,8	9,7	2,0	4,5	8,1	1,5
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	52	35	17	5,1	7,0	3,3	3,7	5,6	2,1
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	211	119	92	20,8	23,7	18,0	13,9	18,6	10,4
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	63	37	26	6,2	7,4	5,1	4,4	5,7	3,1
Tumeur maligne du pancréas (C25)	129	64	65	12,7	12,7	12,7	9,4	10,6	8,1
Tumeur maligne du larynx (C32)	12	9	3	1,2	1,8	0,6	1,0	1,5	0,5
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	532	290	242	52,5	57,7	47,4	38,5	46,0	32,5
Mélanome malin de la peau (C43)	25	16	9	2,5	3,2	1,8	1,9	2,7	1,1
Tumeur maligne du sein (C50)	173	1	172	17,1	0,2	33,7	11,8	0,1	21,8
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	16	3,1	2,5
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	20	3,9	2,5
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	48	9,4	6,8
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	198	39,4	29,6	...
Tumeurs malignes du rein et du bassinnet du rein (C64-C65)	61	41	20	6,0	8,2	3,9	4,6	6,7	2,7
Tumeur maligne de la vessie (C67)	68	49	19	6,7	9,7	3,7	4,6	7,7	2,3
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	48	28	20	4,7	5,6	3,9	4,0	5,1	2,9
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	202	115	87	19,9	22,9	17,0	14,6	18,4	11,3
Maladie de Hodgkin (C81)	6	2	4	0,6	0,4	0,8	0,4	0,4	0,4
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	80	47	33	7,9	9,3	6,5	5,8	7,7	4,2
Leucémie (C91-C95)	84	48	36	8,3	9,5	7,0	6,0	7,5	4,8
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	32	18	14	3,2	3,6	2,7	2,4	2,8	2,0
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	315	160	155	31,1	31,8	30,3	21,8	25,3	19,4
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	68	45	23	6,7	8,9	4,5	4,5	7,1	2,4
Anémies (D50-D64)	25	3	22	2,5	0,6	4,3	1,2	0,4	1,7
Diabète sucré (E10-E14)	297	155	142	29,3	30,8	27,8	18,7	23,6	14,7
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	6	2	4	0,6	0,4	0,8	0,3	0,3	0,3
Malnutrition (E40-E46)	5	2	3	0,5	0,4	0,6	0,3	0,3	0,3
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	1	0	1	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1
Méningite (G00, G03)	2	2	0	0,2	0,4	0,0	0,2	0,4	0,0
Maladie de Parkinson (G20-G21)	62	41	21	6,1	8,2	4,1	3,7	6,2	1,8
Maladie d'Alzheimer (G30)	243	86	157	24,0	17,1	30,7	11,9	11,8	11,6
Maladies cardiovasculaires graves (I00-I78)	2 933	1 484	1 449	289,3	295,0	283,7	171,9	224,6	129,4
Maladies du coeur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2 149	1 131	1 018	212,0	224,8	199,3	127,4	172,3	90,9

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-9 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Saskatchewan¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies									
rhumatismales chroniques (I00-I09)	9	4	5	0,9	0,8	1,0	0,6	0,8	0,5
Cardiopathie hypertensive (I11)	54	19	35	5,3	3,8	6,9	2,9	2,9	2,7
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	8	3	5	0,8	0,6	1,0	0,3	0,4	0,3
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	1 415	815	600	139,6	162,0	117,5	87,2	125,9	55,4
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	462	264	198	45,6	52,5	38,8	28,9	41,1	18,7
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	18	8	10	1,8	1,6	2,0	1,1	1,3	1,0
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	935	543	392	92,2	107,9	76,7	57,1	83,5	35,7
Athérosclérose cardiovasculaire, décrite ainsi (I25.0)	230	156	74	22,7	31,0	14,5	16,0	25,1	8,1
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	705	387	318	69,5	76,9	62,3	41,1	58,4	27,6
Autres cardiopathies (I26-I51)	663	290	373	65,4	57,7	73,0	36,4	42,4	32,0
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	3	0	3	0,3	0,0	0,6	0,3	0,0	0,6
Maladies du péricarde et myocarde aiguë (I30-I31, I40)	4	1	3	0,4	0,2	0,6	0,3	0,1	0,4
Insuffisance cardiaque (I50)	327	140	187	32,3	27,8	36,6	16,2	19,7	13,8
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	329	149	180	32,5	29,6	35,2	19,7	22,6	17,2
Hypertension essentielle et néphropathie hypertensive (I10, I12, I15)	107	41	66	10,6	8,2	12,9	6,1	6,0	6,2
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	561	240	321	55,3	47,7	62,8	31,2	35,0	28,4
Athérosclérose (I70)	23	12	11	2,3	2,4	2,2	1,2	1,8	0,8
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	93	60	33	9,2	11,9	6,5	6,0	9,4	3,1
Anévrisme aortique et dissection (I71)	60	47	13	5,9	9,3	2,5	4,1	7,5	1,4
Autres maladies des artères, des artérioles et des capillaires (I72-I78)	33	13	20	3,3	2,6	3,9	1,9	2,0	1,8
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	14	8	6	1,4	1,6	1,2	0,9	1,3	0,5
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	249	126	123	24,6	25,0	24,1	13,4	17,8	10,9
Grippe (J09-J11)	9	5	4	0,9	1,0	0,8	0,5	0,7	0,5
Pneumopathie (J12-J18)	240	121	119	23,7	24,1	23,3	12,9	17,1	10,3
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	5	1	4	0,5	0,2	0,8	0,2	0,1	0,3
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	5	1	4	0,5	0,2	0,8	0,2	0,1	0,3
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	424	232	192	41,8	46,1	37,6	26,4	34,8	21,1
Bronchite, chronique et non précisée (J40-J42)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Empysème (J43)	38	22	16	3,7	4,4	3,1	2,6	3,3	2,2
Asthme (J45-J46)	5	2	3	0,5	0,4	0,6	0,3	0,3	0,3
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	381	208	173	37,6	41,4	33,9	23,6	31,2	18,7
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	5	5	0	0,5	1,0	0,0	0,4	0,8	0,0
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	38	24	14	3,7	4,8	2,7	2,3	3,7	1,3
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	121	63	58	11,9	12,5	11,4	7,5	9,6	5,8
Ulcère gastro-duodénal (K25-K28)	24	13	11	2,4	2,6	2,2	1,5	2,1	1,0
Maladies de l'appendice (K35-K38)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hernies (K40-K46)	11	5	6	1,1	1,0	1,2	0,6	0,7	0,6
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	107	65	42	10,6	12,9	8,2	8,6	10,8	6,6
Maladie alcoolique du foie (K70)	56	36	20	5,5	7,2	3,9	4,7	6,0	3,6
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie (K73-K74)	51	29	22	5,0	5,8	4,3	3,9	4,7	3,1
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	15	6	9	1,5	1,2	1,8	0,9	0,9	1,0
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	186	100	86	18,3	19,9	16,8	10,9	14,9	7,9
Syndrome néphritique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	5	2	3	0,5	0,4	0,6	0,2	0,3	0,2
Insuffisance rénale (N17-N19)	181	98	83	17,9	19,5	16,2	10,7	14,7	7,7
Autres maladies des reins (N25, N27)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	3	0	3	0,3	0,0	0,6	0,2	0,0	0,4
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	4	0,8	0,5	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	1	0,2	0,2
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	2	0,4	0,5
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	1	0,2	0,3

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-9 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Saskatchewan¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	1	0,2	0,3
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	41	22	19	4,0	4,4	3,7	4,3	4,5	4,0
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	32	18	14	3,2	3,6	2,7	3,1	3,6	2,7
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	114	33	81	11,2	6,6	15,9	6,2	5,0	6,9
Toutes autres maladies (résiduel) ⁷	1 085	455	630	107,0	90,5	123,3	64,5	70,9	57,1
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	529	305	224	52,2	60,6	43,9	42,4	56,1	29,5
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	180	121	59	17,8	24,1	11,6	17,8	24,5	11,5
Accidents de véhicule à moteur ⁸	169	110	59	16,7	21,9	11,6	16,8	22,3	11,5
Autres accidents de transport terrestre ⁹	3	3	0	0,3	0,6	0,0	0,4	0,8	0,0
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	8	8	0	0,8	1,6	0,0	0,7	1,4	0,0
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	349	184	165	34,4	36,6	32,3	24,6	31,7	18,0
Chutes (W00-W19)	158	67	91	15,6	13,3	17,8	8,5	10,0	7,3
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	4	4	0	0,4	0,8	0,0	0,5	0,9	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	10	9	1	1,0	1,8	0,2	1,0	1,8	0,2
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	16	8	8	1,6	1,6	1,6	1,8	1,8	1,7
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	67	41	26	6,6	8,2	5,1	6,4	7,9	4,8
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	94	55	39	9,3	10,9	7,6	6,4	9,2	3,8
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	131	89	42	12,9	17,7	8,2	12,8	17,7	8,1
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	18	17	1	1,8	3,4	0,2	1,7	3,2	0,2
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	113	72	41	11,1	14,3	8,0	11,1	14,5	7,9
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	24	22	2	2,4	4,4	0,4	2,6	4,8	0,4
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	2	2	0	0,2	0,4	0,0	0,3	0,5	0,0
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	22	20	2	2,2	4,0	0,4	2,3	4,2	0,4
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	2	1	1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	18	14	4	1,8	2,8	0,8	1,7	2,8	0,7
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	1	1	0	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	17	13	4	1,7	2,6	0,8	1,7	2,7	0,7
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	5	5	0	0,5	1,0	0,0	0,3	0,7	0,0

1. La répartition géographique des décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
2. À partir de 2005, les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité sont présentées à l'appendice II de la publication « Mortalité : liste sommaire des causes » (numéro 84F0209XIF au catalogue).
3. La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
4. Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10) « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics ».
5. Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
6. Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
7. Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
8. Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.

Note(s) : Voir la section Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.

Source(s) : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès (Tableau CANSIM 102-0552) et l'appendice II.

Tableau 1-10

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Alberta¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)^{3, 4, 5}	21 079	11 000	10 079	586,9	600,1	573,2	546,1	664,8	448,2
Infections à la salmonelle (A01-A02)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	35	13	22	1,0	0,7	1,3	0,8	0,8	0,9
Tuberculose (A16-A19)	12	6	6	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	7	3	4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	5	3	2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1
Coqueluche (A37)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infection à méningocoques (A39)	2	2	0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Septicémie (A40-A41)	179	88	91	5,0	4,8	5,2	4,6	5,3	4,0
Syphilis (A50-A53)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	35	26	9	1,0	1,4	0,5	0,8	1,2	0,4
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	49	40	9	1,4	2,2	0,5	1,2	1,8	0,5
Paludisme (B50-B54)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ⁶	43	21	22	1,2	1,1	1,3	1,1	1,2	1,0
Tumeurs malignes (C00-C97)	5 656	2 966	2 690	157,5	161,8	153,0	153,1	179,8	133,5
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	84	63	21	2,3	3,4	1,2	2,2	3,4	1,0
Tumeur maligne de l'oesophage (C15)	166	128	38	4,6	7,0	2,2	4,6	7,5	2,0
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	159	108	51	4,4	5,9	2,9	4,2	6,5	2,4
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	563	330	233	15,7	18,0	13,3	15,0	20,0	10,6
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	182	106	76	5,1	5,8	4,3	4,8	6,0	3,7
Tumeur maligne du pancréas (C25)	307	158	149	8,5	8,6	8,5	8,5	9,6	7,6
Tumeur maligne du larynx (C32)	27	23	4	0,8	1,3	0,2	0,8	1,4	0,2
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	1 369	703	666	38,1	38,4	37,9	38,0	42,7	34,7
Mélanome malin de la peau (C43)	71	46	25	2,0	2,5	1,4	1,9	2,6	1,3
Tumeur maligne du sein (C50)	406	3	403	11,3	0,2	22,9	10,5	0,2	19,5
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	34	1,9	1,7
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	67	3,8	3,5
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	143	8,1	7,1
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	362	19,8	23,3	...
Tumeurs malignes du rein et du bassinnet du rein (C64-C65)	140	89	51	3,9	4,9	2,9	3,7	5,1	2,5
Tumeur maligne de la vessie (C67)	136	97	39	3,8	5,3	2,2	3,8	6,3	1,9
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	158	101	57	4,4	5,5	3,2	4,3	5,7	3,1
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	518	275	243	14,4	15,0	13,8	14,3	16,8	12,1
Maladie de Hodgkin (C81)	7	4	3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	212	110	102	5,9	6,0	5,8	5,8	6,6	5,0
Leucémie (C91-C95)	203	116	87	5,7	6,3	4,9	5,6	7,3	4,3
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	96	45	51	2,7	2,5	2,9	2,7	2,7	2,7
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	764	374	390	21,3	20,4	22,2	20,4	22,7	18,5
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	125	66	59	3,5	3,6	3,4	3,3	4,1	2,7
Anémies (D50-D64)	42	22	20	1,2	1,2	1,1	1,0	1,5	0,8
Diabète sucré (E10-E14)	454	235	219	12,6	12,8	12,5	12,1	14,5	10,1
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	17	8	9	0,5	0,4	0,5	0,4	0,5	0,3
Malnutrition (E40-E46)	15	6	9	0,4	0,3	0,5	0,4	0,4	0,3
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	2	2	0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0
Méningite (G00, G03)	5	3	2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1
Maladie de Parkinson (G20-G21)	111	69	42	3,1	3,8	2,4	2,9	4,5	1,8
Maladie d'Alzheimer (G30)	450	145	305	12,5	7,9	17,3	10,8	9,5	11,5
Maladies cardiovasculaires graves (I00-I78)	6 582	3 323	3 259	183,3	181,3	185,3	166,4	206,6	132,3
Maladies du coeur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	4 871	2 596	2 275	135,6	141,6	129,4	123,7	160,0	93,0

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-10 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Alberta¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies									
rhumatismales chroniques (I00-I09)	24	7	17	0,7	0,4	1,0	0,6	0,4	0,8
Cardiopathie hypertensive (I11)	66	29	37	1,8	1,6	2,1	1,6	1,7	1,4
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	7	2	5	0,2	0,1	0,3	0,2	0,1	0,2
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	3 808	2 134	1 674	106,0	116,4	95,2	97,3	130,8	69,0
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	1 197	697	500	33,3	38,0	28,4	30,9	43,0	21,1
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	21	15	6	0,6	0,8	0,3	0,5	0,9	0,2
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	2 590	1 422	1 168	72,1	77,6	66,4	65,9	87,0	47,7
Athérosclérose cardiovasculaire, décrite ainsi (I25.0)	796	478	318	22,2	26,1	18,1	21,1	28,7	14,3
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	1 794	944	850	50,0	51,5	48,3	44,8	58,2	33,4
Autres cardiopathies (I26-I51)	966	424	542	26,9	23,1	30,8	24,0	26,9	21,5
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	9	4	5	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2
Maladies du péricarde et myocardite aiguë (I30-I31, I40)	13	9	4	0,4	0,5	0,2	0,3	0,5	0,2
Insuffisance cardiaque (I50)	376	154	222	10,5	8,4	12,6	9,0	10,1	8,1
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	568	257	311	15,8	14,0	17,7	14,4	16,1	12,9
Hypertension essentielle et néphropathie hypertensive (I10, I12, I15)	153	61	92	4,3	3,3	5,2	3,8	4,0	3,6
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	1 173	493	680	32,7	26,9	38,7	29,2	31,4	27,6
Athérosclérose (I70)	192	68	124	5,3	3,7	7,1	4,6	4,6	4,2
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	193	105	88	5,4	5,7	5,0	5,1	6,7	3,9
Anévrisme aortique et dissection (I71)	125	76	49	3,5	4,1	2,8	3,4	4,8	2,3
Autres maladies des artères, des artérioles et des capillaires (I72-I78)	68	29	39	1,9	1,6	2,2	1,7	1,9	1,7
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	23	13	10	0,6	0,7	0,6	0,6	0,8	0,4
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	487	228	259	13,6	12,4	14,7	11,8	14,6	10,3
Grippe (J09-J11)	18	9	9	0,5	0,5	0,5	0,4	0,6	0,4
Pneumopathie (J12-J18)	469	219	250	13,1	11,9	14,2	11,3	14,0	10,0
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	3	3	0	0,1	0,2	0,0	0,1	0,2	0,0
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	1	1	0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	2	2	0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	991	533	458	27,6	29,1	26,0	26,2	34,5	21,4
Bronchite, chronique et non précisée (J40-J42)	3	1	2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Emphysème (J43)	56	33	23	1,6	1,8	1,3	1,5	2,2	1,2
Asthme (J45-J46)	26	10	16	0,7	0,5	0,9	0,7	0,6	0,7
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	906	489	417	25,2	26,7	23,7	23,9	31,7	19,4
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	23	14	9	0,6	0,8	0,5	0,5	0,8	0,4
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	224	131	93	6,2	7,1	5,3	5,6	8,6	3,7
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	207	103	104	5,8	5,6	5,9	5,5	6,6	4,7
Ulcère gastro-duodénal (K25-K28)	45	23	22	1,3	1,3	1,3	1,2	1,4	1,0
Maladies de l'appendice (K35-K38)	3	3	0	0,1	0,2	0,0	0,1	0,2	0,0
Hernies (K40-K46)	24	14	10	0,7	0,8	0,6	0,6	0,9	0,4
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	270	170	100	7,5	9,3	5,7	6,8	8,8	5,0
Maladie alcoolique du foie (K70)	162	112	50	4,5	6,1	2,8	4,0	5,5	2,5
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie (K73-K74)	108	58	50	3,0	3,2	2,8	2,9	3,2	2,5
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	20	5	15	0,6	0,3	0,9	0,5	0,3	0,6
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	332	164	168	9,2	8,9	9,6	8,3	10,6	6,8
Syndrome néphrotique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	4	2	2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1
Insuffisance rénale (N17-N19)	328	162	166	9,1	8,8	9,4	8,2	10,5	6,7
Autres maladies des reins (N25, N27)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	8	2	6	0,2	0,1	0,3	0,2	0,1	0,3
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	8	0,4	0,5	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	2	0,1	0,1
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	6	0,3	0,4
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	1	0,1	0,1
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	5	0,3	0,3

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-10 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Alberta¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	185	94	91	5,2	5,1	5,2	5,2	5,1	5,3
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	107	52	55	3,0	2,8	3,1	2,9	2,8	3,1
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	153	76	77	4,3	4,1	4,4	3,9	4,4	3,4
Toutes autres maladies (résiduel) ⁷	2 255	961	1 294	62,8	52,4	73,6	56,1	58,5	53,3
Accidents de transport (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	973	683	290	27,1	37,3	16,5	25,7	37,8	14,1
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	473	368	105	13,2	20,1	6,0	12,8	19,6	5,8
Accidents de véhicule à moteur ⁸	428	327	101	11,9	17,8	5,7	11,5	17,3	5,6
Autres accidents de transport terrestre ⁹	12	12	0	0,3	0,7	0,0	0,3	0,7	0,0
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	33	29	4	0,9	1,6	0,2	0,9	1,6	0,3
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	500	315	185	13,9	17,2	10,5	12,9	18,2	8,3
Chutes (W00-W19)	165	103	62	4,6	5,6	3,5	4,1	6,0	2,6
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	2	2	0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	30	24	6	0,8	1,3	0,3	0,8	1,4	0,3
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	20	13	7	0,6	0,7	0,4	0,5	0,7	0,4
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	55	38	17	1,5	2,1	1,0	1,5	2,1	0,9
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	228	135	93	6,3	7,4	5,3	5,9	8,0	4,1
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	487	370	117	13,6	20,2	6,7	12,7	19,1	6,3
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	90	89	1	2,5	4,9	0,1	2,2	4,5	0,0
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	397	281	116	11,1	15,3	6,6	10,5	14,5	6,2
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	111	90	21	3,1	4,9	1,2	3,1	4,9	1,2
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	39	35	4	1,1	1,9	0,2	1,1	1,9	0,2
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	72	55	17	2,0	3,0	1,0	2,0	3,0	1,0
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	2	2	0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	302	212	90	8,4	11,6	5,1	7,9	10,8	4,8
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	1	1	0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	301	211	90	8,4	11,5	5,1	7,8	10,7	4,8
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	31	13	18	0,9	0,7	1,0	0,8	0,8	0,9

- La répartition géographique des décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
- À partir de 2005, les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité sont présentées à l'appendice II de la publication « Mortalité : liste sommaire des causes » (numéro 84F0209XIF au catalogue).
- La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
- Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)
- « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics ».
- Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
- Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
- Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
- Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.

Note(s) : Voir la section Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.

Source(s) : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès (Tableau CANSIM 102-0552) et l'appendice II.

Tableau 1-11

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Colombie-Britannique¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)^{3, 4, 5}	32 095	16 420	15 675	732,1	755,5	709,1	508,1	613,1	419,5
Infections à la salmonelle (A01-A02)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	128	58	70	2,9	2,7	3,2	1,8	2,1	1,6
Tuberculose (A16-A19)	16	9	7	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	16	9	7	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Coqueluche (A37)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infection à méningocoques (A39)	2	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Septicémie (A40-A41)	223	100	123	5,1	4,6	5,6	3,5	3,7	3,3
Syphilis (A50-A53)	1	1	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	118	81	37	2,7	3,7	1,7	1,9	2,7	1,1
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	89	69	20	2,0	3,2	0,9	1,7	2,6	0,8
Paludisme (B50-B54)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ⁶	61	30	31	1,4	1,4	1,4	1,0	1,2	0,9
Tumeurs malignes (C00-C97)	8 878	4 738	4 140	202,5	218,0	187,3	147,4	173,7	127,8
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	159	114	45	3,6	5,2	2,0	2,7	4,2	1,4
Tumeur maligne de l'oesophage (C15)	287	222	65	6,5	10,2	2,9	4,7	7,9	2,0
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	215	122	93	4,9	5,6	4,2	3,6	4,5	2,8
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	1 016	558	458	23,2	25,7	20,7	16,5	20,5	12,9
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	262	174	88	6,0	8,0	4,0	4,4	6,3	2,7
Tumeur maligne du pancréas (C25)	488	237	251	11,1	10,9	11,4	8,1	8,6	7,6
Tumeur maligne du larynx (C32)	50	44	6	1,1	2,0	0,3	0,9	1,6	0,2
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	2 240	1 201	1 039	51,1	55,3	47,0	37,8	44,0	33,1
Mélanome malin de la peau (C43)	110	78	32	2,5	3,6	1,4	1,9	3,0	1,0
Tumeur maligne du sein (C50)	590	6	584	13,5	0,3	26,4	9,7	0,2	18,0
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	42	1,9	1,4
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	87	3,9	2,8
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	246	11,1	7,7
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	502	23,1	18,4	...
Tumeurs malignes du rein et du bassinnet du rein (C64-C65)	203	135	68	4,6	6,2	3,1	3,5	5,0	2,3
Tumeur maligne de la vessie (C67)	270	197	73	6,2	9,1	3,3	4,3	7,3	2,1
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	240	126	114	5,5	5,8	5,2	4,3	4,6	4,1
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	772	438	334	17,6	20,2	15,1	12,8	16,2	10,2
Maladie de Hodgkin (C81)	10	5	5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	304	172	132	6,9	7,9	6,0	5,0	6,3	3,9
Leucémie (C91-C95)	315	184	131	7,2	8,5	5,9	5,4	6,9	4,2
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	143	77	66	3,3	3,5	3,0	2,3	2,8	2,0
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	1 099	584	515	25,1	26,9	23,3	18,2	21,6	15,7
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	190	114	76	4,3	5,2	3,4	3,0	4,2	2,2
Anémies (D50-D64)	67	24	43	1,5	1,1	1,9	0,9	0,9	1,0
Diabète sucré (E10-E14)	988	545	443	22,5	25,1	20,0	15,8	20,3	12,1
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	23	9	14	0,5	0,4	0,6	0,3	0,3	0,3
Malnutrition (E40-E46)	19	8	11	0,4	0,4	0,5	0,3	0,3	0,3
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	4	1	3	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1
Méningite (G00, G03)	8	5	3	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1
Maladie de Parkinson (G20-G21)	277	148	129	6,3	6,8	5,8	4,2	5,4	3,3
Maladie d'Alzheimer (G30)	708	226	482	16,2	10,4	21,8	9,7	8,1	10,7
Maladies cardiovasculaires graves (I00-I78)	10 062	4 922	5 140	229,5	226,5	232,5	148,1	180,1	120,2
Maladies du coeur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	7 037	3 639	3 398	160,5	167,4	153,7	104,0	132,9	79,2

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-11 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Colombie-Britannique¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies									
rhumatismales chroniques (I00-I09)	80	32	48	1,8	1,5	2,2	1,3	1,2	1,4
Cardiopathie hypertensive (I11)	109	41	68	2,5	1,9	3,1	1,6	1,5	1,6
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	23	10	13	0,5	0,5	0,6	0,3	0,4	0,3
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	4 756	2 629	2 127	108,5	121,0	96,2	71,1	95,6	50,0
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	2 200	1 243	957	50,2	57,2	43,3	33,3	45,2	23,1
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	99	52	47	2,3	2,4	2,1	1,5	1,9	1,1
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	2 457	1 334	1 123	56,0	61,4	50,8	36,4	48,6	25,8
Athérosclérose cardiovasculaire, décrite ainsi (I25.0)	173	116	57	3,9	5,3	2,6	2,9	4,2	1,6
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	2 284	1 218	1 066	52,1	56,0	48,2	33,5	44,4	24,2
Autres cardiopathies (I26-I51)	2 069	927	1 142	47,2	42,7	51,7	29,8	34,3	26,0
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	13	6	7	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2
Maladies du péricarde et myocardite aiguë (I30-I31, I40)	16	12	4	0,4	0,6	0,2	0,3	0,5	0,2
Insuffisance cardiaque (I50)	785	324	461	17,9	14,9	20,9	10,6	11,7	9,6
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	1 255	585	670	28,6	26,9	30,3	18,6	21,8	16,0
Hypertension essentielle et néphropathie hypertensive (I10, I12, I15)	227	90	137	5,2	4,1	6,2	3,2	3,3	3,1
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	2 311	936	1 375	52,7	43,1	62,2	33,4	34,5	32,0
Athérosclérose (I70)	88	42	46	2,0	1,9	2,1	1,2	1,5	1,0
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	399	215	184	9,1	9,9	8,3	6,2	7,8	4,8
Anévrisme aortique et dissection (I71)	246	146	100	5,6	6,7	4,5	3,9	5,3	2,8
Autres maladies des artères, des artérioles et des capillaires (I72-I78)	153	69	84	3,5	3,2	3,8	2,3	2,5	2,1
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	34	17	17	0,8	0,8	0,8	0,6	0,7	0,4
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	870	407	463	19,8	18,7	20,9	12,5	15,1	10,8
Grippe (J09-J11)	28	12	16	0,6	0,6	0,7	0,4	0,4	0,3
Pneumopathie (J12-J18)	842	395	447	19,2	18,2	20,2	12,1	14,7	10,5
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	7	2	5	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	3	0	3	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	4	2	2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	1 564	827	737	35,7	38,1	33,3	24,0	30,5	19,4
Bronchite, chronique et non précisée (J40-J42)	10	4	6	0,2	0,2	0,3	0,1	0,2	0,1
Emphysème (J43)	98	49	49	2,2	2,3	2,2	1,6	1,8	1,4
Asthme (J45-J46)	60	22	38	1,4	1,0	1,7	0,9	0,9	1,0
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	1 396	752	644	31,8	34,6	29,1	21,3	27,7	16,9
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	11	10	1	0,3	0,5	0,0	0,2	0,4	0,1
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	230	129	101	5,2	5,9	4,6	3,3	4,7	2,3
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	336	186	150	7,7	8,6	6,8	5,4	6,9	4,1
Ulcère gastro-duodénal (K25-K28)	60	33	27	1,4	1,5	1,2	0,9	1,2	0,7
Maladies de l'appendice (K35-K38)	5	4	1	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0
Hernies (K40-K46)	38	19	19	0,9	0,9	0,9	0,5	0,7	0,4
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	388	248	140	8,9	11,4	6,3	6,7	8,8	4,7
Maladie alcoolique du foie (K70)	269	178	91	6,1	8,2	4,1	4,7	6,3	3,2
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie (K73-K74)	119	70	49	2,7	3,2	2,2	2,0	2,6	1,6
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	50	31	19	1,1	1,4	0,9	0,7	1,1	0,4
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	427	207	220	9,7	9,5	10,0	6,3	7,6	5,5
Syndrome néphrotique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	2	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	27	13	14	0,6	0,6	0,6	0,4	0,5	0,3
Insuffisance rénale (N17-N19)	397	193	204	9,1	8,9	9,2	5,9	7,1	5,0
Autres maladies des reins (N25, N27)	1	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	13	3	10	0,3	0,1	0,5	0,2	0,1	0,3
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	13	0,6	0,5	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	3	0,1	0,1
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	2	0,1	0,1
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	1	0,0	0,1
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	1	0,0	0,0

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-11 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Colombie-Britannique¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	79	41	38	1,8	1,9	1,7	2,5	2,5	2,5
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	97	47	50	2,2	2,2	2,3	2,4	2,3	2,5
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	446	263	183	10,2	12,1	8,3	8,7	11,3	6,1
Toutes autres maladies (résiduel) ⁷	3 614	1 525	2 089	82,4	70,2	94,5	54,0	56,4	51,0
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	1 343	871	472	30,6	40,1	21,4	25,8	36,3	15,7
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	396	284	112	9,0	13,1	5,1	8,6	12,5	4,8
Accidents de véhicule à moteur ⁸	341	235	106	7,8	10,8	4,8	7,5	10,4	4,6
Autres accidents de transport terrestre ⁹	5	5	0	0,1	0,2	0,0	0,1	0,3	0,0
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	50	44	6	1,1	2,0	0,3	1,0	1,8	0,2
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	947	587	360	21,6	27,0	16,3	17,1	23,8	10,9
Chutes (W00-W19)	357	186	171	8,1	8,6	7,7	5,5	6,9	4,3
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	6	6	0	0,1	0,3	0,0	0,1	0,3	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	46	38	8	1,0	1,7	0,4	1,0	1,7	0,3
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	49	29	20	1,1	1,3	0,9	1,0	1,1	0,8
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	319	208	111	7,3	9,6	5,0	6,6	9,0	4,3
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	170	120	50	3,9	5,5	2,3	3,0	4,8	1,2
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	462	343	119	10,5	15,8	5,4	9,6	14,7	4,7
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	78	74	4	1,8	3,4	0,2	1,5	3,0	0,1
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	384	269	115	8,8	12,4	5,2	8,0	11,7	4,5
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	87	71	16	2,0	3,3	0,7	2,2	3,6	0,7
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	48	45	3	1,1	2,1	0,1	1,3	2,4	0,1
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	39	26	13	0,9	1,2	0,6	0,9	1,2	0,6
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	36	22	14	0,8	1,0	0,6	0,7	0,9	0,5
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	36	22	14	0,8	1,0	0,6	0,7	0,9	0,5
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	41	21	20	0,9	1,0	0,9	0,7	0,7	0,6

1. La répartition géographique des décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
2. À partir de 2005, les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité sont présentées à l'appendice II de la publication « Mortalité : liste sommaire des causes » (numéro 84F0209XIF au catalogue).
3. La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
4. Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)
5. « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics ».
6. Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
7. Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
8. Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
9. Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.

Note(s) : Voir la section Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.

Source(s) : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès (Tableau CANSIM 102-0552) et l'appendice II.

Tableau 1-12

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Yukon¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89) ^{3, 4, 5}	198	120	78	597,9	709,1	481,7	811,0	999,9	627,0
Infections à la salmonelle (A01-A02)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tuberculose (A16-A19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Coqueluche (A37)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infection à méningocoques (A39)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Septicémie (A40-A41)	4	3	1	12,1	17,7	6,2	20,6	30,8	11,2
Syphilis (A50-A53)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	1	1	0	3,0	5,9	0,0	2,3	4,2	0,0
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	2	1	1	6,0	5,9	6,2	4,5	3,3	5,4
Paludisme (B50-B54)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ⁶	2	0	2	6,0	0,0	12,4	9,7	0,0	19,3
Tumeurs malignes (C00-C97)	59	32	27	178,2	189,1	166,7	240,9	260,7	210,6
Tumeurs malignes de la lèvres, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	1	1	0	3,0	5,9	0,0	3,9	6,9	0,0
Tumeur maligne de l'oesophage (C15)	2	1	1	6,0	5,9	6,2	9,0	8,6	9,4
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	3	1	2	9,1	5,9	12,4	10,2	8,6	12,7
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	8	5	3	24,2	29,5	18,5	28,3	36,2	21,6
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	2	1	1	6,0	5,9	6,2	5,5	3,6	8,0
Tumeur maligne du pancréas (C25)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne du larynx (C32)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	13	8	5	39,3	47,3	30,9	51,5	69,1	38,3
Mélanome malin de la peau (C43)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne du sein (C50)	2	0	2	6,0	0,0	12,4	6,3	0,0	13,1
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	0,0	0,0
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	0	0,0	0,0
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	1	6,2	3,6
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	1	5,9	8,6	...
Tumeurs malignes du rein et du bassinnet du rein (C64-C65)	2	1	1	6,0	5,9	6,2	5,7	6,9	3,7
Tumeur maligne de la vessie (C67)	1	1	0	3,0	5,9	0,0	4,9	9,8	0,0
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	5	2	3	15,1	11,8	18,5	19,6	11,9	25,8
Maladie de Hodgkin (C81)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	2	0	2	6,0	0,0	12,4	11,0	0,0	20,7
Leucémie (C91-C95)	1	0	1	3,0	0,0	6,2	2,3	0,0	5,2
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	2	2	0	6,0	11,8	0,0	6,3	11,9	0,0
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	18	10	8	54,4	59,1	49,4	89,7	90,4	74,4
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	1	1	0	3,0	5,9	0,0	4,9	9,8	0,0
Anémies (D50-D64)	1	0	1	3,0	0,0	6,2	5,3	0,0	7,4
Diabète sucré (E10-E14)	2	0	2	6,0	0,0	12,4	9,4	0,0	19,1
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Malnutrition (E40-E46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Méningite (G00, G03)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladie de Parkinson (G20-G21)	1	0	1	3,0	0,0	6,2	6,5	0,0	11,2
Maladie d'Alzheimer (G30)	3	1	2	9,1	5,9	12,4	17,8	18,9	21,3
Maladies cardiovasculaires graves (I00-I78)	43	27	16	129,8	159,5	98,8	185,8	252,0	119,0
Maladies du coeur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	32	21	11	96,6	124,1	67,9	127,3	183,5	82,1

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-12 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Yukon¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies									
rhumatismales chroniques (I00-I09)	1	0	1	3,0	0,0	6,2	4,5	0,0	9,4
Cardiopathie hypertensive (I11)	2	1	1	6,0	5,9	6,2	7,1	3,3	7,4
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	14	12	2	42,3	70,9	12,4	60,8	124,9	18,6
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	2	2	0	6,0	11,8	0,0	12,9	30,6	0,0
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	12	10	2	36,2	59,1	12,4	47,8	94,3	18,6
Athérosclérose cardiovasculaire, décrite ainsi (I25.0)	6	5	1	18,1	29,5	6,2	20,7	34,0	8,9
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	6	5	1	18,1	29,5	6,2	27,1	60,3	9,7
Autres cardiopathies (I26-I51)	15	8	7	45,3	47,3	43,2	54,9	55,3	46,7
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladies du péricarde et myocarde aiguë (I30-I31, I40)	2	1	1	6,0	5,9	6,2	6,2	6,9	5,2
Insuffisance cardiaque (I50)	4	3	1	12,1	17,7	6,2	16,5	22,6	9,7
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	9	4	5	27,2	23,6	30,9	32,1	25,8	31,9
Hypertension essentielle et néphropathie hypertensive (I10, I12, I15)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	11	6	5	33,2	35,5	30,9	58,6	68,5	36,9
Athérosclérose (I70)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anévrisme aortique et dissection (I71)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres maladies des artères, des artérioles et des capillaires (I72-I78)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	1	0	1	3,0	0,0	6,2	4,9	0,0	9,7
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	6	4	2	18,1	23,6	12,4	13,4	12,9	14,3
Grippe (J09-J11)	1	0	1	3,0	0,0	6,2	2,8	0,0	5,4
Pneumopathie (J12-J18)	5	4	1	15,1	23,6	6,2	10,6	12,9	8,9
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	14	10	4	42,3	59,1	24,7	66,5	96,3	38,7
Bronchite, chronique et non précisée (J40-J42)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Empysème (J43)	2	2	0	6,0	11,8	0,0	6,4	12,7	0,0
Asthme (J45-J46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	12	8	4	36,2	47,3	24,7	60,0	83,5	38,7
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ulcère gastro-duodénal (K25-K28)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladies de l'appendice (K35-K38)	1	0	1	3,0	0,0	6,2	4,9	0,0	9,7
Hernies (K40-K46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	6	4	2	18,1	23,6	12,4	16,8	21,9	13,2
Maladie alcoolique du foie (K70)	5	4	1	15,1	23,6	6,2	15,1	21,9	9,4
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie (K73-K74)	1	0	1	3,0	0,0	6,2	1,8	0,0	3,7
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	2	2	0	6,0	11,8	0,0	11,8	34,1	0,0
Syndrome néphritique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insuffisance rénale (N17-N19)	2	2	0	6,0	11,8	0,0	11,8	34,1	0,0
Autres maladies des reins (N25, N27)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	0	0,0	0,0	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	0	0,0	0,0
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	0	0,0	0,0
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	0	0,0	0,0

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-12 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Yukon¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	0	0,0	0,0
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	1	1	0	3,0	5,9	0,0	3,8	7,7	0,0
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	1	1	0	3,0	5,9	0,0	2,3	4,2	0,0
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	4	1	3	12,1	5,9	18,5	20,5	7,7	24,8
Toutes autres maladies (résiduel) ⁷	20	13	7	60,4	76,8	43,2	92,2	138,0	58,0
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	18	14	4	54,4	82,7	24,7	50,7	76,4	25,2
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	6	5	1	18,1	29,5	6,2	14,5	25,7	3,4
Accidents de véhicule à moteur ⁸	6	5	1	18,1	29,5	6,2	14,5	25,7	3,4
Autres accidents de transport terrestre ⁹	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	12	9	3	36,2	53,2	18,5	36,2	50,8	21,8
Chutes (W00-W19)	1	0	1	3,0	0,0	6,2	6,0	0,0	10,1
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	1	1	0	3,0	5,9	0,0	1,8	3,6	0,0
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	1	1	0	3,0	5,9	0,0	2,8	5,7	0,0
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	7	5	2	21,1	29,5	12,4	18,0	23,6	11,7
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	2	2	0	6,0	11,8	0,0	7,6	17,8	0,0
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	2	2	0	6,0	11,8	0,0	5,7	10,3	0,0
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	1	1	0	3,0	5,9	0,0	3,9	6,9	0,0
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	1	1	0	3,0	5,9	0,0	1,8	3,3	0,0
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	3	2	1	9,1	11,8	6,2	9,8	10,6	8,8
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	3	2	1	9,1	11,8	6,2	9,8	10,6	8,8
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. La répartition géographique des décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
2. À partir de 2005, les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité sont présentées à l'appendice II de la publication « Mortalité : liste sommaire des causes » (numéro 84F0209XIF au catalogue).
3. La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
4. Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10) « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics ».
5. Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
6. Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
7. Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
8. Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.

Note(s) : Voir la section Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.

Source(s) : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès (Tableau CANSIM 102-0552) et l'appendice II.

Tableau 1-13

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Territoires du Nord-Ouest¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)^{3, 4, 5}	201	127	74	460,0	560,8	351,5	771,1	943,7	596,2
Infections à la salmonelle (A01-A02)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tuberculose (A16-A19)	1	0	1	2,3	0,0	4,7	5,7	0,0	12,0
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	1	0	1	2,3	0,0	4,7	5,7	0,0	12,0
Coqueluche (A37)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infection à méningocoques (A39)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Septicémie (A40-A41)	3	2	1	6,9	8,8	4,7	11,7	12,2	9,0
Syphilis (A50-A53)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	1	1	0	2,3	4,4	0,0	1,9	3,4	0,0
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Paludisme (B50-B54)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ⁶	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes (C00-C97)	57	34	23	130,4	150,1	109,2	234,1	258,4	205,0
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	2	2	0	4,6	8,8	0,0	5,6	9,4	0,0
Tumeur maligne de l'oesophage (C15)	2	2	0	4,6	8,8	0,0	5,2	9,2	0,0
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	8	5	3	18,3	22,1	14,2	33,3	30,5	33,8
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	1	0	1	2,3	0,0	4,7	6,4	0,0	10,3
Tumeur maligne du pancréas (C25)	3	1	2	6,9	4,4	9,5	9,1	3,1	16,9
Tumeur maligne du larynx (C32)	2	1	1	4,6	4,4	4,7	11,3	10,6	12,0
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	14	8	6	32,0	35,3	28,5	63,2	66,6	56,8
Mélanome malin de la peau (C43)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne du sein (C50)	3	0	3	6,9	0,0	14,2	12,6	0,0	24,9
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	1	4,7	3,3
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	0,0	0,0
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	0	0,0	0,0
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	3	13,2	37,6	...
Tumeurs malignes du rein et du bassinnet du rein (C64-C65)	1	1	0	2,3	4,4	0,0	4,7	8,8	0,0
Tumeur maligne de la vessie (C67)	1	1	0	2,3	4,4	0,0	5,2	12,2	0,0
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	5	4	1	11,4	17,7	4,7	20,2	30,4	11,7
Maladie de Hodgkin (C81)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	3	2	1	6,9	8,8	4,7	13,4	15,0	11,7
Leucémie (C91-C95)	1	1	0	2,3	4,4	0,0	1,7	3,2	0,0
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	1	1	0	2,3	4,4	0,0	5,2	12,2	0,0
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	11	6	5	25,2	26,5	23,7	38,7	39,8	35,4
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anémies (D50-D64)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Diabète sucré (E10-E14)	2	2	0	4,6	8,8	0,0	11,3	21,6	0,0
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	1	1	0	2,3	4,4	0,0	5,6	10,6	0,0
Malnutrition (E40-E46)	1	1	0	2,3	4,4	0,0	5,6	10,6	0,0
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Méningite (G00, G03)	1	1	0	2,3	4,4	0,0	1,9	3,4	0,0
Maladie de Parkinson (G20-G21)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladie d'Alzheimer (G30)	3	1	2	6,9	4,4	9,5	18,5	17,0	22,2
Maladies cardiovasculaires graves (I00-I78)	38	27	11	87,0	119,2	52,2	165,4	247,4	92,0
Maladies du coeur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	29	22	7	66,4	97,2	33,2	129,1	203,2	64,8

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-13 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Territoires du Nord-Ouest¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies									
rhumatismales chroniques (I00-I09)	1	0	1	2,3	0,0	4,7	1,6	0,0	3,3
Cardiopathie hypertensive (I11)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	21	17	4	48,1	75,1	19,0	93,8	151,2	40,8
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	9	8	1	20,6	35,3	4,7	43,5	83,0	9,0
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	12	9	3	27,5	39,7	14,2	50,3	68,3	31,8
Athérosclérose cardiovasculaire, décrite ainsi (I25.0)	5	5	0	11,4	22,1	0,0	12,4	23,0	0,0
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	7	4	3	16,0	17,7	14,2	37,9	45,3	31,8
Autres cardiopathies (I26-I51)	7	5	2	16,0	22,1	9,5	33,7	52,0	20,7
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladies du péricarde et myocarde aiguë (I30-I31, I40)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insuffisance cardiaque (I50)	6	4	2	13,7	17,7	9,5	28,0	38,6	20,7
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	1	1	0	2,3	4,4	0,0	5,7	13,5	0,0
Hypertension essentielle et néphropathie hypertensive (I10, I12, I15)	1	1	0	2,3	4,4	0,0	1,6	3,1	0,0
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	4	2	2	9,2	8,8	9,5	23,0	25,7	20,2
Athérosclérose (I70)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	4	2	2	9,2	8,8	9,5	11,7	15,3	6,9
Anévrisme aortique et dissection (I71)	2	2	0	4,6	8,8	0,0	8,4	15,3	0,0
Autres maladies des artères, des artérioles et des capillaires (I72-I78)	2	0	2	4,6	0,0	9,5	3,3	0,0	6,9
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	9	6	3	20,6	26,5	14,2	41,5	48,2	32,3
Grippe (J09-J11)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pneumopathie (J12-J18)	9	6	3	20,6	26,5	14,2	41,5	48,2	32,3
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	10	4	6	22,9	17,7	28,5	41,9	35,3	51,6
Bronchite, chronique et non précisée (J40-J42)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Empysème (J43)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Asthme (J45-J46)	1	1	0	2,3	4,4	0,0	2,4	4,5	0,0
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	9	3	6	20,6	13,2	28,5	39,4	30,8	51,6
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	5	3	2	11,4	13,2	9,5	21,7	18,2	21,9
Ulcère gastro-duodénal (K25-K28)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladies de l'appendice (K35-K38)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hernies (K40-K46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	7	3	4	16,0	13,2	19,0	17,0	16,7	17,7
Maladie alcoolique du foie (K70)	4	2	2	9,2	8,8	9,5	7,9	7,9	7,4
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie (K73-K74)	3	1	2	6,9	4,4	9,5	9,1	8,8	10,3
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	3	2	1	6,9	8,8	4,7	12,8	16,8	9,0
Syndrome néphritique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insuffisance rénale (N17-N19)	3	2	1	6,9	8,8	4,7	12,8	16,8	9,0
Autres maladies des reins (N25, N27)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	0	0,0	0,0	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	0	0,0	0,0
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	0	0,0	0,0
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	0	0,0	0,0

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-13 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Territoires du Nord-Ouest¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	0	0,0	0,0
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	6	6	0	13,7	26,5	0,0	11,9	24,0	0,0
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	2	1	1	4,6	4,4	4,7	5,0	5,0	4,5
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	7	4	3	16,0	17,7	14,2	25,4	35,1	17,6
Toutes autres maladies (résiduel) ⁷	16	8	8	36,6	35,3	38,0	67,4	70,4	61,9
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	15	11	4	34,3	48,6	19,0	36,6	57,4	15,9
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	7	5	2	16,0	22,1	9,5	17,5	28,6	8,3
Accidents de véhicule à moteur ⁸	5	3	2	11,4	13,2	9,5	10,2	12,0	8,3
Autres accidents de transport terrestre ⁹	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	2	2	0	4,6	8,8	0,0	7,3	16,6	0,0
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	8	6	2	18,3	26,5	9,5	19,0	28,8	7,6
Chutes (W00-W19)	1	1	0	2,3	4,4	0,0	4,7	8,8	0,0
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	1	1	0	2,3	4,4	0,0	2,7	5,0	0,0
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	1	1	0	2,3	4,4	0,0	1,7	3,2	0,0
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	3	1	2	6,9	4,4	9,5	6,3	5,0	7,6
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	2	2	0	4,6	8,8	0,0	3,7	6,7	0,0
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	10	8	2	22,9	35,3	9,5	21,9	33,1	10,2
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	2	2	0	4,6	8,8	0,0	5,3	10,1	0,0
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	8	6	2	18,3	26,5	9,5	16,6	23,1	10,2
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	3	2	1	6,9	8,8	4,7	6,4	9,4	3,3
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	3	2	1	6,9	8,8	4,7	6,4	9,4	3,3
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	1	0	1	2,3	0,0	4,7	5,7	0,0	9,9

1. La répartition géographique des décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
2. À partir de 2005, les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité sont présentées à l'appendice II de la publication « Mortalité : liste sommaire des causes » (numéro 84F0209XIF au catalogue).
3. La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
4. Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10) « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics ».
5. Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
6. Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
7. Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
8. Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.

Note(s) : Voir la section Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.

Source(s) : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès (Tableau CANSIM 102-0552) et l'appendice II.

Tableau 1-14

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Nunavut¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)^{3, 4, 5}	147	92	55	465,3	561,2	361,8	1 016,9	1 254,0	768,6
Infections à la salmonelle (A01-A02)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tuberculose (A16-A19)	1	1	0	3,2	6,1	0,0	9,0	17,6	0,0
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	1	1	0	3,2	6,1	0,0	9,0	17,6	0,0
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Coqueluche (A37)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infection à méningocoques (A39)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Septicémie (A40-A41)	2	2	0	6,3	12,2	0,0	16,2	30,6	0,0
Syphilis (A50-A53)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Paludisme (B50-B54)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ⁶	1	1	0	3,2	6,1	0,0	6,1	11,6	0,0
Tumeurs malignes (C00-C97)	38	19	19	120,3	115,9	125,0	305,9	333,4	269,5
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	1	0	1	3,2	0,0	6,6	4,2	0,0	9,4
Tumeur maligne de l'oesophage (C15)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	2	0	2	6,3	0,0	13,2	5,6	0,0	11,5
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	5	3	2	15,8	18,3	13,2	44,7	68,0	14,0
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne du pancréas (C25)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne du larynx (C32)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	16	9	7	50,6	54,9	46,0	144,7	145,1	145,3
Mélanome malin de la peau (C43)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne du sein (C50)	2	0	2	6,3	0,0	13,2	6,9	0,0	14,9
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	0	0,0	0,0
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	0	0,0	0,0
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	1	6,6	8,5
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	0	0,0	0,0	...
Tumeurs malignes du rein et du bassin du rein (C64-C65)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne de la vessie (C67)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	2	0	2	6,3	0,0	13,2	7,6	0,0	16,8
Maladie de Hodgkin (C81)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	2	0	2	6,3	0,0	13,2	7,6	0,0	16,8
Leucémie (C91-C95)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	9	7	2	28,5	42,7	13,2	88,1	120,3	49,3
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anémies (D50-D64)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Diabète sucré (E10-E14)	1	0	1	3,2	0,0	6,6	9,0	0,0	18,5
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Malnutrition (E40-E46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Méningite (G00, G03)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladie de Parkinson (G20-G21)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladie d'Alzheimer (G30)	1	0	1	3,2	0,0	6,6	21,2	0,0	30,9
Maladies cardiovasculaires graves (I00-I78)	19	13	6	60,1	79,3	39,5	161,0	296,5	38,4

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-14 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Nunavut¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	13	10	3	41,1	61,0	19,7	94,5	159,0	19,3
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques (I00-I09)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cardiopathie hypertensive (I11)	1	1	0	3,2	6,1	0,0	6,1	11,6	0,0
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	5	5	0	15,8	30,5	0,0	34,0	64,8	0,0
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	3	3	0	9,5	18,3	0,0	27,0	51,4	0,0
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	1	1	0	3,2	6,1	0,0	3,4	6,0	0,0
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	1	1	0	3,2	6,1	0,0	3,7	7,4	0,0
Athérosclérose cardiovasculaire, décrite ainsi (I25.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	1	1	0	3,2	6,1	0,0	3,7	7,4	0,0
Autres cardiopathies (I26-I51)	7	4	3	22,2	24,4	19,7	54,4	82,6	19,3
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladies du péricarde et myocardite aiguë (I30-I31, I40)	1	0	1	3,2	0,0	6,6	3,7	0,0	7,3
Insuffisance cardiaque (I50)	2	2	0	6,3	12,2	0,0	26,7	48,4	0,0
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	4	2	2	12,7	12,2	13,2	24,0	34,2	12,0
Hypertension essentielle et néphropathie hypertensive (I10, I12, I15)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	5	3	2	15,8	18,3	13,2	62,9	137,5	11,6
Athérosclérose (I70)	1	0	1	3,2	0,0	6,6	3,6	0,0	7,5
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anévrisme aortique et dissection (I71)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres maladies des artères, des artérioles et des capillaires (I72-I78)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	1	0	1	3,2	0,0	6,6	3,5	0,0	7,4
Grippe (J09-J11)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pneumopathie (J12-J18)	1	0	1	3,2	0,0	6,6	3,5	0,0	7,4
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	16	9	7	50,6	54,9	46,0	218,5	212,9	223,4
Bronchite, chronique et non précisée (J40-J42)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Emphysème (J43)	1	1	0	3,2	6,1	0,0	3,6	6,9	0,0
Asthme (J45-J46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	15	8	7	47,5	48,8	46,0	214,9	206,0	223,4
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	2	0	2	6,3	0,0	13,2	12,4	0,0	26,2
Ulcère gastro-duodénal (K25-K28)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladies de l'appendice (K35-K38)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hernies (K40-K46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladie chronique et cirrrose du foie (K70, K73-K74)	1	0	1	3,2	0,0	6,6	3,7	0,0	7,3
Maladie alcoolique du foie (K70)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres maladies chroniques et cirrroses du foie (K73-K74)	1	0	1	3,2	0,0	6,6	3,7	0,0	7,3
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	2	1	1	6,3	6,1	6,6	16,4	7,5	29,4
Syndrome néphrotique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insuffisance rénale (N17-N19)	2	1	1	6,3	6,1	6,6	16,4	7,5	29,4
Autres maladies des reins (N25, N27)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	0	0,0	0,0	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	0	0,0	0,0
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	0	0,0	0,0
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	0	0,0	0,0

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-14 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Nunavut¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	0	0,0	0,0
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	5	5	0	15,8	30,5	0,0	8,9	16,6	0,0
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	4	3	1	12,7	18,3	6,6	9,2	14,1	3,9
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	8	4	4	25,3	24,4	26,3	18,4	16,8	20,5
Toutes autres maladies (résiduel) ⁷	7	4	3	22,2	24,4	19,7	67,9	88,2	46,0
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	14	11	3	44,3	67,1	19,7	65,9	112,6	18,2
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	8	6	2	25,3	36,6	13,2	23,9	35,7	11,5
Accidents de véhicule à moteur ⁸	7	6	1	22,2	36,6	6,6	21,8	35,7	7,5
Autres accidents de transport terrestre ⁹	1	0	1	3,2	0,0	6,6	2,0	0,0	4,0
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	6	5	1	19,0	30,5	6,6	42,0	76,9	6,7
Chutes (W00-W19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	1	1	0	3,2	6,1	0,0	6,1	11,6	0,0
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	1	0	1	3,2	0,0	6,6	3,4	0,0	6,7
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	1	1	0	3,2	6,1	0,0	3,5	6,5	0,0
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	3	3	0	9,5	18,3	0,0	29,1	58,7	0,0
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	22	18	4	69,6	109,8	26,3	56,9	89,1	22,4
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	5	5	0	15,8	30,5	0,0	14,6	28,4	0,0
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	17	13	4	53,8	79,3	26,3	42,2	60,7	22,4
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	1	0	1	3,2	0,0	6,6	3,4	0,0	6,7
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	1	0	1	3,2	0,0	6,6	3,4	0,0	6,7
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	1	1	0	3,2	6,1	0,0	3,5	6,5	0,0
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	1	1	0	3,2	6,1	0,0	3,5	6,5	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. La répartition géographique des décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
2. À partir de 2005, les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité sont présentées à l'appendice II de la publication « Mortalité : liste sommaire des causes » (numéro 84F0209XIF au catalogue).
3. La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
4. Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)
5. « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics ».
6. Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
7. Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
8. Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
9. Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.

Note(s) : Voir la section Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.

Source(s) : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès (Tableau CANSIM 102-0552) et l'appendice II.

Tableau 2-1

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — Moins d'un an^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)^{7, 8, 9}	1 911	1 057	854	505,7	545,5	463,8
Infections à la salmonelle (A01-A02)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	1	1	0	0,3	0,5	0,0
Tuberculose (A16-A19)	1	1	0	0,3	0,5	0,0
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	1	1	0	0,3	0,5	0,0
Coqueluche (A37)	1	0	1	0,3	0,0	0,5
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infection à méningocoques (A39)	1	0	1	0,3	0,0	0,5
Septicémie (A40-A41)	18	13	5	4,8	6,7	2,7
Syphilis (A50-A53)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Paludisme (B50-B54)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ¹⁰	10	6	4	2,6	3,1	2,2
Tumeurs malignes (C00-C97)	8	7	1	2,1	3,6	0,5
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne de l'œsophage (C15)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne du pancréas (C25)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne du larynx (C32)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Mélanome malin de la peau (C43)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne du sein (C50)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	0	0,0
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	0	0,0
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	0	0,0
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	0	0,0	...
Tumeurs malignes du rein et du bassinet du rein (C64-C65)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne de la vessie (C67)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	2	1	1	0,5	0,5	0,5
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	2	2	0	0,5	1,0	0,0
Maladie de Hodgkin (C81)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Leucémie (C91-C95)	2	2	0	0,5	1,0	0,0
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-1 – suite

**Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ —
 Moins d'un an^{2,3,4,5}**

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	4	4	0	1,1	2,1	0,0
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	5	3	2	1,3	1,5	1,1
Anémies (D50-D64)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Diabète sucré (E10-E14)	1	1	0	0,3	0,5	0,0
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	1	1	0	0,3	0,5	0,0
Malnutrition (E40-E46)	1	1	0	0,3	0,5	0,0
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Méningite (G00, G03)	3	3	0	0,8	1,5	0,0
Maladie de Parkinson (G20-G21)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladie d'Alzheimer (G30)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies cardiovasculaires graves (I00-I78)	35	23	12	9,3	11,9	6,5
Maladies du coeur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	23	14	9	6,1	7,2	4,9
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques (I00-I09)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Cardiopathie hypertensive (I11)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Athérosclérose cardiovasculaire, décrite ainsi (I25.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres cardiopathies (I26-I51)	23	14	9	6,1	7,2	4,9
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies du péricarde et myocardite aiguë (I30-I31, I40)	1	1	0	0,3	0,5	0,0
Insuffisance cardiaque (I50)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	22	13	9	5,8	6,7	4,9
Hypertension essentielle et néphropathie hypertensive (I10, I12, I15)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	12	9	3	3,2	4,6	1,6
Athérosclérose (I70)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Anévrisme aortique et dissection (I71)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres maladies des artères, des artérioles et des capillaires (I72-I78)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	1	1	0	0,3	0,5	0,0
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	6	4	2	1,6	2,1	1,1
Grippe (J09-J11)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Pneumopathie (J12-J18)	6	4	2	1,6	2,1	1,1
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	2	0	2	0,5	0,0	1,1
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	1	0	1	0,3	0,0	0,5
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	1	0	1	0,3	0,0	0,5
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	1	1	0	0,3	0,5	0,0
Bronchite, chronique et non précisée (J40-J42)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Emphysème (J43)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Asthme (J45-J46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	1	1	0	0,3	0,5	0,0
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-1 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — Moins d'un an^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	8	4	4	2,1	2,1	2,2
Ulcère gastro-duodénal (K25-K28)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies de l'appendice (K35-K38)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hernies (K40-K46)	1	1	0	0,3	0,5	0,0
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladie alcoolique du foie (K70)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie (K73-K74)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	5	3	2	1,3	1,5	1,1
Syndrome néphritique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	1	0	1	0,3	0,0	0,5
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Insuffisance rénale (N17-N19)	4	3	1	1,1	1,5	0,5
Autres maladies des reins (N25, N27)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	0	0,0	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	0	0,0
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	0	0,0
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	0	0,0
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	0	0,0
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	1 092	591	501	289,0	305,0	272,1
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	414	207	207	109,6	106,8	112,4
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	158	99	59	41,8	51,1	32,0
Toutes autres maladies (résiduel) ¹¹	91	56	35	24,1	28,9	19,0
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	32	23	9	8,5	11,9	4,9
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	2	1	1	0,5	0,5	0,5
Accidents de véhicule à moteur ¹²	2	1	1	0,5	0,5	0,5
Autres accidents de transport terrestre ¹³	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	30	22	8	7,9	11,4	4,3
Chutes (W00-W19)	1	1	0	0,3	0,5	0,0
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	7	4	3	1,9	2,1	1,6
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	2	2	0	0,5	1,0	0,0
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-1 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — Moins d'un an^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	20	15	5	5,3	7,7	2,7
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	8	4	4	2,1	2,1	2,2
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	8	4	4	2,1	2,1	2,2
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	3	2	1	0,8	1,0	0,5
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	3	2	1	0,8	1,0	0,5
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	4	2	2	1,1	1,0	1,1

1. Le nombre de décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
 2. Âge au dernier anniversaire précédant le décès.
 3. Pour « Âge au décès, moins d'un an », le taux de mortalité utilise les naissances vivantes de l'année civile.
 4. Pour « Âge au décès, 1 à 4 ans », le taux de mortalité utilise les estimations de population des 0 à 4 ans moins les naissances vivantes de l'année civile.
 5. Pour « Âge au décès », chaque groupe d'âge à l'exception de « Tous les âges », le taux de mortalité représente le taux de mortalité par âge ou le nombre de décès dans un groupe d'âge particulier pendant une année donnée pour 100 000 personnes dans le même groupe d'âge au 1er juillet de la même année.
 6. À partir de 2005, les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité sont présentées à l'appendice II de la publication « Mortalité : liste sommaire des causes » (numéro 84F0209XIF au catalogue).
 7. La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
 8. Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)
 9. « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics ».
 10. Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision, et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
 11. Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
 12. Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
 13. Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.
- Note(s) :** Voir la section Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.
- Source(s) :** Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès (Tableau CANSIM 102-0551) et l'appendice II.

Tableau 2-2

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 1 à 4 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)^{7, 8, 9}	265	153	112	18,6	20,9	16,2
Infections à la salmonelle (A01-A02)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	1	1	0	0,1	0,1	0,0
Tuberculose (A16-A19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Coqueluche (A37)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infection à méningocoques (A39)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Septicémie (A40-A41)	3	2	1	0,2	0,3	0,1
Syphilis (A50-A53)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	1	1	0	0,1	0,1	0,0
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Paludisme (B50-B54)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ¹⁰	8	5	3	0,6	0,7	0,4
Tumeurs malignes (C00-C97)	47	25	22	3,3	3,4	3,2
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	1	1	0	0,1	0,1	0,0
Tumeur maligne de l'œsophage (C15)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	4	3	1	0,3	0,4	0,1
Tumeur maligne du pancréas (C25)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne du larynx (C32)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Mélanome malin de la peau (C43)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne du sein (C50)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	0	0,0
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	0	0,0
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	0	0,0
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	0	0,0	...
Tumeurs malignes du rein et du bassinet du rein (C64-C65)	4	2	2	0,3	0,3	0,3
Tumeur maligne de la vessie (C67)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	10	5	5	0,7	0,7	0,7
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	17	9	8	1,2	1,2	1,2
Maladie de Hodgkin (C81)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	3	2	1	0,2	0,3	0,1
Leucémie (C91-C95)	14	7	7	1,0	1,0	1,0
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-2 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ —
1 à 4 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	11	5	6	0,8	0,7	0,9
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	7	5	2	0,5	0,7	0,3
Anémies (D50-D64)	2	0	2	0,1	0,0	0,3
Diabète sucré (E10-E14)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Malnutrition (E40-E46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Méningite (G00, G03)	3	2	1	0,2	0,3	0,1
Maladie de Parkinson (G20-G21)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladie d'Alzheimer (G30)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies cardiovasculaires graves (I00-I78)	18	8	10	1,3	1,1	1,4
Maladies du coeur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	10	4	6	0,7	0,5	0,9
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques (I00-I09)	1	1	0	0,1	0,1	0,0
Cardiopathie hypertensive (I11)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	1	0	1	0,1	0,0	0,1
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	1	0	1	0,1	0,0	0,1
Athérosclérose cardiovasculaire, décrite ainsi (I25.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	1	0	1	0,1	0,0	0,1
Autres cardiopathies (I26-I51)	8	3	5	0,6	0,4	0,7
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies du péricarde et myocardite aiguë (I30-I31, I40)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Insuffisance cardiaque (I50)	1	0	1	0,1	0,0	0,1
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	7	3	4	0,5	0,4	0,6
Hypertension essentielle et néphropathie hypertensive (I10, I12, I15)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	8	4	4	0,6	0,5	0,6
Athérosclérose (I70)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Anévrisme aortique et dissection (I71)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres maladies des artères, des artérioles et des capillaires (I72-I78)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	5	4	1	0,4	0,5	0,1
Grippe (J09-J11)	1	1	0	0,1	0,1	0,0
Pneumopathie (J12-J18)	4	3	1	0,3	0,4	0,1
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	1	1	0	0,1	0,1	0,0
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	1	1	0	0,1	0,1	0,0
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Bronchite, chronique et non précisée (J40-J42)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Emphysème (J43)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Asthme (J45-J46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-2 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 1 à 4 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	2	1	1	0,1	0,1	0,1
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	5	3	2	0,4	0,4	0,3
Ulcère gastro-duodénal (K25-K28)	1	0	1	0,1	0,0	0,1
Maladies de l'appendice (K35-K38)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hernies (K40-K46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladie alcoolique du foie (K70)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie (K73-K74)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	3	2	1	0,2	0,3	0,1
Syndrome néphritique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	1	1	0	0,1	0,1	0,0
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Insuffisance rénale (N17-N19)	2	1	1	0,1	0,1	0,1
Autres maladies des reins (N25, N27)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	1	0	1	0,1	0,0	0,1
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	0	0,0	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	0	0,0
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	0	0,0
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	0	0,0
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	0	0,0
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	2	1	1	0,1	0,1	0,1
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	22	11	11	1,5	1,5	1,6
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	19	10	9	1,3	1,4	1,3
Toutes autres maladies (résiduel) ¹¹	50	35	15	3,5	4,8	2,2
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	55	29	26	3,9	4,0	3,8
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	18	8	10	1,3	1,1	1,4
Accidents de véhicule à moteur ¹²	18	8	10	1,3	1,1	1,4
Autres accidents de transport terrestre ¹³	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	37	21	16	2,6	2,9	2,3
Chutes (W00-W19)	4	3	1	0,3	0,4	0,1
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	11	8	3	0,8	1,1	0,4
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	10	4	6	0,7	0,5	0,9
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	1	0	1	0,1	0,0	0,1

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-2 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 1 à 4 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	11	6	5	0,8	0,8	0,7
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	7	5	2	0,5	0,7	0,3
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	7	5	2	0,5	0,7	0,3
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	2	2	0	0,1	0,3	0,0
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	2	2	0	0,1	0,3	0,0
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	0	0	0	0,0	0,0	0,0

1. Le nombre de décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
 2. Âge au dernier anniversaire précédant le décès.
 3. Pour « Âge au décès, moins d'un an », le taux de mortalité utilise les naissances vivantes de l'année civile.
 4. Pour « Âge au décès, 1 à 4 ans », le taux de mortalité utilise les estimations de population des 0 à 4 ans moins les naissances vivantes de l'année civile.
 5. Pour « Âge au décès », chaque groupe d'âge à l'exception de « Tous les âges », le taux de mortalité représente le taux de mortalité par âge ou le nombre de décès dans un groupe d'âge particulier pendant une année donnée pour 100 000 personnes dans le même groupe d'âge au 1er juillet de la même année.
 6. À partir de 2005, les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité sont présentées à l'appendice II de la publication « Mortalité : liste sommaire des causes » (numéro 84F0209XIF au catalogue).
 7. La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
 8. Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)
 9. « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics ».
 10. Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision, et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
 11. Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
 12. Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
 13. Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.
- Note(s) :** Voir la section Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.
- Source(s) :** Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès (Tableau CANSIM 102-0551) et l'appendice II.

Tableau 2-3

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 5 à 9 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)^{7, 8, 9}	201	117	84	11,2	12,7	9,6
Infections à la salmonelle (A01-A02)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	1	1	0	0,1	0,1	0,0
Tuberculose (A16-A19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Coqueluche (A37)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infection à méningocoques (A39)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Septicémie (A40-A41)	4	1	3	0,2	0,1	0,3
Syphilis (A50-A53)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Paludisme (B50-B54)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ¹⁰	3	2	1	0,2	0,2	0,1
Tumeurs malignes (C00-C97)	33	22	11	1,8	2,4	1,3
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne de l'œsophage (C15)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne du pancréas (C25)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne du larynx (C32)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Mélanome malin de la peau (C43)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne du sein (C50)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	0	0,0
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	0	0,0
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	0	0,0
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	0	0,0	...
Tumeurs malignes du rein et du bassin du rein (C64-C65)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne de la vessie (C67)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	13	6	7	0,7	0,7	0,8
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	12	9	3	0,7	1,0	0,3
Maladie de Hodgkin (C81)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	2	2	0	0,1	0,2	0,0
Leucémie (C91-C95)	10	7	3	0,6	0,8	0,3
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-3 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 5 à 9 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	8	7	1	0,4	0,8	0,1
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	3	2	1	0,2	0,2	0,1
Anémies (D50-D64)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Diabète sucré (E10-E14)	1	1	0	0,1	0,1	0,0
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Malnutrition (E40-E46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Méningite (G00, G03)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladie de Parkinson (G20-G21)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladie d'Alzheimer (G30)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies cardiovasculaires graves (I00-I78)	9	6	3	0,5	0,7	0,3
Maladies du coeur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	7	4	3	0,4	0,4	0,3
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques (I00-I09)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Cardiopathie hypertensive (I11)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	1	1	0	0,1	0,1	0,0
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	1	1	0	0,1	0,1	0,0
Athérosclérose cardiovasculaire, décrite ainsi (I25.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	1	1	0	0,1	0,1	0,0
Autres cardiopathies (I26-I51)	6	3	3	0,3	0,3	0,3
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies du péricarde et myocardite aiguë (I30-I31, I40)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Insuffisance cardiaque (I50)	1	1	0	0,1	0,1	0,0
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	5	2	3	0,3	0,2	0,3
Hypertension essentielle et néphropathie hypertensive (I10, I12, I15)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	2	2	0	0,1	0,2	0,0
Athérosclérose (I70)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Anévrisme aortique et dissection (I71)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres maladies des artères, des artérioles et des capillaires (I72-I78)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	2	2	0	0,1	0,2	0,0
Grippe (J09-J11)	1	1	0	0,1	0,1	0,0
Pneumopathie (J12-J18)	1	1	0	0,1	0,1	0,0
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	1	0	1	0,1	0,0	0,1
Bronchite, chronique et non précisée (J40-J42)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Emphysème (J43)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Asthme (J45-J46)	1	0	1	0,1	0,0	0,1
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-3 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 5 à 9 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	2	2	0	0,1	0,2	0,0
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	2	1	1	0,1	0,1	0,1
Ulcère gastro-duodénal (K25-K28)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies de l'appendice (K35-K38)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hernies (K40-K46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladie alcoolique du foie (K70)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie (K73-K74)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Syndrome néphritique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Insuffisance rénale (N17-N19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres maladies des reins (N25, N27)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	0	0,0	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	0	0,0
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	0	0,0
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	0	0,0
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	0	0,0
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	3	0	3	0,2	0,0	0,3
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	11	5	6	0,6	0,5	0,7
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	10	7	3	0,6	0,8	0,3
Toutes autres maladies (résiduel) ¹¹	36	16	20	2,0	1,7	2,3
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	70	43	27	3,9	4,7	3,1
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	33	17	16	1,8	1,8	1,8
Accidents de véhicule à moteur ¹²	31	17	14	1,7	1,8	1,6
Autres accidents de transport terrestre ¹³	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	2	0	2	0,1	0,0	0,2
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	37	26	11	2,1	2,8	1,3
Chutes (W00-W19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	1	1	0	0,1	0,1	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	12	10	2	0,7	1,1	0,2
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	15	8	7	0,8	0,9	0,8
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-3 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 5 à 9 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	9	7	2	0,5	0,8	0,2
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	6	4	2	0,3	0,4	0,2
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	6	4	2	0,3	0,4	0,2
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	1	0	1	0,1	0,0	0,1
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	1	0	1	0,1	0,0	0,1
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	3	2	1	0,2	0,2	0,1

1. Le nombre de décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
 2. Âge au dernier anniversaire précédant le décès.
 3. Pour « Âge au décès, moins d'un an », le taux de mortalité utilise les naissances vivantes de l'année civile.
 4. Pour « Âge au décès, 1 à 4 ans », le taux de mortalité utilise les estimations de population des 0 à 4 ans moins les naissances vivantes de l'année civile.
 5. Pour « Âge au décès », chaque groupe d'âge à l'exception de « Tous les âges », le taux de mortalité représente le taux de mortalité par âge ou le nombre de décès dans un groupe d'âge particulier pendant une année donnée pour 100 000 personnes dans le même groupe d'âge au 1er juillet de la même année.
 6. À partir de 2005, les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité sont présentées à l'appendice II de la publication « Mortalité : liste sommaire des causes » (numéro 84F0209XIF au catalogue).
 7. La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
 8. Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)
 9. « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics ».
 10. Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision, et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
 11. Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
 12. Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
 13. Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.
- Note(s)** : Voir la section Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.
- Source(s)** : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès (Tableau CANSIM 102-0551) et l'appendice II.

Tableau 2-4

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 10 à 14 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)^{7, 8, 9}	246	160	86	12,2	15,5	8,8
Infections à la salmonelle (A01-A02)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tuberculose (A16-A19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Coqueluche (A37)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infection à méningocoques (A39)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Septicémie (A40-A41)	4	3	1	0,2	0,3	0,1
Syphilis (A50-A53)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Paludisme (B50-B54)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ¹⁰	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes (C00-C97)	35	22	13	1,7	2,1	1,3
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne de l'œsophage (C15)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Tumeur maligne du pancréas (C25)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne du larynx (C32)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Mélanome malin de la peau (C43)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne du sein (C50)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	0	0,0
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	0	0,0
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	0	0,0
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	0	0,0	...
Tumeurs malignes du rein et du bassin du rein (C64-C65)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne de la vessie (C67)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	10	5	5	0,5	0,5	0,5
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	12	9	3	0,6	0,9	0,3
Maladie de Hodgkin (C81)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Leucémie (C91-C95)	12	9	3	0,6	0,9	0,3
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-4 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 10 à 14 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	11	8	3	0,5	0,8	0,3
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	2	2	0	0,1	0,2	0,0
Anémies (D50-D64)	2	0	2	0,1	0,0	0,2
Diabète sucré (E10-E14)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Malnutrition (E40-E46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Méningite (G00, G03)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Maladie de Parkinson (G20-G21)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladie d'Alzheimer (G30)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies cardiovasculaires graves (I00-I78)	13	8	5	0,6	0,8	0,5
Maladies du coeur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	10	6	4	0,5	0,6	0,4
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques (I00-I09)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Cardiopathie hypertensive (I11)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Athérosclérose cardiovasculaire, décrite ainsi (I25.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres cardiopathies (I26-I51)	10	6	4	0,5	0,6	0,4
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Maladies du péricarde et myocardite aiguë (I30-I31, I40)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Insuffisance cardiaque (I50)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	8	4	4	0,4	0,4	0,4
Hypertension essentielle et néphropathie hypertensive (I10, I12, I15)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	2	2	0	0,1	0,2	0,0
Athérosclérose (I70)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Anévrisme aortique et dissection (I71)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres maladies des artères, des artérioles et des capillaires (I72-I78)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	3	1	2	0,1	0,1	0,2
Grippe (J09-J11)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Pneumopathie (J12-J18)	3	1	2	0,1	0,1	0,2
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	2	2	0,2	0,2	0,2
Bronchite, chronique et non précisée (J40-J42)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Emphysème (J43)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Asthme (J45-J46)	4	2	2	0,2	0,2	0,2
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-4 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 10 à 14 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	2	1	1	0,1	0,1	0,1
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	7	5	2	0,3	0,5	0,2
Ulcère gastro-duodénal (K25-K28)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies de l'appendice (K35-K38)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hernies (K40-K46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladie alcoolique du foie (K70)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie (K73-K74)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Syndrome néphritique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Insuffisance rénale (N17-N19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres maladies des reins (N25, N27)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	0	0,0	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	0	0,0
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	0	0,0
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	0	0,0
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	0	0,0
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	12	6	6	0,6	0,6	0,6
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	7	3	4	0,3	0,3	0,4
Toutes autres maladies (résiduel) ¹¹	33	25	8	1,6	2,4	0,8
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	80	56	24	4,0	5,4	2,4
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	37	24	13	1,8	2,3	1,3
Accidents de véhicule à moteur ¹²	31	21	10	1,5	2,0	1,0
Autres accidents de transport terrestre ¹³	4	2	2	0,2	0,2	0,2
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	2	1	1	0,1	0,1	0,1
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	43	32	11	2,1	3,1	1,1
Chutes (W00-W19)	3	3	0	0,1	0,3	0,0
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	2	2	0	0,1	0,2	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	13	10	3	0,6	1,0	0,3
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	7	3	4	0,3	0,3	0,4
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	6	4	2	0,3	0,4	0,2

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-4 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 10 à 14 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	12	10	2	0,6	1,0	0,2
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	25	16	9	1,2	1,6	0,9
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	24	15	9	1,2	1,5	0,9
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	8	4	4	0,4	0,4	0,4
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	2	2	0	0,1	0,2	0,0
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	6	2	4	0,3	0,2	0,4
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	5	2	3	0,2	0,2	0,3
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	5	2	3	0,2	0,2	0,3
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	1	1	0	0,0	0,1	0,0

1. Le nombre de décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.

2. Âge au dernier anniversaire précédant le décès.

3. Pour « Âge au décès, moins d'un an », le taux de mortalité utilise les naissances vivantes de l'année civile.

4. Pour « Âge au décès, 1 à 4 ans », le taux de mortalité utilise les estimations de population des 0 à 4 ans moins les naissances vivantes de l'année civile.

5. Pour « Âge au décès », chaque groupe d'âge à l'exception de « Tous les âges », le taux de mortalité représente le taux de mortalité par âge ou le nombre de décès dans un groupe d'âge particulier pendant une année donnée pour 100 000 personnes dans le même groupe d'âge au 1er juillet de la même année.

6. À partir de 2005, les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité sont présentées à l'appendice II de la publication « Mortalité : liste sommaire des causes » (numéro 84F0209XIF au catalogue).

7. La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.

8. Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)

9. « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics ».

10. Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision, et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.

11. Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.

12. Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.

13. Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.

Note(s) : Voir la section Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.

Source(s) : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès (Tableau CANSIM 102-0551) et l'appendice II.

Tableau 2-5

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 15 à 19 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)^{7, 8, 9}	894	607	287	39,6	52,5	26,1
Infections à la salmonelle (A01-A02)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tuberculose (A16-A19)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Coqueluche (A37)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infection à méningocoques (A39)	2	1	1	0,1	0,1	0,1
Septicémie (A40-A41)	3	1	2	0,1	0,1	0,2
Syphilis (A50-A53)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Paludisme (B50-B54)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ¹⁰	2	1	1	0,1	0,1	0,1
Tumeurs malignes (C00-C97)	59	34	25	2,6	2,9	2,3
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Tumeur maligne de l'œsophage (C15)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Tumeur maligne du pancréas (C25)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne du larynx (C32)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Mélanome malin de la peau (C43)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Tumeur maligne du sein (C50)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	0	0,0
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	0	0,0
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	0	0,0
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	0	0,0	...
Tumeurs malignes du rein et du bassin du rein (C64-C65)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne de la vessie (C67)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	9	5	4	0,4	0,4	0,4
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	20	10	10	0,9	0,9	0,9
Maladie de Hodgkin (C81)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	4	3	1	0,2	0,3	0,1
Leucémie (C91-C95)	15	7	8	0,7	0,6	0,7
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-5 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 15 à 19 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	27	17	10	1,2	1,5	0,9
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Anémies (D50-D64)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Diabète sucré (E10-E14)	4	2	2	0,2	0,2	0,2
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Malnutrition (E40-E46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Méningite (G00, G03)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladie de Parkinson (G20-G21)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladie d'Alzheimer (G30)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies cardiovasculaires graves (I00-I78)	24	17	7	1,1	1,5	0,6
Maladies du coeur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	18	15	3	0,8	1,3	0,3
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques (I00-I09)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Cardiopathie hypertensive (I11)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Athérosclérose cardiovasculaire, décrite ainsi (I25.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres cardiopathies (I26-I51)	17	14	3	0,8	1,2	0,3
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies du péricarde et myocardite aiguë (I30-I31, I40)	2	1	1	0,1	0,1	0,1
Insuffisance cardiaque (I50)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	14	12	2	0,6	1,0	0,2
Hypertension essentielle et néphropathie hypertensive (I10, I12, I15)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	5	1	4	0,2	0,1	0,4
Athérosclérose (I70)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Anévrisme aortique et dissection (I71)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Autres maladies des artères, des artérioles et des capillaires (I72-I78)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	6	3	3	0,3	0,3	0,3
Grippe (J09-J11)	3	2	1	0,1	0,2	0,1
Pneumopathie (J12-J18)	3	1	2	0,1	0,1	0,2
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	3	3	0	0,1	0,3	0,0
Bronchite, chronique et non précisée (J40-J42)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Emphysème (J43)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Asthme (J45-J46)	2	2	0	0,1	0,2	0,0
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-5 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 15 à 19 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	4	0	4	0,2	0,0	0,4
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	4	3	1	0,2	0,3	0,1
Ulcère gastro-duodénal (K25-K28)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies de l'appendice (K35-K38)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hernies (K40-K46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladie alcoolique du foie (K70)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie (K73-K74)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Syndrome néphritique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Insuffisance rénale (N17-N19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres maladies des reins (N25, N27)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	0	0,0	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	0	0,0
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	1	0,1
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	0	0,0
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	1	0,1
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	2	2	0	0,1	0,2	0,0
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	17	10	7	0,8	0,9	0,6
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	23	17	6	1,0	1,5	0,5
Toutes autres maladies (résiduel) ¹¹	58	29	29	2,6	2,5	2,6
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	397	279	118	17,6	24,1	10,7
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	295	202	93	13,1	17,5	8,5
Accidents de véhicule à moteur ¹²	282	190	92	12,5	16,4	8,4
Autres accidents de transport terrestre ¹³	8	8	0	0,4	0,7	0,0
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	5	4	1	0,2	0,3	0,1
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	102	77	25	4,5	6,7	2,3
Chutes (W00-W19)	11	8	3	0,5	0,7	0,3
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	2	2	0	0,1	0,2	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	17	16	1	0,8	1,4	0,1
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	8	5	3	0,4	0,4	0,3
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	39	24	15	1,7	2,1	1,4

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-5 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 15 à 19 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	25	22	3	1,1	1,9	0,3
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	208	140	68	9,2	12,1	6,2
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	22	21	1	1,0	1,8	0,1
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	186	119	67	8,2	10,3	6,1
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	58	52	6	2,6	4,5	0,5
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	27	27	0	1,2	2,3	0,0
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	31	25	6	1,4	2,2	0,5
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	3	3	0	0,1	0,3	0,0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	10	9	1	0,4	0,8	0,1
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	10	9	1	0,4	0,8	0,1
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	1	0	1	0,0	0,0	0,1

1. Le nombre de décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
 2. Âge au dernier anniversaire précédant le décès.
 3. Pour « Âge au décès, moins d'un an », le taux de mortalité utilise les naissances vivantes de l'année civile.
 4. Pour « Âge au décès, 1 à 4 ans », le taux de mortalité utilise les estimations de population des 0 à 4 ans moins les naissances vivantes de l'année civile.
 5. Pour « Âge au décès », chaque groupe d'âge à l'exception de « Tous les âges », le taux de mortalité représente le taux de mortalité par âge ou le nombre de décès dans un groupe d'âge particulier pendant une année donnée pour 100 000 personnes dans le même groupe d'âge au 1er juillet de la même année.
 6. À partir de 2005, les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité sont présentées à l'appendice II de la publication « Mortalité : liste sommaire des causes » (numéro 84F0209XIF au catalogue).
 7. La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
 8. Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)
 9. « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics ».
 10. Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision, et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
 11. Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
 12. Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
 13. Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.
- Note(s)** : Voir la section Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.
- Source(s)** : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès (Tableau CANSIM 102-0551) et l'appendice II.

Tableau 2-6

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 20 à 24 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)^{7, 8, 9}	1 264	935	329	55,3	79,7	29,5
Infections à la salmonelle (A01-A02)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tuberculose (A16-A19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Coqueluche (A37)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infection à méningocoques (A39)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Septicémie (A40-A41)	5	4	1	0,2	0,3	0,1
Syphilis (A50-A53)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	2	2	0	0,1	0,2	0,0
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Paludisme (B50-B54)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ¹⁰	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes (C00-C97)	101	57	44	4,4	4,9	4,0
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	3	2	1	0,1	0,2	0,1
Tumeur maligne de l'œsophage (C15)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	3	1	2	0,1	0,1	0,2
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	3	1	2	0,1	0,1	0,2
Tumeur maligne du pancréas (C25)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne du larynx (C32)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Mélanome malin de la peau (C43)	6	3	3	0,3	0,3	0,3
Tumeur maligne du sein (C50)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	1	0,1
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	0	0,0
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	1	0,1
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	0	0,0	...
Tumeurs malignes du rein et du bassinnet du rein (C64-C65)	5	0	5	0,2	0,0	0,4
Tumeur maligne de la vessie (C67)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	17	8	9	0,7	0,7	0,8
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	28	20	8	1,2	1,7	0,7
Maladie de Hodgkin (C81)	3	3	0	0,1	0,3	0,0
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	8	8	0	0,3	0,7	0,0
Leucémie (C91-C95)	17	9	8	0,7	0,8	0,7
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-6 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 20 à 24 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	32	20	12	1,4	1,7	1,1
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	3	2	1	0,1	0,2	0,1
Anémies (D50-D64)	2	1	1	0,1	0,1	0,1
Diabète sucré (E10-E14)	7	4	3	0,3	0,3	0,3
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Malnutrition (E40-E46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Méningite (G00, G03)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Maladie de Parkinson (G20-G21)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladie d'Alzheimer (G30)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies cardiovasculaires graves (I00-I78)	49	39	10	2,1	3,3	0,9
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	35	29	6	1,5	2,5	0,5
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques (I00-I09)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Cardiopathie hypertensive (I11)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	7	6	1	0,3	0,5	0,1
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	4	4	0	0,2	0,3	0,0
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	3	2	1	0,1	0,2	0,1
Athérosclérose cardiovasculaire, décrite ainsi (I25.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	3	2	1	0,1	0,2	0,1
Autres cardiopathies (I26-I51)	28	23	5	1,2	2,0	0,4
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Maladies du péricarde et myocardite aiguë (I30-I31, I40)	2	1	1	0,1	0,1	0,1
Insuffisance cardiaque (I50)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	24	20	4	1,0	1,7	0,4
Hypertension essentielle et néphropathie hypertensive (I10, I12, I15)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	9	6	3	0,4	0,5	0,3
Athérosclérose (I70)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	4	4	0	0,2	0,3	0,0
Anévrisme aortique et dissection (I71)	3	3	0	0,1	0,3	0,0
Autres maladies des artères, des artérioles et des capillaires (I72-I78)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	2	1	1	0,1	0,1	0,1
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	8	4	4	0,3	0,3	0,4
Grippe (J09-J11)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Pneumopathie (J12-J18)	8	4	4	0,3	0,3	0,4
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Bronchite, chronique et non précisée (J40-J42)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Emphysème (J43)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Asthme (J45-J46)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-6 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 20 à 24 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	4	1	3	0,2	0,1	0,3
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	3	0	3	0,1	0,0	0,3
Ulcère gastro-duodénal (K25-K28)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies de l'appendice (K35-K38)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hernies (K40-K46)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	2	1	1	0,1	0,1	0,1
Maladie alcoolique du foie (K70)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie (K73-K74)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	7	4	3	0,3	0,3	0,3
Syndrome néphritique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	3	3	0	0,1	0,3	0,0
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Insuffisance rénale (N17-N19)	4	1	3	0,2	0,1	0,3
Autres maladies des reins (N25, N27)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	0	0,0	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	0	0,0
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	3	0,3
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	2	0,2
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	1	0,1
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	2	1	1	0,1	0,1	0,1
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	25	11	14	1,1	0,9	1,3
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	36	27	9	1,6	2,3	0,8
Toutes autres maladies (résiduel) ¹¹	78	54	24	3,4	4,6	2,2
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	513	396	117	22,4	33,8	10,5
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	359	273	86	15,7	23,3	7,7
Accidents de véhicule à moteur ¹²	337	254	83	14,7	21,7	7,5
Autres accidents de transport terrestre ¹³	4	3	1	0,2	0,3	0,1
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	18	16	2	0,8	1,4	0,2
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	154	123	31	6,7	10,5	2,8
Chutes (W00-W19)	19	17	2	0,8	1,4	0,2
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	5	5	0	0,2	0,4	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	20	18	2	0,9	1,5	0,2
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	15	9	6	0,7	0,8	0,5
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	64	45	19	2,8	3,8	1,7

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-6 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 20 à 24 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	31	29	2	1,4	2,5	0,2
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	255	204	51	11,2	17,4	4,6
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	26	25	1	1,1	2,1	0,1
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	229	179	50	10,0	15,3	4,5
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	103	89	14	4,5	7,6	1,3
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	53	49	4	2,3	4,2	0,4
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	50	40	10	2,2	3,4	0,9
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	2	2	0	0,1	0,2	0,0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	46	29	17	2,0	2,5	1,5
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	46	29	17	2,0	2,5	1,5
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	1	0	1	0,0	0,0	0,1

1. Le nombre de décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
 2. Âge au dernier anniversaire précédant le décès.
 3. Pour « Âge au décès, moins d'un an », le taux de mortalité utilise les naissances vivantes de l'année civile.
 4. Pour « Âge au décès, 1 à 4 ans », le taux de mortalité utilise les estimations de population des 0 à 4 ans moins les naissances vivantes de l'année civile.
 5. Pour « Âge au décès », chaque groupe d'âge à l'exception de « Tous les âges », le taux de mortalité représente le taux de mortalité par âge ou le nombre de décès dans un groupe d'âge particulier pendant une année donnée pour 100 000 personnes dans le même groupe d'âge au 1er juillet de la même année.
 6. À partir de 2005, les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité sont présentées à l'appendice II de la publication « Mortalité : liste sommaire des causes » (numéro 84F0209XIF au catalogue).
 7. La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
 8. Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)
 9. « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics ».
 10. Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision, et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
 11. Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
 12. Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
 13. Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.
- Note(s) :** Voir la section Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.
- Source(s) :** Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès (Tableau CANSIM 102-0551) et l'appendice II.

Tableau 2-7

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 25 à 29 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)^{7, 8, 9}	1 282	878	404	56,1	76,2	35,6
Infections à la salmonelle (A01-A02)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tuberculose (A16-A19)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Coqueluche (A37)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infection à méningocoques (A39)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Septicémie (A40-A41)	3	2	1	0,1	0,2	0,1
Syphilis (A50-A53)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	7	3	4	0,3	0,3	0,4
Paludisme (B50-B54)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ¹⁰	5	4	1	0,2	0,3	0,1
Tumeurs malignes (C00-C97)	141	78	63	6,2	6,8	5,6
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Tumeur maligne de l'œsophage (C15)	3	2	1	0,1	0,2	0,1
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	7	3	4	0,3	0,3	0,4
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	14	7	7	0,6	0,6	0,6
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Tumeur maligne du pancréas (C25)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Tumeur maligne du larynx (C32)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	4	3	1	0,2	0,3	0,1
Mélanome malin de la peau (C43)	8	4	4	0,3	0,3	0,4
Tumeur maligne du sein (C50)	5	0	5	0,2	0,0	0,4
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	5	0,4
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	1	0,1
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	5	0,4
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	0	0,0	...
Tumeurs malignes du rein et du bassin du rein (C64-C65)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Tumeur maligne de la vessie (C67)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	21	13	8	0,9	1,1	0,7
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	23	14	9	1,0	1,2	0,8
Maladie de Hodgkin (C81)	2	2	0	0,1	0,2	0,0
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	9	5	4	0,4	0,4	0,4
Leucémie (C91-C95)	12	7	5	0,5	0,6	0,4
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-7 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 25 à 29 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	40	29	11	1,7	2,5	1,0
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	5	5	0	0,2	0,4	0,0
Anémies (D50-D64)	5	3	2	0,2	0,3	0,2
Diabète sucré (E10-E14)	13	8	5	0,6	0,7	0,4
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Malnutrition (E40-E46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Méningite (G00, G03)	2	1	1	0,1	0,1	0,1
Maladie de Parkinson (G20-G21)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladie d'Alzheimer (G30)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies cardiovasculaires graves (I00-I78)	83	43	40	3,6	3,7	3,5
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	65	35	30	2,8	3,0	2,6
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques (I00-I09)	2	0	2	0,1	0,0	0,2
Cardiopathie hypertensive (I11)	2	1	1	0,1	0,1	0,1
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	21	13	8	0,9	1,1	0,7
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	6	5	1	0,3	0,4	0,1
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	2	1	1	0,1	0,1	0,1
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	13	7	6	0,6	0,6	0,5
Athérosclérose cardiovasculaire, décrite ainsi (I25.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	13	7	6	0,6	0,6	0,5
Autres cardiopathies (I26-I51)	40	21	19	1,7	1,8	1,7
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	3	0	3	0,1	0,0	0,3
Maladies du péricarde et myocardite aiguë (I30-I31, I40)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Insuffisance cardiaque (I50)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	35	20	15	1,5	1,7	1,3
Hypertension essentielle et néphropathie hypertensive (I10, I12, I15)	3	0	3	0,1	0,0	0,3
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	11	7	4	0,5	0,6	0,4
Athérosclérose (I70)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	4	1	3	0,2	0,1	0,3
Anévrisme aortique et dissection (I71)	4	1	3	0,2	0,1	0,3
Autres maladies des artères, des artérioles et des capillaires (I72-I78)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	3	3	0	0,1	0,3	0,0
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	14	8	6	0,6	0,7	0,5
Grippe (J09-J11)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Pneumopathie (J12-J18)	14	8	6	0,6	0,7	0,5
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	5	2	3	0,2	0,2	0,3
Bronchite, chronique et non précisée (J40-J42)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Emphysème (J43)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Asthme (J45-J46)	3	1	2	0,1	0,1	0,2
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	2	1	1	0,1	0,1	0,1
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-7 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 25 à 29 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	2	1	1	0,1	0,1	0,1
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	7	3	4	0,3	0,3	0,4
Ulcère gastro-duodénal (K25-K28)	2	2	0	0,1	0,2	0,0
Maladies de l'appendice (K35-K38)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hernies (K40-K46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	6	3	3	0,3	0,3	0,3
Maladie alcoolique du foie (K70)	2	0	2	0,1	0,0	0,2
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie (K73-K74)	4	3	1	0,2	0,3	0,1
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	2	1	1	0,1	0,1	0,1
Syndrome néphritique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Insuffisance rénale (N17-N19)	2	1	1	0,1	0,1	0,1
Autres maladies des reins (N25, N27)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	0	0,0	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	0	0,0
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	8	0,7
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	2	0,2
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	6	0,5
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	15	8	7	0,7	0,7	0,6
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	43	25	18	1,9	2,2	1,6
Toutes autres maladies (résiduel) ¹¹	110	57	53	4,8	4,9	4,7
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	409	325	84	17,9	28,2	7,4
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	243	191	52	10,6	16,6	4,6
Accidents de véhicule à moteur ¹²	225	174	51	9,8	15,1	4,5
Autres accidents de transport terrestre ¹³	3	3	0	0,1	0,3	0,0
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	15	14	1	0,7	1,2	0,1
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	166	134	32	7,3	11,6	2,8
Chutes (W00-W19)	13	12	1	0,6	1,0	0,1
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	20	19	1	0,9	1,6	0,1
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	9	7	2	0,4	0,6	0,2
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	93	70	23	4,1	6,1	2,0

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-7 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 25 à 29 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	30	25	5	1,3	2,2	0,4
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	256	193	63	11,2	16,7	5,6
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	21	21	0	0,9	1,8	0,0
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	235	172	63	10,3	14,9	5,6
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	81	63	18	3,5	5,5	1,6
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	43	39	4	1,9	3,4	0,4
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	38	24	14	1,7	2,1	1,2
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	2	2	0	0,1	0,2	0,0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	48	33	15	2,1	2,9	1,3
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	2	1	1	0,1	0,1	0,1
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	46	32	14	2,0	2,8	1,2
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	3	1	2	0,1	0,1	0,2

1. Le nombre de décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
 2. Âge au dernier anniversaire précédant le décès.
 3. Pour « Âge au décès, moins d'un an », le taux de mortalité utilise les naissances vivantes de l'année civile.
 4. Pour « Âge au décès, 1 à 4 ans », le taux de mortalité utilise les estimations de population des 0 à 4 ans moins les naissances vivantes de l'année civile.
 5. Pour « Âge au décès », chaque groupe d'âge à l'exception de « Tous les âges », le taux de mortalité représente le taux de mortalité par âge ou le nombre de décès dans un groupe d'âge particulier pendant une année donnée pour 100 000 personnes dans le même groupe d'âge au 1er juillet de la même année.
 6. À partir de 2005, les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité sont présentées à l'appendice II de la publication « Mortalité : liste sommaire des causes » (numéro 84F0209XIF au catalogue).
 7. La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
 8. Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)
 9. « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics ».
 10. Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision, et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
 11. Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
 12. Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
 13. Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.
- Note(s)** : Voir la section Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.
- Source(s)** : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès (Tableau CANSIM 102-0551) et l'appendice II.

Tableau 2-8

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 30 à 34 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)^{7, 8, 9}	1 376	911	465	62,1	82,0	42,0
Infections à la salmonelle (A01-A02)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	2	2	0	0,1	0,2	0,0
Tuberculose (A16-A19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Coqueluche (A37)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infection à méningocoques (A39)	2	1	1	0,1	0,1	0,1
Septicémie (A40-A41)	7	4	3	0,3	0,4	0,3
Syphilis (A50-A53)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	3	2	1	0,1	0,2	0,1
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	17	11	6	0,8	1,0	0,5
Paludisme (B50-B54)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ¹⁰	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Tumeurs malignes (C00-C97)	221	89	132	10,0	8,0	11,9
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	7	5	2	0,3	0,5	0,2
Tumeur maligne de l'œsophage (C15)	3	2	1	0,1	0,2	0,1
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	8	3	5	0,4	0,3	0,5
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	15	9	6	0,7	0,8	0,5
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	5	3	2	0,2	0,3	0,2
Tumeur maligne du pancréas (C25)	2	0	2	0,1	0,0	0,2
Tumeur maligne du larynx (C32)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	5	1	4	0,2	0,1	0,4
Mélanome malin de la peau (C43)	17	12	5	0,8	1,1	0,5
Tumeur maligne du sein (C50)	30	0	30	1,4	0,0	2,7
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	7	0,6
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	4	0,4
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	8	0,7
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	0	0,0	...
Tumeurs malignes du rein et du bassinnet du rein (C64-C65)	2	1	1	0,1	0,1	0,1
Tumeur maligne de la vessie (C67)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	27	12	15	1,2	1,1	1,4
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	36	21	15	1,6	1,9	1,4
Maladie de Hodgkin (C81)	6	4	2	0,3	0,4	0,2
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	9	5	4	0,4	0,5	0,4
Leucémie (C91-C95)	20	11	9	0,9	1,0	0,8
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-8 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 30 à 34 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	44	19	25	2,0	1,7	2,3
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	7	2	5	0,3	0,2	0,5
Anémies (D50-D64)	3	3	0	0,1	0,3	0,0
Diabète sucré (E10-E14)	20	13	7	0,9	1,2	0,6
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Malnutrition (E40-E46)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Méningite (G00, G03)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladie de Parkinson (G20-G21)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladie d'Alzheimer (G30)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies cardiovasculaires graves (I00-I78)	91	56	35	4,1	5,0	3,2
Maladies du coeur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	69	48	21	3,1	4,3	1,9
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques (I00-I09)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Cardiopathie hypertensive (I11)	4	2	2	0,2	0,2	0,2
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	27	20	7	1,2	1,8	0,6
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	15	9	6	0,7	0,8	0,5
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	11	10	1	0,5	0,9	0,1
Athérosclérose cardiovasculaire, décrite ainsi (I25.0)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	10	9	1	0,5	0,8	0,1
Autres cardiopathies (I26-I51)	37	26	11	1,7	2,3	1,0
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	2	2	0	0,1	0,2	0,0
Maladies du péricarde et myocardite aiguë (I30-I31, I40)	2	2	0	0,1	0,2	0,0
Insuffisance cardiaque (I50)	3	2	1	0,1	0,2	0,1
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	30	20	10	1,4	1,8	0,9
Hypertension essentielle et néphropathie hypertensive (I10, I12, I15)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	19	6	13	0,9	0,5	1,2
Athérosclérose (I70)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	3	2	1	0,1	0,2	0,1
Anévrisme aortique et dissection (I71)	2	2	0	0,1	0,2	0,0
Autres maladies des artères, des artérioles et des capillaires (I72-I78)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	6	2	4	0,3	0,2	0,4
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	16	9	7	0,7	0,8	0,6
Grippe (J09-J11)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Pneumopathie (J12-J18)	16	9	7	0,7	0,8	0,6
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	4	0	0,2	0,4	0,0
Bronchite, chronique et non précisée (J40-J42)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Emphysème (J43)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Asthme (J45-J46)	3	3	0	0,1	0,3	0,0
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	1	0	1	0,0	0,0	0,1

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-8 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 30 à 34 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	4	3	1	0,2	0,3	0,1
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	8	7	1	0,4	0,6	0,1
Ulcère gastro-duodénal (K25-K28)	4	3	1	0,2	0,3	0,1
Maladies de l'appendice (K35-K38)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Hernies (K40-K46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	19	10	9	0,9	0,9	0,8
Maladie alcoolique du foie (K70)	16	7	9	0,7	0,6	0,8
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie (K73-K74)	3	3	0	0,1	0,3	0,0
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	3	2	1	0,1	0,2	0,1
Syndrome néphritique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Insuffisance rénale (N17-N19)	3	2	1	0,1	0,2	0,1
Autres maladies des reins (N25, N27)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	0	0,0	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	0	0,0
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	5	0,5
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	0	0,0
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	5	0,5
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	21	11	10	0,9	1,0	0,9
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	41	29	12	1,8	2,6	1,1
Toutes autres maladies (résiduel) ¹¹	125	66	59	5,6	5,9	5,3
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	382	302	80	17,2	27,2	7,2
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	199	153	46	9,0	13,8	4,2
Accidents de véhicule à moteur ¹²	177	133	44	8,0	12,0	4,0
Autres accidents de transport terrestre ¹³	6	5	1	0,3	0,5	0,1
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	16	15	1	0,7	1,4	0,1
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	183	149	34	8,3	13,4	3,1
Chutes (W00-W19)	12	10	2	0,5	0,9	0,2
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	21	18	3	0,9	1,6	0,3
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	10	6	4	0,5	0,5	0,4
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	106	84	22	4,8	7,6	2,0

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-8 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 30 à 34 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	34	31	3	1,5	2,8	0,3
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	257	202	55	11,6	18,2	5,0
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	28	24	4	1,3	2,2	0,4
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	229	178	51	10,3	16,0	4,6
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	48	37	11	2,2	3,3	1,0
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	23	20	3	1,0	1,8	0,3
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	25	17	8	1,1	1,5	0,7
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	55	41	14	2,5	3,7	1,3
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	54	40	14	2,4	3,6	1,3
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	1	0	1	0,0	0,0	0,1

1. Le nombre de décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
 2. Âge au dernier anniversaire précédant le décès.
 3. Pour « Âge au décès, moins d'un an », le taux de mortalité utilise les naissances vivantes de l'année civile.
 4. Pour « Âge au décès, 1 à 4 ans », le taux de mortalité utilise les estimations de population des 0 à 4 ans moins les naissances vivantes de l'année civile.
 5. Pour « Âge au décès », chaque groupe d'âge à l'exception de « Tous les âges », le taux de mortalité représente le taux de mortalité par âge ou le nombre de décès dans un groupe d'âge particulier pendant une année donnée pour 100 000 personnes dans le même groupe d'âge au 1er juillet de la même année.
 6. À partir de 2005, les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité sont présentées à l'appendice II de la publication « Mortalité : liste sommaire des causes » (numéro 84F0209XIF au catalogue).
 7. La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
 8. Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)
 9. « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics ».
 10. Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision, et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
 11. Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
 12. Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
 13. Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.
- Note(s)** : Voir la section Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.
- Source(s)** : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès (Tableau CANSIM 102-0551) et l'appendice II.

Tableau 2-9

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 35 à 39 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)^{7, 8, 9}	2 064	1 290	774	89,4	110,8	67,7
Infections à la salmonelle (A01-A02)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Tuberculose (A16-A19)	2	1	1	0,1	0,1	0,1
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	2	1	1	0,1	0,1	0,1
Coqueluche (A37)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infection à méningocoques (A39)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Septicémie (A40-A41)	18	11	7	0,8	0,9	0,6
Syphilis (A50-A53)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	4	3	1	0,2	0,3	0,1
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	40	23	17	1,7	2,0	1,5
Paludisme (B50-B54)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ¹⁰	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Tumeurs malignes (C00-C97)	466	198	268	20,2	17,0	23,4
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	8	5	3	0,3	0,4	0,3
Tumeur maligne de l'œsophage (C15)	5	3	2	0,2	0,3	0,2
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	26	14	12	1,1	1,2	1,0
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	41	21	20	1,8	1,8	1,7
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	9	6	3	0,4	0,5	0,3
Tumeur maligne du pancréas (C25)	10	8	2	0,4	0,7	0,2
Tumeur maligne du larynx (C32)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	32	20	12	1,4	1,7	1,0
Mélanome malin de la peau (C43)	24	16	8	1,0	1,4	0,7
Tumeur maligne du sein (C50)	83	0	83	3,6	0,0	7,3
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	20	1,7
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	3	0,3
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	10	0,9
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	1	0,1	...
Tumeurs malignes du rein et du bassinnet du rein (C64-C65)	10	5	5	0,4	0,4	0,4
Tumeur maligne de la vessie (C67)	3	2	1	0,1	0,2	0,1
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	57	32	25	2,5	2,7	2,2
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	64	36	28	2,8	3,1	2,4
Maladie de Hodgkin (C81)	7	4	3	0,3	0,3	0,3
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	19	12	7	0,8	1,0	0,6
Leucémie (C91-C95)	35	18	17	1,5	1,5	1,5
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	3	2	1	0,1	0,2	0,1
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-9 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 35 à 39 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	59	28	31	2,6	2,4	2,7
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	7	2	5	0,3	0,2	0,4
Anémies (D50-D64)	2	0	2	0,1	0,0	0,2
Diabète sucré (E10-E14)	41	24	17	1,8	2,1	1,5
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Malnutrition (E40-E46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Méningite (G00, G03)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Maladie de Parkinson (G20-G21)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladie d'Alzheimer (G30)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies cardiovasculaires graves (I00-I78)	221	154	67	9,6	13,2	5,9
Maladies du coeur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	171	123	48	7,4	10,6	4,2
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques (I00-I09)	2	1	1	0,1	0,1	0,1
Cardiopathie hypertensive (I11)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	95	75	20	4,1	6,4	1,7
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	41	31	10	1,8	2,7	0,9
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	53	44	9	2,3	3,8	0,8
Athérosclérose cardiovasculaire, décrite ainsi (I25.0)	10	10	0	0,4	0,9	0,0
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	43	34	9	1,9	2,9	0,8
Autres cardiopathies (I26-I51)	73	46	27	3,2	3,9	2,4
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	4	1	3	0,2	0,1	0,3
Maladies du péricarde et myocardite aiguë (I30-I31, I40)	5	3	2	0,2	0,3	0,2
Insuffisance cardiaque (I50)	2	2	0	0,1	0,2	0,0
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	62	40	22	2,7	3,4	1,9
Hypertension essentielle et néphropathie hypertensive (I10, I12, I15)	2	0	2	0,1	0,0	0,2
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	38	25	13	1,6	2,1	1,1
Athérosclérose (I70)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	10	6	4	0,4	0,5	0,3
Anévrisme aortique et dissection (I71)	6	5	1	0,3	0,4	0,1
Autres maladies des artères, des artérioles et des capillaires (I72-I78)	4	1	3	0,2	0,1	0,3
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	8	4	4	0,3	0,3	0,3
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	27	15	12	1,2	1,3	1,0
Grippe (J09-J11)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Pneumopathie (J12-J18)	27	15	12	1,2	1,3	1,0
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	8	6	2	0,3	0,5	0,2
Bronchite, chronique et non précisée (J40-J42)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Emphysème (J43)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Asthme (J45-J46)	8	6	2	0,3	0,5	0,2
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	1	0	1	0,0	0,0	0,1

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-9 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 35 à 39 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	10	4	6	0,4	0,3	0,5
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	8	6	2	0,3	0,5	0,2
Ulcère gastro-duodénal (K25-K28)	5	3	2	0,2	0,3	0,2
Maladies de l'appendice (K35-K38)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Hernies (K40-K46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	36	23	13	1,6	2,0	1,1
Maladie alcoolique du foie (K70)	27	20	7	1,2	1,7	0,6
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie (K73-K74)	9	3	6	0,4	0,3	0,5
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	3	6	0,4	0,3	0,5
Syndrome néphritique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Insuffisance rénale (N17-N19)	7	2	5	0,3	0,2	0,4
Autres maladies des reins (N25, N27)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	0	0,0	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	0	0,0
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	14	1,2
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	1	0,1
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	13	1,1
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	32	19	13	1,4	1,6	1,1
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	69	46	23	3,0	3,9	2,0
Toutes autres maladies (résiduel) ¹¹	173	94	79	7,5	8,1	6,9
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	425	322	103	18,4	27,6	9,0
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	192	152	40	8,3	13,1	3,5
Accidents de véhicule à moteur ¹²	169	132	37	7,3	11,3	3,2
Autres accidents de transport terrestre ¹³	4	4	0	0,2	0,3	0,0
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	19	16	3	0,8	1,4	0,3
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	233	170	63	10,1	14,6	5,5
Chutes (W00-W19)	14	11	3	0,6	0,9	0,3
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	13	9	4	0,6	0,8	0,3
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	10	8	2	0,4	0,7	0,2
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	152	108	44	6,6	9,3	3,8

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-9 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 35 à 39 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	43	33	10	1,9	2,8	0,9
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	316	240	76	13,7	20,6	6,6
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	26	25	1	1,1	2,1	0,1
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	290	215	75	12,6	18,5	6,6
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	43	35	8	1,9	3,0	0,7
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	14	13	1	0,6	1,1	0,1
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	29	22	7	1,3	1,9	0,6
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	2	2	0	0,1	0,2	0,0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	69	48	21	3,0	4,1	1,8
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	68	48	20	2,9	4,1	1,7
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	0	0	0	0,0	0,0	0,0

1. Le nombre de décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
 2. Âge au dernier anniversaire précédant le décès.
 3. Pour « Âge au décès, moins d'un an », le taux de mortalité utilise les naissances vivantes de l'année civile.
 4. Pour « Âge au décès, 1 à 4 ans », le taux de mortalité utilise les estimations de population des 0 à 4 ans moins les naissances vivantes de l'année civile.
 5. Pour « Âge au décès », chaque groupe d'âge à l'exception de « Tous les âges », le taux de mortalité représente le taux de mortalité par âge ou le nombre de décès dans un groupe d'âge particulier pendant une année donnée pour 100 000 personnes dans le même groupe d'âge au 1er juillet de la même année.
 6. À partir de 2005, les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité sont présentées à l'appendice II de la publication « Mortalité : liste sommaire des causes » (numéro 84F0209XIF au catalogue).
 7. La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
 8. Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)
 9. « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics ».
 10. Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision, et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
 11. Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
 12. Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
 13. Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.
- Note(s)** : Voir la section Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.
- Source(s)** : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès (Tableau CANSIM 102-0551) et l'appendice II.

Tableau 2-10

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 40 à 44 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)^{7, 8, 9}	3 392	2 063	1 329	132,4	159,7	104,6
Infections à la salmonelle (A01-A02)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Tuberculose (A16-A19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Coqueluche (A37)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infection à méningocoques (A39)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Septicémie (A40-A41)	20	10	10	0,8	0,8	0,8
Syphilis (A50-A53)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	17	12	5	0,7	0,9	0,4
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	85	62	23	3,3	4,8	1,8
Paludisme (B50-B54)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ¹⁰	5	3	2	0,2	0,2	0,2
Tumeurs malignes (C00-C97)	882	346	536	34,4	26,8	42,2
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	21	14	7	0,8	1,1	0,6
Tumeur maligne de l'œsophage (C15)	20	19	1	0,8	1,5	0,1
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	39	15	24	1,5	1,2	1,9
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	89	44	45	3,5	3,4	3,5
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	25	18	7	1,0	1,4	0,6
Tumeur maligne du pancréas (C25)	37	17	20	1,4	1,3	1,6
Tumeur maligne du larynx (C32)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	113	54	59	4,4	4,2	4,6
Mélanome malin de la peau (C43)	27	10	17	1,1	0,8	1,3
Tumeur maligne du sein (C50)	177	1	176	6,9	0,1	13,8
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	27	2,1
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	10	0,8
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	17	1,3
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	1	0,1	...
Tumeurs malignes du rein et du bassinnet du rein (C64-C65)	20	12	8	0,8	0,9	0,6
Tumeur maligne de la vessie (C67)	8	4	4	0,3	0,3	0,3
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	75	43	32	2,9	3,3	2,5
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	86	48	38	3,4	3,7	3,0
Maladie de Hodgkin (C81)	6	4	2	0,2	0,3	0,2
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	34	25	9	1,3	1,9	0,7
Leucémie (C91-C95)	36	13	23	1,4	1,0	1,8
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	10	6	4	0,4	0,5	0,3
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-10 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 40 à 44 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	90	46	44	3,5	3,6	3,5
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	15	6	9	0,6	0,5	0,7
Anémies (D50-D64)	2	2	0	0,1	0,2	0,0
Diabète sucré (E10-E14)	68	38	30	2,7	2,9	2,4
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Malnutrition (E40-E46)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Méningite (G00, G03)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Maladie de Parkinson (G20-G21)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladie d'Alzheimer (G30)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies cardiovasculaires graves (I00-I78)	509	364	145	19,9	28,2	11,4
Maladies du coeur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	399	306	93	15,6	23,7	7,3
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques (I00-I09)	4	1	3	0,2	0,1	0,2
Cardiopathie hypertensive (I11)	9	7	2	0,4	0,5	0,2
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	263	215	48	10,3	16,6	3,8
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	133	108	25	5,2	8,4	2,0
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	4	3	1	0,2	0,2	0,1
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	126	104	22	4,9	8,1	1,7
Athérosclérose cardiovasculaire, décrite ainsi (I25.0)	17	14	3	0,7	1,1	0,2
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	109	90	19	4,3	7,0	1,5
Autres cardiopathies (I26-I51)	123	83	40	4,8	6,4	3,1
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	5	3	2	0,2	0,2	0,2
Maladies du péricarde et myocardite aiguë (I30-I31, I40)	2	0	2	0,1	0,0	0,2
Insuffisance cardiaque (I50)	9	7	2	0,4	0,5	0,2
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	107	73	34	4,2	5,7	2,7
Hypertension essentielle et néphropathie hypertensive (I10, I12, I15)	9	7	2	0,4	0,5	0,2
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	81	37	44	3,2	2,9	3,5
Athérosclérose (I70)	3	2	1	0,1	0,2	0,1
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	17	12	5	0,7	0,9	0,4
Anévrisme aortique et dissection (I71)	9	8	1	0,4	0,6	0,1
Autres maladies des artères, des artérioles et des capillaires (I72-I78)	8	4	4	0,3	0,3	0,3
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	8	3	5	0,3	0,2	0,4
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	36	22	14	1,4	1,7	1,1
Grippe (J09-J11)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Pneumopathie (J12-J18)	35	22	13	1,4	1,7	1,0
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	24	12	12	0,9	0,9	0,9
Bronchite, chronique et non précisée (J40-J42)	3	2	1	0,1	0,2	0,1
Emphysème (J43)	2	1	1	0,1	0,1	0,1
Asthme (J45-J46)	4	0	4	0,2	0,0	0,3
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	15	9	6	0,6	0,7	0,5
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	4	1	3	0,2	0,1	0,2

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-10 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 40 à 44 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	4	2	2	0,2	0,2	0,2
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	20	11	9	0,8	0,9	0,7
Ulcère gastro-duodénal (K25-K28)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Maladies de l'appendice (K35-K38)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hernies (K40-K46)	4	3	1	0,2	0,2	0,1
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	114	72	42	4,4	5,6	3,3
Maladie alcoolique du foie (K70)	86	58	28	3,4	4,5	2,2
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie (K73-K74)	28	14	14	1,1	1,1	1,1
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	16	6	10	0,6	0,5	0,8
Syndrome néphritique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Insuffisance rénale (N17-N19)	15	6	9	0,6	0,5	0,7
Autres maladies des reins (N25, N27)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	2	1	1	0,1	0,1	0,1
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	0	0,0	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	0	0,0
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	2	0,2
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	0	0,0
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	2	0,2
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	39	24	15	1,5	1,9	1,2
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	86	56	30	3,4	4,3	2,4
Toutes autres maladies (résiduel) ¹¹	310	178	132	12,1	13,8	10,4
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	501	365	136	19,5	28,3	10,7
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	181	136	45	7,1	10,5	3,5
Accidents de véhicule à moteur ¹²	157	115	42	6,1	8,9	3,3
Autres accidents de transport terrestre ¹³	4	4	0	0,2	0,3	0,0
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	20	17	3	0,8	1,3	0,2
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	320	229	91	12,5	17,7	7,2
Chutes (W00-W19)	27	22	5	1,1	1,7	0,4
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	20	17	3	0,8	1,3	0,2
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	21	15	6	0,8	1,2	0,5
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	192	126	66	7,5	9,8	5,2

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-10 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 40 à 44 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	60	49	11	2,3	3,8	0,9
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	452	354	98	17,6	27,4	7,7
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	46	42	4	1,8	3,3	0,3
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	406	312	94	15,8	24,2	7,4
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	52	42	10	2,0	3,3	0,8
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	14	12	2	0,5	0,9	0,2
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	38	30	8	1,5	2,3	0,6
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	4	3	1	0,2	0,2	0,1
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	99	62	37	3,9	4,8	2,9
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	99	62	37	3,9	4,8	2,9
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	6	1	5	0,2	0,1	0,4

1. Le nombre de décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
 2. Âge au dernier anniversaire précédant le décès.
 3. Pour « Âge au décès, moins d'un an », le taux de mortalité utilise les naissances vivantes de l'année civile.
 4. Pour « Âge au décès, 1 à 4 ans », le taux de mortalité utilise les estimations de population des 0 à 4 ans moins les naissances vivantes de l'année civile.
 5. Pour « Âge au décès », chaque groupe d'âge à l'exception de « Tous les âges », le taux de mortalité représente le taux de mortalité par âge ou le nombre de décès dans un groupe d'âge particulier pendant une année donnée pour 100 000 personnes dans le même groupe d'âge au 1er juillet de la même année.
 6. À partir de 2005, les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité sont présentées à l'appendice II de la publication « Mortalité : liste sommaire des causes » (numéro 84F0209XIF au catalogue).
 7. La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
 8. Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)
 9. « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics ».
 10. Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision, et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
 11. Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
 12. Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
 13. Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.
- Note(s) :** Voir la section Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.
- Source(s) :** Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès (Tableau CANSIM 102-0551) et l'appendice II.

Tableau 2-11

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 45 à 49 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)^{7, 8, 9}	5 803	3 453	2 350	210,9	249,9	171,5
Infections à la salmonelle (A01-A02)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Tuberculose (A16-A19)	2	2	0	0,1	0,1	0,0
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	2	2	0	0,1	0,1	0,0
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Coqueluche (A37)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Infection à méningocoques (A39)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Septicémie (A40-A41)	33	21	12	1,2	1,5	0,9
Syphilis (A50-A53)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	40	29	11	1,5	2,1	0,8
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	98	78	20	3,6	5,6	1,5
Paludisme (B50-B54)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ¹⁰	9	6	3	0,3	0,4	0,2
Tumeurs malignes (C00-C97)	2 033	870	1 163	73,9	63,0	84,9
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	51	36	15	1,9	2,6	1,1
Tumeur maligne de l'œsophage (C15)	48	38	10	1,7	2,8	0,7
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	61	37	24	2,2	2,7	1,8
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	174	93	81	6,3	6,7	5,9
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	53	32	21	1,9	2,3	1,5
Tumeur maligne du pancréas (C25)	104	65	39	3,8	4,7	2,8
Tumeur maligne du larynx (C32)	8	8	0	0,3	0,6	0,0
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	449	195	254	16,3	14,1	18,5
Mélanome malin de la peau (C43)	60	34	26	2,2	2,5	1,9
Tumeur maligne du sein (C50)	333	0	333	12,1	0,0	24,3
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	36	2,6
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	20	1,5
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	75	5,5
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	10	0,7	...
Tumeurs malignes du rein et du bassin du rein (C64-C65)	54	44	10	2,0	3,2	0,7
Tumeur maligne de la vessie (C67)	16	10	6	0,6	0,7	0,4
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	130	74	56	4,7	5,4	4,1
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	156	100	56	5,7	7,2	4,1
Maladie de Hodgkin (C81)	5	5	0	0,2	0,4	0,0
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	61	41	20	2,2	3,0	1,5
Leucémie (C91-C95)	66	40	26	2,4	2,9	1,9
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	24	14	10	0,9	1,0	0,7
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-11 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 45 à 49 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	195	94	101	7,1	6,8	7,4
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	27	14	13	1,0	1,0	0,9
Anémies (D50-D64)	5	3	2	0,2	0,2	0,1
Diabète sucré (E10-E14)	135	93	42	4,9	6,7	3,1
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	4	1	3	0,1	0,1	0,2
Malnutrition (E40-E46)	4	1	3	0,1	0,1	0,2
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Méningite (G00, G03)	8	5	3	0,3	0,4	0,2
Maladie de Parkinson (G20-G21)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Maladie d'Alzheimer (G30)	2	2	0	0,1	0,1	0,0
Maladies cardiovasculaires graves (I00-I78)	1 076	796	280	39,1	57,6	20,4
Maladies du coeur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	846	664	182	30,7	48,1	13,3
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques (I00-I09)	12	4	8	0,4	0,3	0,6
Cardiopathie hypertensive (I11)	24	17	7	0,9	1,2	0,5
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	645	534	111	23,4	38,7	8,1
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	320	270	50	11,6	19,5	3,6
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	16	11	5	0,6	0,8	0,4
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	309	253	56	11,2	18,3	4,1
Athérosclérose cardiovasculaire, décrite ainsi (I25.0)	34	28	6	1,2	2,0	0,4
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	275	225	50	10,0	16,3	3,6
Autres cardiopathies (I26-I51)	164	108	56	6,0	7,8	4,1
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	4	2	2	0,1	0,1	0,1
Maladies du péricarde et myocardite aiguë (I30-I31, I40)	4	4	0	0,1	0,3	0,0
Insuffisance cardiaque (I50)	19	12	7	0,7	0,9	0,5
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	137	90	47	5,0	6,5	3,4
Hypertension essentielle et néphropathie hypertensive (I10, I12, I15)	9	7	2	0,3	0,5	0,1
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	178	98	80	6,5	7,1	5,8
Athérosclérose (I70)	4	2	2	0,1	0,1	0,1
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	39	25	14	1,4	1,8	1,0
Anévrisme aortique et dissection (I71)	24	19	5	0,9	1,4	0,4
Autres maladies des artères, des artérioles et des capillaires (I72-I78)	15	6	9	0,5	0,4	0,7
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	14	5	9	0,5	0,4	0,7
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	71	35	36	2,6	2,5	2,6
Grippe (J09-J11)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Pneumopathie (J12-J18)	70	35	35	2,5	2,5	2,6
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	2	1	1	0,1	0,1	0,1
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	2	1	1	0,1	0,1	0,1
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	49	21	28	1,8	1,5	2,0
Bronchite, chronique et non précisée (J40-J42)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Emphysème (J43)	5	4	1	0,2	0,3	0,1
Asthme (J45-J46)	10	3	7	0,4	0,2	0,5
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	34	14	20	1,2	1,0	1,5
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	4	1	3	0,1	0,1	0,2

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-11 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 45 à 49 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	16	5	11	0,6	0,4	0,8
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	22	9	13	0,8	0,7	0,9
Ulcère gastro-duodénal (K25-K28)	13	11	2	0,5	0,8	0,1
Maladies de l'appendice (K35-K38)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hernies (K40-K46)	2	0	2	0,1	0,0	0,1
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	205	131	74	7,5	9,5	5,4
Maladie alcoolique du foie (K70)	164	105	59	6,0	7,6	4,3
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie (K73-K74)	41	26	15	1,5	1,9	1,1
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	4	1	3	0,1	0,1	0,2
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	27	15	12	1,0	1,1	0,9
Syndrome néphritique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Insuffisance rénale (N17-N19)	27	15	12	1,0	1,1	0,9
Autres maladies des reins (N25, N27)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	0	0,0	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	1	0,1
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	0	0,0
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	0	0,0
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	0	0,0
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	35	21	14	1,3	1,5	1,0
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	106	66	40	3,9	4,8	2,9
Toutes autres maladies (résiduel) ¹¹	523	313	210	19,0	22,7	15,3
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	602	438	164	21,9	31,7	12,0
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	246	186	60	8,9	13,5	4,4
Accidents de véhicule à moteur ¹²	217	163	54	7,9	11,8	3,9
Autres accidents de transport terrestre ¹³	6	4	2	0,2	0,3	0,1
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	23	19	4	0,8	1,4	0,3
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	356	252	104	12,9	18,2	7,6
Chutes (W00-W19)	51	38	13	1,9	2,8	0,9
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	20	14	6	0,7	1,0	0,4
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	21	12	9	0,8	0,9	0,7
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	194	130	64	7,1	9,4	4,7

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-11 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 45 à 49 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	70	58	12	2,5	4,2	0,9
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	468	337	131	17,0	24,4	9,6
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	57	54	3	2,1	3,9	0,2
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	411	283	128	14,9	20,5	9,3
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	56	43	13	2,0	3,1	0,9
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	8	6	2	0,3	0,4	0,1
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	48	37	11	1,7	2,7	0,8
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	99	72	27	3,6	5,2	2,0
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	98	71	27	3,6	5,1	2,0
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	4	2	2	0,1	0,1	0,1

1. Le nombre de décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.

2. Âge au dernier anniversaire précédant le décès.

3. Pour « Âge au décès, moins d'un an », le taux de mortalité utilise les naissances vivantes de l'année civile.

4. Pour « Âge au décès, 1 à 4 ans », le taux de mortalité utilise les estimations de population des 0 à 4 ans moins les naissances vivantes de l'année civile.

5. Pour « Âge au décès », chaque groupe d'âge à l'exception de « Tous les âges », le taux de mortalité représente le taux de mortalité par âge ou le nombre de décès dans un groupe d'âge particulier pendant une année donnée pour 100 000 personnes dans le même groupe d'âge au 1er juillet de la même année.

6. À partir de 2005, les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité sont présentées à l'appendice II de la publication « Mortalité : liste sommaire des causes » (numéro 84F0209XIF au catalogue).

7. La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.

8. Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)

9. « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics ».

10. Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision, et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.

11. Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.

12. Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.

13. Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.

Note(s) : Voir la section Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.

Source(s) : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès (Tableau CANSIM 102-0551) et l'appendice II.

Tableau 2-12

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 50 à 54 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)^{7, 8, 9}	8 635	5 300	3 335	342,2	422,4	262,9
Infections à la salmonelle (A01-A02)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	6	6	0	0,2	0,5	0,0
Tuberculose (A16-A19)	5	2	3	0,2	0,2	0,2
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	4	2	2	0,2	0,2	0,2
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Coqueluche (A37)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infection à méningocoques (A39)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Septicémie (A40-A41)	60	31	29	2,4	2,5	2,3
Syphilis (A50-A53)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	100	72	28	4,0	5,7	2,2
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	60	50	10	2,4	4,0	0,8
Paludisme (B50-B54)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ¹⁰	23	15	8	0,9	1,2	0,6
Tumeurs malignes (C00-C97)	3 537	1 768	1 769	140,2	140,9	139,4
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	73	49	24	2,9	3,9	1,9
Tumeur maligne de l'œsophage (C15)	122	107	15	4,8	8,5	1,2
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	110	74	36	4,4	5,9	2,8
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	366	212	154	14,5	16,9	12,1
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	134	101	33	5,3	8,0	2,6
Tumeur maligne du pancréas (C25)	193	106	87	7,6	8,4	6,9
Tumeur maligne du larynx (C32)	19	16	3	0,8	1,3	0,2
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	914	466	448	36,2	37,1	35,3
Mélanome malin de la peau (C43)	72	53	19	2,9	4,2	1,5
Tumeur maligne du sein (C50)	392	8	384	15,5	0,6	30,3
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	41	3,2
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	34	2,7
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	127	10,0
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	35	2,8	...
Tumeurs malignes du rein et du bassin du rein (C64-C65)	86	66	20	3,4	5,3	1,6
Tumeur maligne de la vessie (C67)	39	31	8	1,5	2,5	0,6
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	161	97	64	6,4	7,7	5,0
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	262	173	89	10,4	13,8	7,0
Maladie de Hodgkin (C81)	2	1	1	0,1	0,1	0,1
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	115	80	35	4,6	6,4	2,8
Leucémie (C91-C95)	101	60	41	4,0	4,8	3,2
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	43	31	12	1,7	2,5	0,9
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	1	1	0	0,0	0,1	0,0

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-12 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 50 à 54 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	357	174	183	14,1	13,9	14,4
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	39	22	17	1,5	1,8	1,3
Anémies (D50-D64)	7	4	3	0,3	0,3	0,2
Diabète sucré (E10-E14)	227	151	76	9,0	12,0	6,0
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	2	0	2	0,1	0,0	0,2
Malnutrition (E40-E46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	2	0	2	0,1	0,0	0,2
Méningite (G00, G03)	5	4	1	0,2	0,3	0,1
Maladie de Parkinson (G20-G21)	5	3	2	0,2	0,2	0,2
Maladie d'Alzheimer (G30)	8	5	3	0,3	0,4	0,2
Maladies cardiovasculaires graves (I00-I78)	1 729	1 322	407	68,5	105,4	32,1
Maladies du coeur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	1 404	1 128	276	55,6	89,9	21,8
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques (I00-I09)	11	5	6	0,4	0,4	0,5
Cardiopathie hypertensive (I11)	21	16	5	0,8	1,3	0,4
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	1 128	950	178	44,7	75,7	14,0
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	544	463	81	21,6	36,9	6,4
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	35	33	2	1,4	2,6	0,2
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	549	454	95	21,8	36,2	7,5
Athérosclérose cardiovasculaire, décrite ainsi (I25.0)	85	60	25	3,4	4,8	2,0
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	464	394	70	18,4	31,4	5,5
Autres cardiopathies (I26-I51)	244	157	87	9,7	12,5	6,9
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	5	3	2	0,2	0,2	0,2
Maladies du péricarde et myocardite aiguë (I30-I31, I40)	4	3	1	0,2	0,2	0,1
Insuffisance cardiaque (I50)	36	27	9	1,4	2,2	0,7
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	199	124	75	7,9	9,9	5,9
Hypertension essentielle et néphropathie hypertensive (I10, I12, I15)	22	16	6	0,9	1,3	0,5
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	237	132	105	9,4	10,5	8,3
Athérosclérose (I70)	12	7	5	0,5	0,6	0,4
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	54	39	15	2,1	3,1	1,2
Anévrisme aortique et dissection (I71)	31	27	4	1,2	2,2	0,3
Autres maladies des artères, des artérioles et des capillaires (I72-I78)	23	12	11	0,9	1,0	0,9
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	16	10	6	0,6	0,8	0,5
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	116	70	46	4,6	5,6	3,6
Grippe (J09-J11)	2	2	0	0,1	0,2	0,0
Pneumopathie (J12-J18)	114	68	46	4,5	5,4	3,6
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	128	60	68	5,1	4,8	5,4
Bronchite, chronique et non précisée (J40-J42)	2	2	0	0,1	0,2	0,0
Emphysème (J43)	12	8	4	0,5	0,6	0,3
Asthme (J45-J46)	15	4	11	0,6	0,3	0,9
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	99	46	53	3,9	3,7	4,2
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	4	3	1	0,2	0,2	0,1

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-12 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 50 à 54 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	24	13	11	1,0	1,0	0,9
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	56	29	27	2,2	2,3	2,1
Ulcère gastro-duodénal (K25-K28)	24	21	3	1,0	1,7	0,2
Maladies de l'appendice (K35-K38)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Hernies (K40-K46)	9	6	3	0,4	0,5	0,2
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	340	240	100	13,5	19,1	7,9
Maladie alcoolique du foie (K70)	238	170	68	9,4	13,5	5,4
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie (K73-K74)	102	70	32	4,0	5,6	2,5
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	6	2	4	0,2	0,2	0,3
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	44	25	19	1,7	2,0	1,5
Syndrome néphritique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	3	3	0	0,1	0,2	0,0
Insuffisance rénale (N17-N19)	41	22	19	1,6	1,8	1,5
Autres maladies des reins (N25, N27)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	3	0	3	0,1	0,0	0,2
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	1	0,1	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	2	0,2
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	0	0,0
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	0	0,0
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	0	0,0
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	54	21	33	2,1	1,7	2,6
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	131	93	38	5,2	7,4	3,0
Toutes autres maladies (résiduel) ¹¹	669	421	248	26,5	33,6	19,5
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	642	442	200	25,4	35,2	15,8
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	218	155	63	8,6	12,4	5,0
Accidents de véhicule à moteur ¹²	192	134	58	7,6	10,7	4,6
Autres accidents de transport terrestre ¹³	6	4	2	0,2	0,3	0,2
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	20	17	3	0,8	1,4	0,2
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	424	287	137	16,8	22,9	10,8
Chutes (W00-W19)	66	55	11	2,6	4,4	0,9
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	2	2	0	0,1	0,2	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	17	14	3	0,7	1,1	0,2
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	27	15	12	1,1	1,2	0,9
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	233	138	95	9,2	11,0	7,5

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-12 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 50 à 54 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	79	63	16	3,1	5,0	1,3
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	418	310	108	16,6	24,7	8,5
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	57	56	1	2,3	4,5	0,1
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	361	254	107	14,3	20,2	8,4
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	36	24	12	1,4	1,9	0,9
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	35	24	11	1,4	1,9	0,9
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	90	52	38	3,6	4,1	3,0
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	90	52	38	3,6	4,1	3,0
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	6	2	4	0,2	0,2	0,3

1. Le nombre de décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
 2. Âge au dernier anniversaire précédant le décès.
 3. Pour « Âge au décès, moins d'un an », le taux de mortalité utilise les naissances vivantes de l'année civile.
 4. Pour « Âge au décès, 1 à 4 ans », le taux de mortalité utilise les estimations de population des 0 à 4 ans moins les naissances vivantes de l'année civile.
 5. Pour « Âge au décès », chaque groupe d'âge à l'exception de « Tous les âges », le taux de mortalité représente le taux de mortalité par âge ou le nombre de décès dans un groupe d'âge particulier pendant une année donnée pour 100 000 personnes dans le même groupe d'âge au 1er juillet de la même année.
 6. À partir de 2005, les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité sont présentées à l'appendice II de la publication « Mortalité : liste sommaire des causes » (numéro 84F0209XIF au catalogue).
 7. La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
 8. Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)
 9. « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics ».
 10. Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision, et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
 11. Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
 12. Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
 13. Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.
- Note(s) :** Voir la section Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.
- Source(s) :** Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès (Tableau CANSIM 102-0551) et l'appendice II.

Tableau 2-13

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 55 à 59 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)^{7, 8, 9}	11 334	6 904	4 430	526,6	650,0	406,3
Infections à la salmonelle (A01-A02)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	20	7	13	0,9	0,7	1,2
Tuberculose (A16-A19)	4	2	2	0,2	0,2	0,2
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	3	1	2	0,1	0,1	0,2
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Coqueluche (A37)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infection à méningocoques (A39)	2	1	1	0,1	0,1	0,1
Septicémie (A40-A41)	70	33	37	3,3	3,1	3,4
Syphilis (A50-A53)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	92	68	24	4,3	6,4	2,2
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	46	39	7	2,1	3,7	0,6
Paludisme (B50-B54)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ¹⁰	29	15	14	1,3	1,4	1,3
Tumeurs malignes (C00-C97)	5 140	2 637	2 503	238,8	248,3	229,6
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	115	76	39	5,3	7,2	3,6
Tumeur maligne de l'œsophage (C15)	172	146	26	8,0	13,7	2,4
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	115	65	50	5,3	6,1	4,6
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	550	322	228	25,6	30,3	20,9
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	160	129	31	7,4	12,1	2,8
Tumeur maligne du pancréas (C25)	276	149	127	12,8	14,0	11,6
Tumeur maligne du larynx (C32)	32	31	1	1,5	2,9	0,1
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	1 509	808	701	70,1	76,1	64,3
Mélanome malin de la peau (C43)	91	58	33	4,2	5,5	3,0
Tumeur maligne du sein (C50)	475	4	471	22,1	0,4	43,2
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	37	3,4
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	74	6,8
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	151	13,9
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	76	7,2	...
Tumeurs malignes du rein et du bassinnet du rein (C64-C65)	140	103	37	6,5	9,7	3,4
Tumeur maligne de la vessie (C67)	74	54	20	3,4	5,1	1,8
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	187	105	82	8,7	9,9	7,5
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	386	234	152	17,9	22,0	13,9
Maladie de Hodgkin (C81)	5	3	2	0,2	0,3	0,2
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	168	109	59	7,8	10,3	5,4
Leucémie (C91-C95)	119	67	52	5,5	6,3	4,8
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	93	55	38	4,3	5,2	3,5
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	1	0	1	0,0	0,0	0,1

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-13 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 55 à 59 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	520	277	243	24,2	26,1	22,3
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	50	29	21	2,3	2,7	1,9
Anémies (D50-D64)	8	3	5	0,4	0,3	0,5
Diabète sucré (E10-E14)	299	209	90	13,9	19,7	8,3
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	7	5	2	0,3	0,5	0,2
Malnutrition (E40-E46)	6	4	2	0,3	0,4	0,2
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Méningite (G00, G03)	7	6	1	0,3	0,6	0,1
Maladie de Parkinson (G20-G21)	9	6	3	0,4	0,6	0,3
Maladie d'Alzheimer (G30)	11	4	7	0,5	0,4	0,6
Maladies cardiovasculaires graves (I00-I78)	2 489	1 848	641	115,6	174,0	58,8
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2 067	1 608	459	96,0	151,4	42,1
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques (I00-I09)	12	6	6	0,6	0,6	0,6
Cardiopathie hypertensive (I11)	28	21	7	1,3	2,0	0,6
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	3	3	0	0,1	0,3	0,0
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	1 656	1 335	321	76,9	125,7	29,4
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	815	662	153	37,9	62,3	14,0
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	41	31	10	1,9	2,9	0,9
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	800	642	158	37,2	60,4	14,5
Athérosclérose cardiovasculaire, décrite ainsi (I25.0)	108	95	13	5,0	8,9	1,2
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	692	547	145	32,2	51,5	13,3
Autres cardiopathies (I26-I51)	368	243	125	17,1	22,9	11,5
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	8	3	5	0,4	0,3	0,5
Maladies du péricarde et myocardite aiguë (I30-I31, I40)	11	6	5	0,5	0,6	0,5
Insuffisance cardiaque (I50)	58	42	16	2,7	4,0	1,5
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	291	192	99	13,5	18,1	9,1
Hypertension essentielle et néphropathie hypertensive (I10, I12, I15)	18	9	9	0,8	0,8	0,8
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	311	167	144	14,4	15,7	13,2
Athérosclérose (I70)	12	7	5	0,6	0,7	0,5
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	81	57	24	3,8	5,4	2,2
Anévrisme aortique et dissection (I71)	59	45	14	2,7	4,2	1,3
Autres maladies des artères, des artérioles et des capillaires (I72-I78)	22	12	10	1,0	1,1	0,9
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	21	11	10	1,0	1,0	0,9
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	126	76	50	5,9	7,2	4,6
Grippe (J09-J11)	2	0	2	0,1	0,0	0,2
Pneumopathie (J12-J18)	124	76	48	5,8	7,2	4,4
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	4	1	3	0,2	0,1	0,3
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	4	1	3	0,2	0,1	0,3
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	242	126	116	11,2	11,9	10,6
Bronchite, chronique et non précisée (J40-J42)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Emphysème (J43)	25	10	15	1,2	0,9	1,4
Asthme (J45-J46)	17	7	10	0,8	0,7	0,9
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	199	109	90	9,2	10,3	8,3

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-13 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 55 à 59 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	4	2	2	0,2	0,2	0,2
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	37	25	12	1,7	2,4	1,1
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	87	60	27	4,0	5,6	2,5
Ulcère gastro-duodénal (K25-K28)	26	15	11	1,2	1,4	1,0
Maladies de l'appendice (K35-K38)	2	1	1	0,1	0,1	0,1
Hernies (K40-K46)	5	3	2	0,2	0,3	0,2
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	379	271	108	17,6	25,5	9,9
Maladie alcoolique du foie (K70)	238	176	62	11,1	16,6	5,7
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie (K73-K74)	141	95	46	6,6	8,9	4,2
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	9	2	7	0,4	0,2	0,6
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	74	39	35	3,4	3,7	3,2
Syndrome néphritique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	5	1	4	0,2	0,1	0,4
Insuffisance rénale (N17-N19)	69	38	31	3,2	3,6	2,8
Autres maladies des reins (N25, N27)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	0	0,0	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	1	0,1
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	0	0,0
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	0	0,0
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	0	0,0
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	59	31	28	2,7	2,9	2,6
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	127	82	45	5,9	7,7	4,1
Toutes autres maladies (résiduel) ¹¹	879	550	329	40,8	51,8	30,2
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	543	398	145	25,2	37,5	13,3
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	200	153	47	9,3	14,4	4,3
Accidents de véhicule à moteur ¹²	173	127	46	8,0	12,0	4,2
Autres accidents de transport terrestre ¹³	5	5	0	0,2	0,5	0,0
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	22	21	1	1,0	2,0	0,1
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	343	245	98	15,9	23,1	9,0
Chutes (W00-W19)	95	64	31	4,4	6,0	2,8
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	19	16	3	0,9	1,5	0,3

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-13 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 55 à 59 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	18	12	6	0,8	1,1	0,6
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	129	85	44	6,0	8,0	4,0
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	82	68	14	3,8	6,4	1,3
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	337	236	101	15,7	22,2	9,3
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	54	53	1	2,5	5,0	0,1
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	283	183	100	13,1	17,2	9,2
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	18	14	4	0,8	1,3	0,4
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	5	3	2	0,2	0,3	0,2
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	13	11	2	0,6	1,0	0,2
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	58	40	18	2,7	3,8	1,7
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	57	39	18	2,6	3,7	1,7
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	10	7	3	0,5	0,7	0,3

1. Le nombre de décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
 2. Âge au dernier anniversaire précédant le décès.
 3. Pour « Âge au décès, moins d'un an », le taux de mortalité utilise les naissances vivantes de l'année civile.
 4. Pour « Âge au décès, 1 à 4 ans », le taux de mortalité utilise les estimations de population des 0 à 4 ans moins les naissances vivantes de l'année civile.
 5. Pour « Âge au décès », chaque groupe d'âge à l'exception de « Tous les âges », le taux de mortalité représente le taux de mortalité par âge ou le nombre de décès dans un groupe d'âge particulier pendant une année donnée pour 100 000 personnes dans le même groupe d'âge au 1er juillet de la même année.
 6. À partir de 2005, les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité sont présentées à l'appendice II de la publication « Mortalité : liste sommaire des causes » (numéro 84F0209XIF au catalogue).
 7. La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
 8. Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)
 9. « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics ».
 10. Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision, et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
 11. Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
 12. Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
 13. Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.
- Note(s)** : Voir la section Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.
- Source(s)** : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès (Tableau CANSIM 102-0551) et l'appendice II.

Tableau 2-14

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 60 à 64 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)^{7, 8, 9}	14 606	8 946	5 660	808,3	1 007,7	615,7
Infections à la salmonelle (A01-A02)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	17	11	6	0,9	1,2	0,7
Tuberculose (A16-A19)	2	2	0	0,1	0,2	0,0
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	2	2	0	0,1	0,2	0,0
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Coqueluche (A37)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infection à méningocoques (A39)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Septicémie (A40-A41)	116	60	56	6,4	6,8	6,1
Syphilis (A50-A53)	1	1	0	0,1	0,1	0,0
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	58	42	16	3,2	4,7	1,7
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	23	19	4	1,3	2,1	0,4
Paludisme (B50-B54)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ¹⁰	43	27	16	2,4	3,0	1,7
Tumeurs malignes (C00-C97)	6 997	3 854	3 143	387,2	434,1	341,9
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	135	103	32	7,5	11,6	3,5
Tumeur maligne de l'oesophage (C15)	225	191	34	12,5	21,5	3,7
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	186	125	61	10,3	14,1	6,6
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	662	426	236	36,6	48,0	25,7
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	210	145	65	11,6	16,3	7,1
Tumeur maligne du pancréas (C25)	402	244	158	22,2	27,5	17,2
Tumeur maligne du larynx (C32)	66	57	9	3,7	6,4	1,0
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	2 240	1 232	1 008	124,0	138,8	109,7
Mélanome malin de la peau (C43)	101	73	28	5,6	8,2	3,0
Tumeur maligne du sein (C50)	517	5	512	28,6	0,6	55,7
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	35	3,8
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	85	9,2
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	193	21,0
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	165	18,6	...
Tumeurs malignes du rein et du bassinnet du rein (C64-C65)	171	118	53	9,5	13,3	5,8
Tumeur maligne de la vessie (C67)	112	82	30	6,2	9,2	3,3
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	248	149	99	13,7	16,8	10,8
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	564	344	220	31,2	38,8	23,9
Maladie de Hodgkin (C81)	9	5	4	0,5	0,6	0,4
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	260	160	100	14,4	18,0	10,9
Leucémie (C91-C95)	180	112	68	10,0	12,6	7,4
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	115	67	48	6,4	7,5	5,2
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-14 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 60 à 64 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	680	395	285	37,6	44,5	31,0
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	57	29	28	3,2	3,3	3,0
Anémies (D50-D64)	7	5	2	0,4	0,6	0,2
Diabète sucré (E10-E14)	542	347	195	30,0	39,1	21,2
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	6	1	5	0,3	0,1	0,5
Malnutrition (E40-E46)	6	1	5	0,3	0,1	0,5
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Méningite (G00, G03)	4	4	0	0,2	0,5	0,0
Maladie de Parkinson (G20-G21)	24	20	4	1,3	2,3	0,4
Maladie d'Alzheimer (G30)	49	29	20	2,7	3,3	2,2
Maladies cardiovasculaires graves (I00-I78)	3 219	2 363	856	178,1	266,2	93,1
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2 594	1 969	625	143,6	221,8	68,0
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques (I00-I09)	26	14	12	1,4	1,6	1,3
Cardiopathie hypertensive (I11)	30	20	10	1,7	2,3	1,1
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	2 132	1 663	469	118,0	187,3	51,0
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	1 011	782	229	56,0	88,1	24,9
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	52	40	12	2,9	4,5	1,3
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	1 069	841	228	59,2	94,7	24,8
Athérosclérose cardiovasculaire, décrite ainsi (I25.0)	158	124	34	8,7	14,0	3,7
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	911	717	194	50,4	80,8	21,1
Autres cardiopathies (I26-I51)	406	272	134	22,5	30,6	14,6
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	6	3	3	0,3	0,3	0,3
Maladies du péricarde et myocardite aiguë (I30-I31, I40)	9	4	5	0,5	0,5	0,5
Insuffisance cardiaque (I50)	75	56	19	4,2	6,3	2,1
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	316	209	107	17,5	23,5	11,6
Hypertension essentielle et néphropathie hypertensive (I10, I12, I15)	33	22	11	1,8	2,5	1,2
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	424	240	184	23,5	27,0	20,0
Athérosclérose (I70)	19	14	5	1,1	1,6	0,5
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	149	118	31	8,2	13,3	3,4
Anévrisme aortique et dissection (I71)	99	83	16	5,5	9,3	1,7
Autres maladies des artères, des artérioles et des capillaires (I72-I78)	50	35	15	2,8	3,9	1,6
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	20	12	8	1,1	1,4	0,9
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	151	92	59	8,4	10,4	6,4
Grippe (J09-J11)	3	1	2	0,2	0,1	0,2
Pneumopathie (J12-J18)	148	91	57	8,2	10,3	6,2
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	447	250	197	24,7	28,2	21,4
Bronchite, chronique et non précisée (J40-J42)	4	1	3	0,2	0,1	0,3
Emphysème (J43)	45	22	23	2,5	2,5	2,5
Asthme (J45-J46)	16	8	8	0,9	0,9	0,9
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	382	219	163	21,1	24,7	17,7
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	2	2	0	0,1	0,2	0,0

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-14 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 60 à 64 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	40	32	8	2,2	3,6	0,9
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	149	82	67	8,2	9,2	7,3
Ulcère gastro-duodéal (K25-K28)	26	17	9	1,4	1,9	1,0
Maladies de l'appendice (K35-K38)	3	3	0	0,2	0,3	0,0
Hernies (K40-K46)	14	8	6	0,8	0,9	0,7
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	389	275	114	21,5	31,0	12,4
Maladie alcoolique du foie (K70)	254	186	68	14,1	21,0	7,4
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie (K73-K74)	135	89	46	7,5	10,0	5,0
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	9	8	1	0,5	0,9	0,1
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	146	94	52	8,1	10,6	5,7
Syndrome néphritique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	1	1	0	0,1	0,1	0,0
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	4	4	0	0,2	0,5	0,0
Insuffisance rénale (N17-N19)	140	89	51	7,7	10,0	5,5
Autres maladies des reins (N25, N27)	1	0	1	0,1	0,0	0,1
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	5	0	5	0,3	0,0	0,5
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	0	0,0	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	2	0,2
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	0	0,0
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	0	0,0
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	0	0,0
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	1	1	0	0,1	0,1	0,0
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	45	23	22	2,5	2,6	2,4
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	118	77	41	6,5	8,7	4,5
Toutes autres maladies (résiduel) ¹¹	1 107	637	470	61,3	71,8	51,1
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	471	326	145	26,1	36,7	15,8
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	167	120	47	9,2	13,5	5,1
Accidents de véhicule à moteur ¹²	136	92	44	7,5	10,4	4,8
Autres accidents de transport terrestre ¹³	4	4	0	0,2	0,5	0,0
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	27	24	3	1,5	2,7	0,3
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	304	206	98	16,8	23,2	10,7
Chutes (W00-W19)	91	68	23	5,0	7,7	2,5
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	3	3	0	0,2	0,3	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	18	15	3	1,0	1,7	0,3
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	14	8	6	0,8	0,9	0,7

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-14 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 60 à 64 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	84	49	35	4,6	5,5	3,8
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	94	63	31	5,2	7,1	3,4
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	224	149	75	12,4	16,8	8,2
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	37	36	1	2,0	4,1	0,1
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	187	113	74	10,3	12,7	8,1
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	15	9	6	0,8	1,0	0,7
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	2	1	1	0,1	0,1	0,1
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	13	8	5	0,7	0,9	0,5
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	43	26	17	2,4	2,9	1,8
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	43	26	17	2,4	2,9	1,8
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	14	9	5	0,8	1,0	0,5

1. Le nombre de décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
2. Âge au dernier anniversaire précédant le décès.
3. Pour « Âge au décès, moins d'un an », le taux de mortalité utilise les naissances vivantes de l'année civile.
4. Pour « Âge au décès, 1 à 4 ans », le taux de mortalité utilise les estimations de population des 0 à 4 ans moins les naissances vivantes de l'année civile.
5. Pour « Âge au décès », chaque groupe d'âge à l'exception de « Tous les âges », le taux de mortalité représente le taux de mortalité par âge ou le nombre de décès dans un groupe d'âge particulier pendant une année donnée pour 100 000 personnes dans le même groupe d'âge au 1er juillet de la même année.
6. À partir de 2005, les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité sont présentées à l'appendice II de la publication « Mortalité : liste sommaire des causes » (numéro 84F0209XIF au catalogue).
7. La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
8. Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)
9. « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics ».
10. Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision, et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
11. Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
12. Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
13. Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.

Note(s) : Voir la section Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.

Source(s) : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès (Tableau CANSIM 102-0551) et l'appendice II.

Tableau 2-15

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 65 à 69 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)^{7, 8, 9}	17 282	10 349	6 933	1 286,1	1 592,2	999,3
Infections à la salmonelle (A01-A02)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	35	19	16	2,6	2,9	2,3
Tuberculose (A16-A19)	12	10	2	0,9	1,5	0,3
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	9	7	2	0,7	1,1	0,3
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	3	3	0	0,2	0,5	0,0
Coqueluche (A37)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infection à méningocoques (A39)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Septicémie (A40-A41)	137	72	65	10,2	11,1	9,4
Syphilis (A50-A53)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	32	18	14	2,4	2,8	2,0
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	11	11	0	0,8	1,7	0,0
Paludisme (B50-B54)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ¹⁰	37	19	18	2,8	2,9	2,6
Tumeurs malignes (C00-C97)	8 149	4 526	3 623	606,4	696,3	522,2
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	138	107	31	10,3	16,5	4,5
Tumeur maligne de l'oesophage (C15)	224	196	28	16,7	30,2	4,0
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	207	143	64	15,4	22,0	9,2
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	817	508	309	60,8	78,2	44,5
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	241	160	81	17,9	24,6	11,7
Tumeur maligne du pancréas (C25)	456	251	205	33,9	38,6	29,5
Tumeur maligne du larynx (C32)	71	56	15	5,3	8,6	2,2
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	2 659	1 493	1 166	197,9	229,7	168,1
Mélanome malin de la peau (C43)	93	54	39	6,9	8,3	5,6
Tumeur maligne du sein (C50)	486	4	482	36,2	0,6	69,5
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	31	4,5
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	98	14,1
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	156	22,5
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	271	41,7	...
Tumeurs malignes du rein et du bassinnet du rein (C64-C65)	195	123	72	14,5	18,9	10,4
Tumeur maligne de la vessie (C67)	185	145	40	13,8	22,3	5,8
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	230	148	82	17,1	22,8	11,8
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	685	383	302	51,0	58,9	43,5
Maladie de Hodgkin (C81)	5	1	4	0,4	0,2	0,6
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	276	148	128	20,5	22,8	18,4
Leucémie (C91-C95)	260	156	104	19,3	24,0	15,0
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	144	78	66	10,7	12,0	9,5
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-15 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 65 à 69 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	906	484	422	67,4	74,5	60,8
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	94	60	34	7,0	9,2	4,9
Anémies (D50-D64)	22	11	11	1,6	1,7	1,6
Diabète sucré (E10-E14)	657	400	257	48,9	61,5	37,0
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	7	3	4	0,5	0,5	0,6
Malnutrition (E40-E46)	7	3	4	0,5	0,5	0,6
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Méningite (G00, G03)	4	3	1	0,3	0,5	0,1
Maladie de Parkinson (G20-G21)	56	32	24	4,2	4,9	3,5
Maladie d'Alzheimer (G30)	96	43	53	7,1	6,6	7,6
Maladies cardiovasculaires graves (I00-I78)	4 085	2 805	1 280	304,0	431,5	184,5
Maladies du coeur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	3 188	2 274	914	237,2	349,9	131,7
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques (I00-I09)	44	18	26	3,3	2,8	3,7
Cardiopathie hypertensive (I11)	37	27	10	2,8	4,2	1,4
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	6	4	2	0,4	0,6	0,3
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	2 528	1 868	660	188,1	287,4	95,1
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	1 202	882	320	89,4	135,7	46,1
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	64	46	18	4,8	7,1	2,6
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	1 262	940	322	93,9	144,6	46,4
Athérosclérose cardiovasculaire, décrite ainsi (I25.0)	146	95	51	10,9	14,6	7,4
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	1 116	845	271	83,0	130,0	39,1
Autres cardiopathies (I26-I51)	573	357	216	42,6	54,9	31,1
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	10	5	5	0,7	0,8	0,7
Maladies du péricarde et myocardite aiguë (I30-I31, I40)	15	11	4	1,1	1,7	0,6
Insuffisance cardiaque (I50)	129	83	46	9,6	12,8	6,6
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	419	258	161	31,2	39,7	23,2
Hypertension essentielle et néphropathie hypertensive (I10, I12, I15)	56	33	23	4,2	5,1	3,3
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	615	344	271	45,8	52,9	39,1
Athérosclérose (I70)	27	20	7	2,0	3,1	1,0
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	199	134	65	14,8	20,6	9,4
Anévrisme aortique et dissection (I71)	134	95	39	10,0	14,6	5,6
Autres maladies des artères, des artérioles et des capillaires (I72-I78)	65	39	26	4,8	6,0	3,7
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	22	9	13	1,6	1,4	1,9
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	171	103	68	12,7	15,8	9,8
Grippe (J09-J11)	6	3	3	0,4	0,5	0,4
Pneumopathie (J12-J18)	165	100	65	12,3	15,4	9,4
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	3	0	3	0,2	0,0	0,4
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	2	0	2	0,1	0,0	0,3
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	1	0	1	0,1	0,0	0,1
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	731	427	304	54,4	65,7	43,8
Bronchite, chronique et non précisée (J40-J42)	3	2	1	0,2	0,3	0,1
Emphysème (J43)	73	45	28	5,4	6,9	4,0
Asthme (J45-J46)	14	5	9	1,0	0,8	1,3
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	641	375	266	47,7	57,7	38,3
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	4	4	0	0,3	0,6	0,0

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-15 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 65 à 69 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	65	45	20	4,8	6,9	2,9
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	207	132	75	15,4	20,3	10,8
Ulcère gastro-duodéal (K25-K28)	30	22	8	2,2	3,4	1,2
Maladies de l'appendice (K35-K38)	8	5	3	0,6	0,8	0,4
Hernies (K40-K46)	16	9	7	1,2	1,4	1,0
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	328	236	92	24,4	36,3	13,3
Maladie alcoolique du foie (K70)	174	133	41	12,9	20,5	5,9
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie (K73-K74)	154	103	51	11,5	15,8	7,4
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	16	10	6	1,2	1,5	0,9
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	196	121	75	14,6	18,6	10,8
Syndrome néphritique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	4	3	1	0,3	0,5	0,1
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	7	3	4	0,5	0,5	0,6
Insuffisance rénale (N17-N19)	185	115	70	13,8	17,7	10,1
Autres maladies des reins (N25, N27)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	4	2	2	0,3	0,3	0,3
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	3	0,5	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	0	0,0
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	0	0,0
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	0	0,0
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	0	0,0
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	21	11	10	1,6	1,7	1,4
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	93	55	38	6,9	8,5	5,5
Toutes autres maladies (résiduel) ¹¹	1 324	697	627	98,5	107,2	90,4
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	413	281	132	30,7	43,2	19,0
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	128	89	39	9,5	13,7	5,6
Accidents de véhicule à moteur ¹²	106	70	36	7,9	10,8	5,2
Autres accidents de transport terrestre ¹³	1	1	0	0,1	0,2	0,0
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	21	18	3	1,6	2,8	0,4
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	285	192	93	21,2	29,5	13,4
Chutes (W00-W19)	115	82	33	8,6	12,6	4,8
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	1	1	0	0,1	0,2	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	10	10	0	0,7	1,5	0,0
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	25	14	11	1,9	2,2	1,6

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-15 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 65 à 69 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	41	28	13	3,1	4,3	1,9
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	93	57	36	6,9	8,8	5,2
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	145	114	31	10,8	17,5	4,5
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	36	35	1	2,7	5,4	0,1
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	109	79	30	8,1	12,2	4,3
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	5	5	0	0,4	0,8	0,0
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	5	5	0	0,4	0,8	0,0
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	24	14	10	1,8	2,2	1,4
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	1	1	0	0,1	0,2	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	23	13	10	1,7	2,0	1,4
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	19	12	7	1,4	1,8	1,0

1. Le nombre de décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
2. Âge au dernier anniversaire précédant le décès.
3. Pour « Âge au décès, moins d'un an », le taux de mortalité utilise les naissances vivantes de l'année civile.
4. Pour « Âge au décès, 1 à 4 ans », le taux de mortalité utilise les estimations de population des 0 à 4 ans moins les naissances vivantes de l'année civile.
5. Pour « Âge au décès », chaque groupe d'âge à l'exception de « Tous les âges », le taux de mortalité représente le taux de mortalité par âge ou le nombre de décès dans un groupe d'âge particulier pendant une année donnée pour 100 000 personnes dans le même groupe d'âge au 1er juillet de la même année.
6. À partir de 2005, les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité sont présentées à l'appendice II de la publication « Mortalité : liste sommaire des causes » (numéro 84F0209XIF au catalogue).
7. La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
8. Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)
9. « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics ».
10. Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision, et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
11. Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
12. Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
13. Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.

Note(s) : Voir la section Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.

Source(s) : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès (Tableau CANSIM 102-0551) et l'appendice II.

Tableau 2-16

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 70 à 74 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)^{7, 8, 9}	22 194	13 006	9 188	2 096,8	2 621,2	1 634,1
Infections à la salmonelle (A01-A02)	1	0	1	0,1	0,0	0,2
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	93	49	44	8,8	9,9	7,8
Tuberculose (A16-A19)	11	4	7	1,0	0,8	1,2
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	9	3	6	0,9	0,6	1,1
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	2	1	1	0,2	0,2	0,2
Coqueluche (A37)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infection à méningocoques (A39)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Septicémie (A40-A41)	191	101	90	18,0	20,4	16,0
Syphilis (A50-A53)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	37	20	17	3,5	4,0	3,0
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	7	5	2	0,7	1,0	0,4
Paludisme (B50-B54)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ¹⁰	60	33	27	5,7	6,7	4,8
Tumeurs malignes (C00-C97)	9 425	5 410	4 015	890,4	1 090,3	714,1
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	142	95	47	13,4	19,1	8,4
Tumeur maligne de l'oesophage (C15)	242	192	50	22,9	38,7	8,9
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	227	166	61	21,4	33,5	10,8
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	1 017	615	402	96,1	123,9	71,5
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	261	175	86	24,7	35,3	15,3
Tumeur maligne du pancréas (C25)	553	293	260	52,2	59,1	46,2
Tumeur maligne du larynx (C32)	81	66	15	7,7	13,3	2,7
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	2 988	1 762	1 226	282,3	355,1	218,0
Mélanome malin de la peau (C43)	88	58	30	8,3	11,7	5,3
Tumeur maligne du sein (C50)	498	9	489	47,0	1,8	87,0
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	26	4,6
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	105	18,7
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	207	36,8
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	443	89,3	...
Tumeurs malignes du rein et du bassinnet du rein (C64-C65)	247	164	83	23,3	33,1	14,8
Tumeur maligne de la vessie (C67)	233	181	52	22,0	36,5	9,2
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	207	125	82	19,6	25,2	14,6
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	802	484	318	75,8	97,5	56,6
Maladie de Hodgkin (C81)	18	13	5	1,7	2,6	0,9
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	320	182	138	30,2	36,7	24,5
Leucémie (C91-C95)	288	192	96	27,2	38,7	17,1
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	176	97	79	16,6	19,5	14,0
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-16 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 70 à 74 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	1 058	582	476	100,0	117,3	84,7
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	133	78	55	12,6	15,7	9,8
Anémies (D50-D64)	19	12	7	1,8	2,4	1,2
Diabète sucré (E10-E14)	821	501	320	77,6	101,0	56,9
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	9	5	4	0,9	1,0	0,7
Malnutrition (E40-E46)	8	4	4	0,8	0,8	0,7
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	1	1	0	0,1	0,2	0,0
Méningite (G00, G03)	2	1	1	0,2	0,2	0,2
Maladie de Parkinson (G20-G21)	173	113	60	16,3	22,8	10,7
Maladie d'Alzheimer (G30)	255	110	145	24,1	22,2	25,8
Maladies cardiovasculaires graves (I00-I78)	5 806	3 634	2 172	548,5	732,4	386,3
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	4 343	2 800	1 543	410,3	564,3	274,4
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques (I00-I09)	78	28	50	7,4	5,6	8,9
Cardiopathie hypertensive (I11)	40	17	23	3,8	3,4	4,1
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	3	0	3	0,3	0,0	0,5
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	3 355	2 248	1 107	317,0	453,1	196,9
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	1 520	1 010	510	143,6	203,6	90,7
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	86	51	35	8,1	10,3	6,2
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	1 749	1 187	562	165,2	239,2	100,0
Athérosclérose cardiovasculaire, décrite ainsi (I25.0)	189	125	64	17,9	25,2	11,4
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	1 560	1 062	498	147,4	214,0	88,6
Autres cardiopathies (I26-I51)	867	507	360	81,9	102,2	64,0
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	8	3	5	0,8	0,6	0,9
Maladies du péricarde et myocardite aiguë (I30-I31, I40)	11	6	5	1,0	1,2	0,9
Insuffisance cardiaque (I50)	257	150	107	24,3	30,2	19,0
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	591	348	243	55,8	70,1	43,2
Hypertension essentielle et néphropathie hypertensive (I10, I12, I15)	88	40	48	8,3	8,1	8,5
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	1 041	586	455	98,4	118,1	80,9
Athérosclérose (I70)	54	36	18	5,1	7,3	3,2
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	280	172	108	26,5	34,7	19,2
Anévrisme aortique et dissection (I71)	191	125	66	18,0	25,2	11,7
Autres maladies des artères, des artérioles et des capillaires (I72-I78)	89	47	42	8,4	9,5	7,5
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	28	15	13	2,6	3,0	2,3
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	273	163	110	25,8	32,9	19,6
Grippe (J09-J11)	17	10	7	1,6	2,0	1,2
Pneumopathie (J12-J18)	256	153	103	24,2	30,8	18,3
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	2	2	0	0,2	0,4	0,0
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	1	1	0	0,1	0,2	0,0
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	1	1	0	0,1	0,2	0,0
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	1 226	664	562	115,8	133,8	100,0
Bronchite, chronique et non précisée (J40-J42)	9	6	3	0,9	1,2	0,5
Emphysème (J43)	85	40	45	8,0	8,1	8,0
Asthme (J45-J46)	11	2	9	1,0	0,4	1,6
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	1 121	616	505	105,9	124,1	89,8
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	9	9	0	0,9	1,8	0,0

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-16 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 70 à 74 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	94	64	30	8,9	12,9	5,3
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	308	178	130	29,1	35,9	23,1
Ulcère gastro-duodéal (K25-K28)	40	22	18	3,8	4,4	3,2
Maladies de l'appendice (K35-K38)	5	1	4	0,5	0,2	0,7
Hernies (K40-K46)	26	13	13	2,5	2,6	2,3
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	301	199	102	28,4	40,1	18,1
Maladie alcoolique du foie (K70)	130	98	32	12,3	19,8	5,7
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie (K73-K74)	171	101	70	16,2	20,4	12,4
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	34	21	13	3,2	4,2	2,3
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	296	171	125	28,0	34,5	22,2
Syndrome néphritique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	3	0	3	0,3	0,0	0,5
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	5	3	2	0,5	0,6	0,4
Insuffisance rénale (N17-N19)	288	168	120	27,2	33,9	21,3
Autres maladies des reins (N25, N27)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	7	1	6	0,7	0,2	1,1
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	4	0,8	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	2	0,4
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	1	0,2
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	0	0,0
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	1	0,2
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	13	7	6	1,2	1,4	1,1
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	96	61	35	9,1	12,3	6,2
Toutes autres maladies (résiduel) ¹¹	1 791	947	844	169,2	190,9	150,1
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	436	267	169	41,2	53,8	30,1
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	116	74	42	11,0	14,9	7,5
Accidents de véhicule à moteur ¹²	103	62	41	9,7	12,5	7,3
Autres accidents de transport terrestre ¹³	2	2	0	0,2	0,4	0,0
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	11	10	1	1,0	2,0	0,2
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	320	193	127	30,2	38,9	22,6
Chutes (W00-W19)	175	104	71	16,5	21,0	12,6
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	1	1	0	0,1	0,2	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	7	5	2	0,7	1,0	0,4
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	19	12	7	1,8	2,4	1,2
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	27	14	13	2,6	2,8	2,3

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-16 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 70 à 74 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	91	57	34	8,6	11,5	6,0
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	114	90	24	10,8	18,1	4,3
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	37	35	2	3,5	7,1	0,4
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	77	55	22	7,3	11,1	3,9
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	10	9	1	0,9	1,8	0,2
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	2	1	1	0,2	0,2	0,2
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	8	8	0	0,8	1,6	0,0
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	10	9	1	0,9	1,8	0,2
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	10	9	1	0,9	1,8	0,2
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	25	13	12	2,4	2,6	2,1

1. Le nombre de décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
 2. Âge au dernier anniversaire précédant le décès.
 3. Pour « Âge au décès, moins d'un an », le taux de mortalité utilise les naissances vivantes de l'année civile.
 4. Pour « Âge au décès, 1 à 4 ans », le taux de mortalité utilise les estimations de population des 0 à 4 ans moins les naissances vivantes de l'année civile.
 5. Pour « Âge au décès », chaque groupe d'âge à l'exception de « Tous les âges », le taux de mortalité représente le taux de mortalité par âge ou le nombre de décès dans un groupe d'âge particulier pendant une année donnée pour 100 000 personnes dans le même groupe d'âge au 1er juillet de la même année.
 6. À partir de 2005, les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité sont présentées à l'appendice II de la publication « Mortalité : liste sommaire des causes » (numéro 84F0209XIF au catalogue).
 7. La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
 8. Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)
 9. « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics ».
 10. Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision, et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
 11. Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
 12. Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
 13. Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.
- Note(s)** : Voir la section Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.
- Source(s)** : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès (Tableau CANSIM 102-0551) et l'appendice II.

Tableau 2-17

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 75 à 79 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)^{7, 8, 9}	30 733	17 061	13 672	3 406,5	4 219,0	2 746,5
Infections à la salmonelle (A01-A02)	1	0	1	0,1	0,0	0,2
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	160	81	79	17,7	20,0	15,9
Tuberculose (A16-A19)	15	7	8	1,7	1,7	1,6
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	7	5	2	0,8	1,2	0,4
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	8	2	6	0,9	0,5	1,2
Coqueluche (A37)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	1	1	0	0,1	0,2	0,0
Infection à méningocoques (A39)	3	2	1	0,3	0,5	0,2
Septicémie (A40-A41)	309	146	163	34,3	36,1	32,7
Syphilis (A50-A53)	1	1	0	0,1	0,2	0,0
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	23	9	14	2,5	2,2	2,8
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	8	7	1	0,9	1,7	0,2
Paludisme (B50-B54)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ¹⁰	65	37	28	7,2	9,1	5,6
Tumeurs malignes (C00-C97)	11 024	6 114	4 910	1 221,9	1 511,9	986,3
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	155	100	55	17,2	24,7	11,0
Tumeur maligne de l'oesophage (C15)	252	189	63	27,9	46,7	12,7
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	272	173	99	30,1	42,8	19,9
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	1 260	724	536	139,7	179,0	107,7
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	265	179	86	29,4	44,3	17,3
Tumeur maligne du pancréas (C25)	633	306	327	70,2	75,7	65,7
Tumeur maligne du larynx (C32)	79	59	20	8,8	14,6	4,0
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	3 189	1 830	1 359	353,5	452,5	273,0
Mélanome malin de la peau (C43)	115	83	32	12,7	20,5	6,4
Tumeur maligne du sein (C50)	544	8	536	60,3	2,0	107,7
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	31	6,2
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	121	24,3
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	247	49,6
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	664	164,2	...
Tumeurs malignes du rein et du bassinet du rein (C64-C65)	258	149	109	28,6	36,8	21,9
Tumeur maligne de la vessie (C67)	310	227	83	34,4	56,1	16,7
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	196	96	100	21,7	23,7	20,1
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	1 024	555	469	113,5	137,2	94,2
Maladie de Hodgkin (C81)	12	9	3	1,3	2,2	0,6
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	442	233	209	49,0	57,6	42,0
Leucémie (C91-C95)	356	200	156	39,5	49,5	31,3
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	211	110	101	23,4	27,2	20,3
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	3	3	0	0,3	0,7	0,0

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-17 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 75 à 79 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	1 409	772	637	156,2	190,9	128,0
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	214	124	90	23,7	30,7	18,1
Anémies (D50-D64)	58	18	40	6,4	4,5	8,0
Diabète sucré (E10-E14)	1 142	626	516	126,6	154,8	103,7
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	30	11	19	3,3	2,7	3,8
Malnutrition (E40-E46)	28	10	18	3,1	2,5	3,6
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	2	1	1	0,2	0,2	0,2
Méningite (G00, G03)	5	0	5	0,6	0,0	1,0
Maladie de Parkinson (G20-G21)	363	230	133	40,2	56,9	26,7
Maladie d'Alzheimer (G30)	714	289	425	79,1	71,5	85,4
Maladies cardiovasculaires graves (I00-I78)	8 663	5 073	3 590	960,2	1 254,5	721,2
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	6 259	3 780	2 479	693,8	934,8	498,0
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques (I00-I09)	81	34	47	9,0	8,4	9,4
Cardiopathie hypertensive (I11)	65	37	28	7,2	9,1	5,6
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	16	9	7	1,8	2,2	1,4
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	4 714	2 963	1 751	522,5	732,7	351,8
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	2 111	1 307	804	234,0	323,2	161,5
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	142	82	60	15,7	20,3	12,1
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	2 461	1 574	887	272,8	389,2	178,2
Athérosclérose cardiovasculaire, décrite ainsi (I25.0)	204	139	65	22,6	34,4	13,1
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	2 257	1 435	822	250,2	354,9	165,1
Autres cardiopathies (I26-I51)	1 383	737	646	153,3	182,3	129,8
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	9	5	4	1,0	1,2	0,8
Maladies du péricarde et myocardite aiguë (I30-I31, I40)	15	9	6	1,7	2,2	1,2
Insuffisance cardiaque (I50)	435	243	192	48,2	60,1	38,6
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	924	480	444	102,4	118,7	89,2
Hypertension essentielle et néphropathie hypertensive (I10, I12, I15)	155	74	81	17,2	18,3	16,3
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	1 743	911	832	193,2	225,3	167,1
Athérosclérose (I70)	70	40	30	7,8	9,9	6,0
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	436	268	168	48,3	66,3	33,7
Anévrisme aortique et dissection (I71)	295	192	103	32,7	47,5	20,7
Autres maladies des artères, des artérioles et des capillaires (I72-I78)	141	76	65	15,6	18,8	13,1
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	25	12	13	2,8	3,0	2,6
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	546	296	250	60,5	73,2	50,2
Grippe (J09-J11)	28	15	13	3,1	3,7	2,6
Pneumopathie (J12-J18)	518	281	237	57,4	69,5	47,6
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	5	4	1	0,6	1,0	0,2
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	2	2	0	0,2	0,5	0,0
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	3	2	1	0,3	0,5	0,2
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	1 855	1 013	842	205,6	250,5	169,1
Bronchite, chronique et non précisée (J40-J42)	15	11	4	1,7	2,7	0,8
Emphysème (J43)	108	68	40	12,0	16,8	8,0
Asthme (J45-J46)	24	6	18	2,7	1,5	3,6
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	1 708	928	780	189,3	229,5	156,7
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	15	14	1	1,7	3,5	0,2

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-17 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 75 à 79 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	194	122	72	21,5	30,2	14,5
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	410	229	181	45,4	56,6	36,4
Ulcère gastro-duodéal (K25-K28)	56	38	18	6,2	9,4	3,6
Maladies de l'appendice (K35-K38)	5	2	3	0,6	0,5	0,6
Hernies (K40-K46)	38	20	18	4,2	4,9	3,6
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	286	165	121	31,7	40,8	24,3
Maladie alcoolique du foie (K70)	80	55	25	8,9	13,6	5,0
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie (K73-K74)	206	110	96	22,8	27,2	19,3
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	37	28	9	4,1	6,9	1,8
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	511	294	217	56,6	72,7	43,6
Syndrome néphritique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	2	1	1	0,2	0,2	0,2
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	11	6	5	1,2	1,5	1,0
Insuffisance rénale (N17-N19)	497	287	210	55,1	71,0	42,2
Autres maladies des reins (N25, N27)	1	0	1	0,1	0,0	0,2
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	14	6	8	1,6	1,5	1,6
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	11	2,7	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	2	0,4
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	0	0,0
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	0	0,0
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	0	0,0
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	17	9	8	1,9	2,2	1,6
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	114	70	44	12,6	17,3	8,8
Toutes autres maladies (résiduel) ¹¹	2 953	1 438	1 515	327,3	355,6	304,3
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	687	398	289	76,1	98,4	58,1
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	108	71	37	12,0	17,6	7,4
Accidents de véhicule à moteur ¹²	93	57	36	10,3	14,1	7,2
Autres accidents de transport terrestre ¹³	3	2	1	0,3	0,5	0,2
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	12	12	0	1,3	3,0	0,0
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	579	327	252	64,2	80,9	50,6
Chutes (W00-W19)	336	190	146	37,2	47,0	29,3
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	1	1	0	0,1	0,2	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	7	6	1	0,8	1,5	0,2
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	15	7	8	1,7	1,7	1,6
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	29	16	13	3,2	4,0	2,6

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-17 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 75 à 79 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	191	107	84	21,2	26,5	16,9
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	100	89	11	11,1	22,0	2,2
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	28	28	0	3,1	6,9	0,0
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	72	61	11	8,0	15,1	2,2
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	12	7	5	1,3	1,7	1,0
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	2	2	0	0,2	0,5	0,0
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	10	5	5	1,1	1,2	1,0
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	13	8	5	1,4	2,0	1,0
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	13	8	5	1,4	2,0	1,0
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	28	12	16	3,1	3,0	3,2

1. Le nombre de décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
 2. Âge au dernier anniversaire précédant le décès.
 3. Pour « Âge au décès, moins d'un an », le taux de mortalité utilise les naissances vivantes de l'année civile.
 4. Pour « Âge au décès, 1 à 4 ans », le taux de mortalité utilise les estimations de population des 0 à 4 ans moins les naissances vivantes de l'année civile.
 5. Pour « Âge au décès », chaque groupe d'âge à l'exception de « Tous les âges », le taux de mortalité représente le taux de mortalité par âge ou le nombre de décès dans un groupe d'âge particulier pendant une année donnée pour 100 000 personnes dans le même groupe d'âge au 1er juillet de la même année.
 6. À partir de 2005, les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité sont présentées à l'appendice II de la publication « Mortalité : liste sommaire des causes » (numéro 84F0209XIF au catalogue).
 7. La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
 8. Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)
 9. « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics ».
 10. Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision, et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
 11. Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
 12. Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
 13. Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.
- Note(s)** : Voir la section Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.
- Source(s)** : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès (Tableau CANSIM 102-0551) et l'appendice II.

Tableau 2-18

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 80 à 84 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)^{7, 8, 9}	38 476	19 414	19 062	5 773,4	7 250,3	4 781,4
Infections à la salmonelle (A01-A02)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	219	93	126	32,9	34,7	31,6
Tuberculose (A16-A19)	16	12	4	2,4	4,5	1,0
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	14	10	4	2,1	3,7	1,0
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	2	2	0	0,3	0,7	0,0
Coqueluche (A37)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infection à méningocoques (A39)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Septicémie (A40-A41)	379	187	192	56,9	69,8	48,2
Syphilis (A50-A53)	2	1	1	0,3	0,4	0,3
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	17	6	11	2,6	2,2	2,8
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	2	2	0	0,3	0,7	0,0
Paludisme (B50-B54)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ¹⁰	80	34	46	12,0	12,7	11,5
Tumeurs malignes (C00-C97)	10 524	5 632	4 892	1 579,1	2 103,3	1 227,1
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	119	77	42	17,9	28,8	10,5
Tumeur maligne de l'oesophage (C15)	198	151	47	29,7	56,4	11,8
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	316	177	139	47,4	66,1	34,9
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	1 187	617	570	178,1	230,4	143,0
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	279	159	120	41,9	59,4	30,1
Tumeur maligne du pancréas (C25)	557	254	303	83,6	94,9	76,0
Tumeur maligne du larynx (C32)	49	39	10	7,4	14,6	2,5
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	2 592	1 445	1 147	388,9	539,6	287,7
Mélanome malin de la peau (C43)	113	66	47	17,0	24,6	11,8
Tumeur maligne du sein (C50)	570	6	564	85,5	2,2	141,5
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	23	5,8
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	90	22,6
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	239	59,9
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	871	325,3	...
Tumeurs malignes du rein et du bassinet du rein (C64-C65)	220	132	88	33,0	49,3	22,1
Tumeur maligne de la vessie (C67)	382	258	124	57,3	96,4	31,1
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	145	72	73	21,8	26,9	18,3
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	1 058	552	506	158,8	206,1	126,9
Maladie de Hodgkin (C81)	11	3	8	1,7	1,1	2,0
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	411	206	205	61,7	76,9	51,4
Leucémie (C91-C95)	417	242	175	62,6	90,4	43,9
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	217	99	118	32,6	37,0	29,6
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	2	2	0	0,3	0,7	0,0

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-18 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 80 à 84 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	1 516	756	760	227,5	282,3	190,6
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	262	127	135	39,3	47,4	33,9
Anémies (D50-D64)	94	35	59	14,1	13,1	14,8
Diabète sucré (E10-E14)	1 404	703	701	210,7	262,5	175,8
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	41	17	24	6,2	6,3	6,0
Malnutrition (E40-E46)	36	14	22	5,4	5,2	5,5
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	5	3	2	0,8	1,1	0,5
Méningite (G00, G03)	4	4	0	0,6	1,5	0,0
Maladie de Parkinson (G20-G21)	526	310	216	78,9	115,8	54,2
Maladie d'Alzheimer (G30)	1 356	491	865	203,5	183,4	217,0
Maladies cardiovasculaires graves (I00-I78)	12 398	6 172	6 226	1 860,3	2 305,0	1 561,7
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	8 787	4 520	4 267	1 318,5	1 688,0	1 070,3
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques (I00-I09)	85	18	67	12,8	6,7	16,8
Cardiopathie hypertensive (I11)	92	36	56	13,8	13,4	14,0
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	26	10	16	3,9	3,7	4,0
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	6 431	3 463	2 968	965,0	1 293,3	744,5
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	2 817	1 522	1 295	422,7	568,4	324,8
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	162	72	90	24,3	26,9	22,6
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	3 452	1 869	1 583	518,0	698,0	397,1
Athérosclérose cardiovasculaire, décrite ainsi (I25.0)	216	122	94	32,4	45,6	23,6
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	3 236	1 747	1 489	485,6	652,4	373,5
Autres cardiopathies (I26-I51)	2 153	993	1 160	323,1	370,8	291,0
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	8	5	3	1,2	1,9	0,8
Maladies du péricarde et myocardite aiguë (I30-I31, I40)	12	9	3	1,8	3,4	0,8
Insuffisance cardiaque (I50)	779	369	410	116,9	137,8	102,8
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	1 354	610	744	203,2	227,8	186,6
Hypertension essentielle et néphropathie hypertensive (I10, I12, I15)	289	133	156	43,4	49,7	39,1
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	2 632	1 155	1 477	394,9	431,3	370,5
Athérosclérose (I70)	156	79	77	23,4	29,5	19,3
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	534	285	249	80,1	106,4	62,5
Anévrisme aortique et dissection (I71)	357	202	155	53,6	75,4	38,9
Autres maladies des artères, des artérioles et des capillaires (I72-I78)	177	83	94	26,6	31,0	23,6
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	42	11	31	6,3	4,1	7,8
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	918	452	466	137,7	168,8	116,9
Grippe (J09-J11)	40	15	25	6,0	5,6	6,3
Pneumopathie (J12-J18)	878	437	441	131,7	163,2	110,6
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	8	5	3	1,2	1,9	0,8
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	5	3	2	0,8	1,1	0,5
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	3	2	1	0,5	0,7	0,3
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	2 321	1 318	1 003	348,3	492,2	251,6
Bronchite, chronique et non précisée (J40-J42)	24	10	14	3,6	3,7	3,5
Emphysème (J43)	134	78	56	20,1	29,1	14,0
Asthme (J45-J46)	30	13	17	4,5	4,9	4,3
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	2 133	1 217	916	320,1	454,5	229,8
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	23	22	1	3,5	8,2	0,3

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-18 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 80 à 84 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	323	184	139	48,5	68,7	34,9
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	495	291	204	74,3	108,7	51,2
Ulcère gastro-duodéal (K25-K28)	56	28	28	8,4	10,5	7,0
Maladies de l'appendice (K35-K38)	4	1	3	0,6	0,4	0,8
Hernies (K40-K46)	59	29	30	8,9	10,8	7,5
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	218	123	95	32,7	45,9	23,8
Maladie alcoolique du foie (K70)	48	41	7	7,2	15,3	1,8
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie (K73-K74)	170	82	88	25,5	30,6	22,1
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	79	43	36	11,9	16,1	9,0
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	774	410	364	116,1	153,1	91,3
Syndrome néphritique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	1	0	1	0,2	0,0	0,3
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	28	14	14	4,2	5,2	3,5
Insuffisance rénale (N17-N19)	745	396	349	111,8	147,9	87,5
Autres maladies des reins (N25, N27)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	17	6	11	2,6	2,2	2,8
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	21	7,8	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	0	0,0
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	0	0,0
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	0	0,0
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	0	0,0
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	21	12	9	3,2	4,5	2,3
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	188	91	97	28,2	34,0	24,3
Toutes autres maladies (résiduel) ¹¹	4 462	1 946	2 516	669,5	726,7	631,1
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	1 003	507	496	150,5	189,3	124,4
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	94	69	25	14,1	25,8	6,3
Accidents de véhicule à moteur ¹²	84	59	25	12,6	22,0	6,3
Autres accidents de transport terrestre ¹³	4	4	0	0,6	1,5	0,0
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	6	6	0	0,9	2,2	0,0
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	909	438	471	136,4	163,6	118,1
Chutes (W00-W19)	572	276	296	85,8	103,1	74,2
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	11	6	5	1,7	2,2	1,3
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	18	12	6	2,7	4,5	1,5
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	16	7	9	2,4	2,6	2,3

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-18 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 80 à 84 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	292	137	155	43,8	51,2	38,9
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	67	58	9	10,1	21,7	2,3
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	26	26	0	3,9	9,7	0,0
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	41	32	9	6,2	12,0	2,3
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	6	4	2	0,9	1,5	0,5
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	1	0	1	0,2	0,0	0,3
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	5	4	1	0,8	1,5	0,3
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	8	5	3	1,2	1,9	0,8
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	1	1	0	0,2	0,4	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	7	4	3	1,1	1,5	0,8
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	39	21	18	5,9	7,8	4,5

1. Le nombre de décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
 2. Âge au dernier anniversaire précédant le décès.
 3. Pour « Âge au décès, moins d'un an », le taux de mortalité utilise les naissances vivantes de l'année civile.
 4. Pour « Âge au décès, 1 à 4 ans », le taux de mortalité utilise les estimations de population des 0 à 4 ans moins les naissances vivantes de l'année civile.
 5. Pour « Âge au décès », chaque groupe d'âge à l'exception de « Tous les âges », le taux de mortalité représente le taux de mortalité par âge ou le nombre de décès dans un groupe d'âge particulier pendant une année donnée pour 100 000 personnes dans le même groupe d'âge au 1er juillet de la même année.
 6. À partir de 2005, les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité sont présentées à l'appendice II de la publication « Mortalité : liste sommaire des causes » (numéro 84F0209XIF au catalogue).
 7. La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
 8. Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)
 9. « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics ».
 10. Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision, et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
 11. Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
 12. Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
 13. Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.
- Note(s)** : Voir la section Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.
- Source(s)** : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès (Tableau CANSIM 102-0551) et l'appendice II.

Tableau 2-19

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 85 à 89 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)^{7, 8, 9}	38 943	16 289	22 654	9 951,9	12 100,5	8 825,2
Infections à la salmonelle (A01-A02)	4	1	3	1,0	0,7	1,2
Shigellose et amibiase (A03, A06)	1	0	1	0,3	0,0	0,4
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	271	102	169	69,3	75,8	65,8
Tuberculose (A16-A19)	17	7	10	4,3	5,2	3,9
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	16	7	9	4,1	5,2	3,5
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	1	0	1	0,3	0,0	0,4
Coqueluche (A37)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infection à méningocoques (A39)	1	1	0	0,3	0,7	0,0
Septicémie (A40-A41)	415	199	216	106,1	147,8	84,1
Syphilis (A50-A53)	1	1	0	0,3	0,7	0,0
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	16	7	9	4,1	5,2	3,5
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	1	1	0	0,3	0,7	0,0
Paludisme (B50-B54)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ¹⁰	57	20	37	14,6	14,9	14,4
Tumeurs malignes (C00-C97)	7 539	3 650	3 889	1 926,6	2 711,5	1 515,0
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	78	47	31	19,9	34,9	12,1
Tumeur maligne de l'oesophage (C15)	140	78	62	35,8	57,9	24,2
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	234	108	126	59,8	80,2	49,1
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	1 044	446	598	266,8	331,3	233,0
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	163	88	75	41,7	65,4	29,2
Tumeur maligne du pancréas (C25)	375	140	235	95,8	104,0	91,5
Tumeur maligne du larynx (C32)	31	22	9	7,9	16,3	3,5
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	1 461	786	675	373,4	583,9	263,0
Mélanome malin de la peau (C43)	45	26	19	11,5	19,3	7,4
Tumeur maligne du sein (C50)	518	1	517	132,4	0,7	201,4
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	29	11,3
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	88	34,3
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	136	53,0
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	740	549,7	...
Tumeurs malignes du rein et du bassinet du rein (C64-C65)	170	90	80	43,4	66,9	31,2
Tumeur maligne de la vessie (C67)	297	205	92	75,9	152,3	35,8
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	95	37	58	24,3	27,5	22,6
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	675	311	364	172,5	231,0	141,8
Maladie de Hodgkin (C81)	7	1	6	1,8	0,7	2,3
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	273	118	155	69,8	87,7	60,4
Leucémie (C91-C95)	268	136	132	68,5	101,0	51,4
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	126	55	71	32,2	40,9	27,7
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	1	1	0	0,3	0,7	0,0

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-19 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 85 à 89 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	1 220	525	695	311,8	390,0	270,7
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	246	120	126	62,9	89,1	49,1
Anémies (D50-D64)	123	41	82	31,4	30,5	31,9
Diabète sucré (E10-E14)	1 235	514	721	315,6	381,8	280,9
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	63	25	38	16,1	18,6	14,8
Malnutrition (E40-E46)	54	20	34	13,8	14,9	13,2
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	9	5	4	2,3	3,7	1,6
Méningite (G00, G03)	3	0	3	0,8	0,0	1,2
Maladie de Parkinson (G20-G21)	450	222	228	115,0	164,9	88,8
Maladie d'Alzheimer (G30)	1 963	589	1 374	501,6	437,5	535,3
Maladies cardiovasculaires graves (I00-I78)	14 135	5 660	8 475	3 612,2	4 204,6	3 301,5
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	9 901	4 176	5 725	2 530,2	3 102,2	2 230,2
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques (I00-I09)	62	20	42	15,8	14,9	16,4
Cardiopathie hypertensive (I11)	135	41	94	34,5	30,5	36,6
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	32	10	22	8,2	7,4	8,6
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	6 911	3 016	3 895	1 766,1	2 240,5	1 517,3
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	2 823	1 216	1 607	721,4	903,3	626,0
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	220	94	126	56,2	69,8	49,1
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	3 868	1 706	2 162	988,5	1 267,3	842,2
Athérosclérose cardiovasculaire, décrite ainsi (I25.0)	187	88	99	47,8	65,4	38,6
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	3 681	1 618	2 063	940,7	1 202,0	803,7
Autres cardiopathies (I26-I51)	2 761	1 089	1 672	705,6	809,0	651,3
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	6	2	4	1,5	1,5	1,6
Maladies du péricarde et myocardite aiguë (I30-I31, I40)	5	5	0	1,3	3,7	0,0
Insuffisance cardiaque (I50)	1 127	462	665	288,0	343,2	259,1
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	1 623	620	1 003	414,8	460,6	390,7
Hypertension essentielle et néphropathie hypertensive (I10, I12, I15)	367	116	251	93,8	86,2	97,8
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3 222	1 082	2 140	823,4	803,8	833,7
Athérosclérose (I70)	179	63	116	45,7	46,8	45,2
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	466	223	243	119,1	165,7	94,7
Anévrisme aortique et dissection (I71)	280	144	136	71,6	107,0	53,0
Autres maladies des artères, des artérioles et des capillaires (I72-I78)	186	79	107	47,5	58,7	41,7
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	36	12	24	9,2	8,9	9,3
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	1 178	534	644	301,0	396,7	250,9
Grippe (J09-J11)	66	28	38	16,9	20,8	14,8
Pneumopathie (J12-J18)	1 112	506	606	284,2	375,9	236,1
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	22	10	12	5,6	7,4	4,7
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	15	5	10	3,8	3,7	3,9
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	7	5	2	1,8	3,7	0,8
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	2 155	1 104	1 051	550,7	820,1	409,4
Bronchite, chronique et non précisée (J40-J42)	26	13	13	6,6	9,7	5,1
Emphysème (J43)	85	51	34	21,7	37,9	13,2
Asthme (J45-J46)	39	9	30	10,0	6,7	11,7
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	2 005	1 031	974	512,4	765,9	379,4
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	14	14	0	3,6	10,4	0,0

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-19 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 85 à 89 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	376	191	185	96,1	141,9	72,1
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	444	214	230	113,5	159,0	89,6
Ulcère gastro-duodénal (K25-K28)	89	40	49	22,7	29,7	19,1
Maladies de l'appendice (K35-K38)	7	4	3	1,8	3,0	1,2
Hernies (K40-K46)	56	27	29	14,3	20,1	11,3
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	94	46	48	24,0	34,2	18,7
Maladie alcoolique du foie (K70)	11	8	3	2,8	5,9	1,2
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie (K73-K74)	83	38	45	21,2	28,2	17,5
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	87	42	45	22,2	31,2	17,5
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	908	440	468	232,0	326,9	182,3
Syndrome néphritique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	2	1	1	0,5	0,7	0,4
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	26	13	13	6,6	9,7	5,1
Insuffisance rénale (N17-N19)	879	425	454	224,6	315,7	176,9
Autres maladies des reins (N25, N27)	1	1	0	0,3	0,7	0,0
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	37	11	26	9,5	8,2	10,1
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	21	15,6	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	1	0,4
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	0	0,0
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	0	0,0
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	0	0,0
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	8	3	5	2,0	2,2	1,9
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	224	77	147	57,2	57,2	57,3
Toutes autres maladies (résiduel) ¹¹	5 406	1 823	3 583	1 381,5	1 354,2	1 395,8
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	1 159	469	690	296,2	348,4	268,8
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	77	44	33	19,7	32,7	12,9
Accidents de véhicule à moteur ¹²	71	39	32	18,1	29,0	12,5
Autres accidents de transport terrestre ¹³	3	2	1	0,8	1,5	0,4
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	3	3	0	0,8	2,2	0,0
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	1 082	425	657	276,5	315,7	255,9
Chutes (W00-W19)	685	278	407	175,1	206,5	158,6
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	8	6	2	2,0	4,5	0,8
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	5	2	3	1,3	1,5	1,2

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-19 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 85 à 89 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	14	5	9	3,6	3,7	3,5
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	370	134	236	94,6	99,5	91,9
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	42	28	14	10,7	20,8	5,5
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	11	11	0	2,8	8,2	0,0
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	31	17	14	7,9	12,6	5,5
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	3	2	1	0,8	1,5	0,4
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	3	2	1	0,8	1,5	0,4
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	6	3	3	1,5	2,2	1,2
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	6	3	3	1,5	2,2	1,2
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	29	14	15	7,4	10,4	5,8

1. Le nombre de décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
2. Âge au dernier anniversaire précédant le décès.
3. Pour « Âge au décès, moins d'un an », le taux de mortalité utilise les naissances vivantes de l'année civile.
4. Pour « Âge au décès, 1 à 4 ans », le taux de mortalité utilise les estimations de population des 0 à 4 ans moins les naissances vivantes de l'année civile.
5. Pour « Âge au décès », chaque groupe d'âge à l'exception de « Tous les âges », le taux de mortalité représente le taux de mortalité par âge ou le nombre de décès dans un groupe d'âge particulier pendant une année donnée pour 100 000 personnes dans le même groupe d'âge au 1er juillet de la même année.
6. À partir de 2005, les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité sont présentées à l'appendice II de la publication « Mortalité : liste sommaire des causes » (numéro 84F0209XIF au catalogue).
7. La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
8. Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)
9. « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics ».
10. Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision, et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
11. Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
12. Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
13. Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.

Note(s) : Voir la section Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.

Source(s) : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès (Tableau CANSIM 102-0551) et l'appendice II.

Tableau 2-20

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 90 ans et plus^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)^{7, 8, 9}	37 711	11 529	26 182	19 510,3	22 424,7	18 454,1
Infections à la salmonelle (A01-A02)	1	0	1	0,5	0,0	0,7
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	265	71	194	137,1	138,1	136,7
Tuberculose (A16-A19)	3	1	2	1,6	1,9	1,4
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	2	0	2	1,0	0,0	1,4
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	1	1	0	0,5	1,9	0,0
Coqueluche (A37)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	1	0	1	0,5	0,0	0,7
Infection à méningocoques (A39)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Septicémie (A40-A41)	340	110	230	175,9	214,0	162,1
Syphilis (A50-A53)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	3	1	2	1,6	1,9	1,4
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Paludisme (B50-B54)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ¹⁰	59	13	46	30,5	25,3	32,4
Tumeurs malignes (C00-C97)	4 197	1 738	2 459	2 171,4	3 380,5	1 733,2
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	57	30	27	29,5	58,4	19,0
Tumeur maligne de l'oesophage (C15)	77	42	35	39,8	81,7	24,7
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	137	60	77	70,9	116,7	54,3
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	605	209	396	313,0	406,5	279,1
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	83	27	56	42,9	52,5	39,5
Tumeur maligne du pancréas (C25)	201	64	137	104,0	124,5	96,6
Tumeur maligne du larynx (C32)	22	16	6	11,4	31,1	4,2
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	549	241	308	284,0	468,8	217,1
Mélanome malin de la peau (C43)	40	18	22	20,7	35,0	15,5
Tumeur maligne du sein (C50)	378	5	373	195,6	9,7	262,9
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	12	8,5
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	61	43,0
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	69	48,6
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	443	861,7	...
Tumeurs malignes du rein et du bassinnet du rein (C64-C65)	97	45	52	50,2	87,5	36,7
Tumeur maligne de la vessie (C67)	212	130	82	109,7	252,9	57,8
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	23	10	13	11,9	19,5	9,2
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	366	131	235	189,4	254,8	165,6
Maladie de Hodgkin (C81)	2	1	1	1,0	1,9	0,7
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	141	51	90	72,9	99,2	63,4
Leucémie (C91-C95)	167	65	102	86,4	126,4	71,9
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	56	14	42	29,0	27,2	29,6
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-20 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 90 ans et plus^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	765	267	498	395,8	519,3	351,0
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	213	87	126	110,2	169,2	88,8
Anémies (D50-D64)	151	43	108	78,1	83,6	76,1
Diabète sucré (E10-E14)	903	268	635	467,2	521,3	447,6
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	67	23	44	34,7	44,7	31,0
Malnutrition (E40-E46)	57	19	38	29,5	37,0	26,8
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	10	4	6	5,2	7,8	4,2
Méningite (G00, G03)	1	0	1	0,5	0,0	0,7
Maladie de Parkinson (G20-G21)	262	111	151	135,5	215,9	106,4
Maladie d'Alzheimer (G30)	2 119	405	1 714	1 096,3	787,8	1 208,1
Maladies cardiovasculaires graves (I00-I78)	14 996	4 348	10 648	7 758,4	8 457,2	7 505,1
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	10 526	3 185	7 341	5 445,8	6 195,1	5 174,2
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques (I00-I09)	54	13	41	27,9	25,3	28,9
Cardiopathie hypertensive (I11)	183	38	145	94,7	73,9	102,2
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	26	8	18	13,5	15,6	12,7
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	7 019	2 197	4 822	3 631,4	4 273,3	3 398,7
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	2 567	838	1 729	1 328,1	1 630,0	1 218,7
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	175	38	137	90,5	73,9	96,6
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	4 277	1 321	2 956	2 212,8	2 569,4	2 083,5
Athérosclérose cardiovasculaire, décrite ainsi (I25.0)	218	63	155	112,8	122,5	109,3
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	4 059	1 258	2 801	2 100,0	2 446,9	1 974,3
Autres cardiopathies (I26-I51)	3 244	929	2 315	1 678,3	1 807,0	1 631,7
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	2	2	0	1,0	3,9	0,0
Maladies du péricarde et myocardite aiguë (I30-I31, I40)	6	4	2	3,1	7,8	1,4
Insuffisance cardiaque (I50)	1 542	447	1 095	797,8	869,4	771,8
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	1 694	476	1 218	876,4	925,9	858,5
Hypertension essentielle et néphropathie hypertensive (I10, I12, I15)	501	119	382	259,2	231,5	269,2
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3 280	836	2 444	1 696,9	1 626,1	1 722,6
Athérosclérose (I70)	314	72	242	162,5	140,0	170,6
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	375	136	239	194,0	264,5	168,5
Anévrisme aortique et dissection (I71)	173	84	89	89,5	163,4	62,7
Autres maladies des artères, des artérioles et des capillaires (I72-I78)	202	52	150	104,5	101,1	105,7
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	44	10	34	22,8	19,5	24,0
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	1 713	578	1 135	886,2	1 124,3	800,0
Grippe (J09-J11)	101	29	72	52,3	56,4	50,7
Pneumopathie (J12-J18)	1 612	549	1 063	834,0	1 067,8	749,2
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	34	16	18	17,6	31,1	12,7
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	18	10	8	9,3	19,5	5,6
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	16	6	10	8,3	11,7	7,0
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	1 718	729	989	888,8	1 418,0	697,1
Bronchite, chronique et non précisée (J40-J42)	36	10	26	18,6	19,5	18,3
Emphysème (J43)	57	27	30	29,5	52,5	21,1
Asthme (J45-J46)	57	12	45	29,5	23,3	31,7
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	1 568	680	888	811,2	1 322,6	625,9
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	5	5	0	2,6	9,7	0,0

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-20 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 90 ans et plus^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	426	177	249	220,4	344,3	175,5
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	364	131	233	188,3	254,8	164,2
Ulcère gastro-duodénal (K25-K28)	60	20	40	31,0	38,9	28,2
Maladies de l'appendice (K35-K38)	5	3	2	2,6	5,8	1,4
Hernies (K40-K46)	63	20	43	32,6	38,9	30,3
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	31	14	17	16,0	27,2	12,0
Maladie alcoolique du foie (K70)	3	2	1	1,6	3,9	0,7
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie (K73-K74)	28	12	16	14,5	23,3	11,3
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	81	23	58	41,9	44,7	40,9
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	825	301	524	426,8	585,5	369,3
Syndrome néphritique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	1	0	1	0,5	0,0	0,7
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	30	10	20	15,5	19,5	14,1
Insuffisance rénale (N17-N19)	794	291	503	410,8	566,0	354,5
Autres maladies des reins (N25, N27)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	24	3	21	12,4	5,8	14,8
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	27	52,5	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	0	0,0
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	0	0,0
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	0	0,0
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	0	0,0
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	9	0	9	4,7	0,0	6,3
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	621	148	473	321,3	287,9	333,4
Toutes autres maladies (résiduel) ¹¹	6 619	1 639	4 980	3 424,4	3 188,0	3 510,1
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	1 414	439	975	731,6	853,9	687,2
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	27	17	10	14,0	33,1	7,0
Accidents de véhicule à moteur ¹²	24	15	9	12,4	29,2	6,3
Autres accidents de transport terrestre ¹³	1	1	0	0,5	1,9	0,0
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	2	1	1	1,0	1,9	0,7
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	1 387	422	965	717,6	820,8	680,2
Chutes (W00-W19)	808	246	562	418,0	478,5	396,1
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	4	4	0	2,1	7,8	0,0
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	6	2	4	3,1	3,9	2,8

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-20 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 90 ans et plus^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	21	6	15	10,9	11,7	10,6
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	548	164	384	283,5	319,0	270,7
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	21	17	4	10,9	33,1	2,8
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	5	5	0	2,6	9,7	0,0
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	16	12	4	8,3	23,3	2,8
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	1	0	1	0,5	0,0	0,7
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	1	0	1	0,5	0,0	0,7
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	1	1	0	0,5	1,9	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	24	9	15	12,4	17,5	10,6

1. Le nombre de décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
2. Âge au dernier anniversaire précédant le décès.
3. Pour « Âge au décès, moins d'un an », le taux de mortalité utilise les naissances vivantes de l'année civile.
4. Pour « Âge au décès, 1 à 4 ans », le taux de mortalité utilise les estimations de population des 0 à 4 ans moins les naissances vivantes de l'année civile.
5. Pour « Âge au décès », chaque groupe d'âge à l'exception de « Tous les âges », le taux de mortalité représente le taux de mortalité par âge ou le nombre de décès dans un groupe d'âge particulier pendant une année donnée pour 100 000 personnes dans le même groupe d'âge au 1er juillet de la même année.
6. À partir de 2005, les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité sont présentées à l'appendice II de la publication « Mortalité : liste sommaire des causes » (numéro 84F0209XIF au catalogue).
7. La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
8. Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)
9. « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics ».
10. Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision, et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
11. Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
12. Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
13. Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.

Note(s) : Voir la section Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.

Source(s) : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès (Tableau CANSIM 102-0551) et l'appendice II.

Définitions

Les définitions utilisées pour la production des tableaux statistiques sur les données canadiennes des statistiques de l'état civil sont celles recommandées par l'Organisation mondiale de la santé¹ et les Nations Unies².

Accouchement. Un accouchement peut comprendre la mise au monde d'un ou de plusieurs enfants vivants ou mort-nés. Le nombre d'accouchements pendant une période donnée sera égal ou inférieur au nombre total de naissances, car les naissances multiples (jumeaux, triplés ou naissances multiples d'ordre plus élevé) sont comptées comme des accouchements uniques.

Âge. Âge au dernier anniversaire précédant le décès. Dans le cas de la mortalité infantile, le nombre de mois (ou minutes, heures, ou jours) révolus depuis la naissance.

Cause de décès. La cause de décès qui est codée et qui sert à la production des totalisations est la cause initiale de décès. Elle est définie comme étant « (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel ». Cette cause initiale de décès est choisie d'après un certain nombre de conditions précisées sur le certificat médical de la cause de décès.

À partir de l'an 2000, au Canada, les causes de décès et de mortinaissances sont codées conformément à la 10^e révision de la **Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes** (CIM-10) publiée par l'Organisation mondiale de la santé. L'ancienne révision, CIM-9³ était utilisée au Canada pour classer les causes de décès et de mortinaissances de 1979 à 1999.

Codes de la CIM-10. Les codes de la **Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes** (CIM), 10^e révision, ont été établis en 1992 par l'Organisation mondiale de la santé. Le manuel de la CIM-10 comprend la liste des codes particuliers attribués aux maladies, traumatismes et causes de décès.

Décès. La disparition permanente de tout signe de vie à tout moment après une naissance vivante. Les mortinaissances ne sont pas prises en compte dans les statistiques de décès, sauf indication contraire.

• **Décès infantile :** Décès d'un enfant âgé de moins d'un an.

Durée de la gestation. L'intervalle, en semaines révolues, entre le premier jour des dernières menstruations de la mère et le jour de l'accouchement (c'est-à-dire durée de la grossesse), ou toute estimation de cet intervalle fondée sur une échographie, un examen médical, ou toute autre méthode. La méthode de calcul de la durée de la gestation n'est pas précisée dans les documents canadiens sur l'enregistrement des naissances. **Avant terme** désigne une période de gestation de moins de 37 semaines entières; **à terme**, une période de 37 à 41 semaines entières; et **après terme**, une période de 42 semaines entières ou davantage.

Naissance vivante. Expulsion ou extraction complète du corps de la mère, indépendamment de la durée de la gestation, d'un produit de conception qui, après cette séparation, respire ou manifeste tout autre signe de vie, tel que battement du coeur, pulsation du cordon ombilical ou contraction effective d'un muscle soumis à l'action de la volonté, que le cordon ombilical ait été coupé ou non, et que le placenta soit ou non demeuré attaché.

Population. Les personnes dont le lieu de résidence habituel se situe au Canada, y compris les fonctionnaires canadiens en poste à l'étranger et leur famille, les membres des Forces canadiennes en service à l'étranger et leur famille, les équipages des navires marchands canadiens, et les résidents non permanents du Canada.

1. Organisation mondiale de la santé (OMS). **Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, dixième révision, volumes 1 et 2** (CIM-10). Genève, 1992.
2. Nations Unies. **Principes et recommandations pour un système de statistiques de l'état civil.** Études statistiques, Série M, no 19, rév. 1. New York, 1974.
3. Organisation mondiale de la santé (OMS). **Classification internationale des maladies, révision de 1975, volume 1** (CIM-9). Genève, 1977.

La population au milieu de l'année (1^{er} juillet) sert au calcul des taux dans les publications des statistiques de l'état civil (voir les notes de bas de page des tableaux). La Division de la démographie de Statistique Canada révisé fréquemment les estimations démographiques.

Provinces et territoires. Sauf indication contraire, la répartition géographique des décès dans les tableaux de cette publication se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.

Le Nunavut est devenu officiellement un territoire canadien le 1^{er} avril 1999. Le nom « Territoires du Nord-Ouest » désigne un territoire dont les frontières géographiques diffèrent selon que l'on se situe avant ou après le 1^{er} avril 1999.

Les décès et les mortinaissances des résidents du Nunavut qui sont survenus avant le 1^{er} avril 1999 sont inclus avec ceux des résidents des Territoires du Nord-Ouest. Les décès et les mortinaissances des résidents du Nunavut se produisant à partir du 1^{er} avril 1999 sont totalisés séparément.

Taux de mortalité

- **Taux brut de mortalité** : Le nombre de décès pendant une année donnée pour 100 000 habitants, à partir du 1^{er} juillet de cette même année.
- **Taux de mortalité normalisé selon l'âge (Taux comparatif de mortalité selon l'âge)** : Le calcul du taux normalisé selon l'âge vise à supprimer l'effet des différences dans la structure d'âge de diverses populations selon différentes zones géographiques et sur une certaine période. Les taux de mortalité normalisés selon l'âge montrent le nombre de décès pour 100 000 habitants qui seraient survenus dans une zone géographique donnée si la structure d'âge de la population de cette zone géographique était la même que celle d'une population-type.

Formule servant à calculer le taux de mortalité r normalisé selon l'âge :

$$r = \sum_{i=1}^{20} \left(\frac{d_i}{p_i} \right) w_i \text{ où,}$$

Pour le groupe d'âge i :

d_i est le nombre de décès spécifique par âge et sexe pour une cause particulière de décès pour une année et une zone géographique données,

p_i est l'estimation démographique spécifique par âge et sexe au 1^{er} juillet de la même année et zone géographique, et

w_i est la pondération pour ce groupe d'âge dans une population-type. Le Recensement de la population du Canada de 1991 est utilisé comme population-type pour calculer les taux de mortalité normalisés selon l'âge. Cette population-type et les pondérations calculées figurent dans le tableau explicatif 1. Veuillez noter que la même pondération est utilisée pour chaque sexe.

Pour produire un taux pour 100 000 habitants, r est multiplié par 100 000.

Tableau explicatif 1
Population-type selon le groupe d'âge, Canada, 1^{er} juillet 1991 (sexes réunis)

Groupe <i>i</i>	Âge en années	Population-type	Pondération <i>w</i>
1	moins d'un an	403 061	0,0143
2	1 à 4 ans	1 550 285	0,0551
3	5 à 9 ans	1 953 045	0,0695
4	10 à 14 ans	1 913 115	0,0680
5	15 à 19 ans	1 926 090	0,0685
6	20 à 24 ans	2 109 452	0,0750
7	25 à 29 ans	2 529 239	0,0899
8	30 à 34 ans	2 598 289	0,0924
9	35 à 39 ans	2 344 872	0,0834
10	40 à 44 ans	2 138 891	0,0761
11	45 à 49 ans	1 674 153	0,0595
12	50 à 54 ans	1 339 902	0,0476
13	55 à 59 ans	1 238 441	0,0440
14	60 à 64 ans	1 190 217	0,0423
15	65 à 69 ans	1 084 588	0,0386
16	70 à 74 ans	834 024	0,0297
17	75 à 79 ans	622 221	0,0221
18	80 à 84 ans	382 303	0,0136
19	85 à 89 ans	192 410	0,0068
20	90 ans et plus	95 467	0,0034
Total	...	28 120 065	1,0000

- **Taux de mortalité par âge** : Le nombre de décès dans un groupe d'âge particulier pendant une année donnée pour 100 000 habitants dans le même groupe d'âge au 1^{er} juillet de la même année.
- **Taux de mortalité infantile** : Le nombre de décès infantiles pendant une année donnée pour 1 000 naissances vivantes pendant la même année.

Notes explicatives pour les tableaux

Tableau 1— Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie

Le décès correspond à la disparition permanente de tout signe de vie à n'importe quel moment après une naissance vivante. Les mortinaissances ne sont pas prises en compte.

Dans ce tableau, les nombres excluent les décès de non-résidents du Canada.

Les données manquantes sur le sexe des personnes décédées ont été imputées en fonction du numéro de l'enregistrement du décès.

Tableau 2— Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada

Le décès correspond à la disparition permanente de tout signe de vie à n'importe quel moment après une naissance vivante. Les mortinaissances ne sont pas prises en compte.

Dans ce tableau, les nombres excluent les décès de non-résidents du Canada.

Les données manquantes sur le sexe des personnes décédées ont été imputées en fonction du numéro de l'enregistrement du décès.

Appendice I

Liste sommaire des causes de décès

Tableau explicatif 1

Causes de décès pour les totalisations de statistiques sur la mortalité, noms et codes de la CIM-10

Causes de décès	Codes de la CIM-10
Total, toutes les causes de décès	A00-Y89
Infections à la salmonelle	A01-A02
Shigellose et amibiase	A03, A06
Certaines autres infections intestinales	A04, A07-A09
Tuberculose	A16-A19
Tuberculose de l'appareil respiratoire	A16
Autres formes de tuberculose	A17-A19
Coqueluche	A37
Scarlatine et érysipèle	A38, A46
Infection à méningocoques	A39
Septicémie	A40-A41
Syphilis	A50-A53
Poliomyélite aiguë	A80
Encéphalite transmise par les arthropodes	A83-A84, A85.2
Rougeole	B05
Hépatite virale	B15-B19
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH]	B20-B24
Paludisme	B50-B54
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles	A00, A05, A20-A36, A42-A44, A48-A49, A54-A79, A81-A82, A85.0-A85.1, A85.8, A86-B04, B06-B09, B25-B49, B55-B99
Tumeurs malignes	C00-C97
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx	C00-C14
Tumeur maligne de l'oesophage	C15
Tumeur maligne de l'estomac	C16
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus	C18-C21
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques	C22
Tumeur maligne du pancréas	C25
Tumeur maligne du larynx	C32
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon	C33-C34
Mélanome malin de la peau	C43
Tumeur maligne du sein	C50
Tumeur maligne du col de l'utérus	C53
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée	C54-C55
Tumeur maligne de l'ovaire	C56
Tumeur maligne de la prostate	C61
Tumeurs malignes du rein et du bassinet du rein	C64-C65
Tumeur maligne de la vessie	C67
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central	C70-C72
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés	C81-C96
Maladie de Hodgkin	C81
Lymphome non hodgkinien	C82-C85
Leucémie	C91-C95
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives	C88, C90
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées	C96
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées	C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue	D00-D48
Anémies	D50-D64
Diabète sucré	E10-E14
Déficiences nutritionnelles	E40-E64
Malnutrition	E40-E46
Autres carences nutritionnelles	E50-E64
Méningite	G00, G03
Maladie de Parkinson	G20-G21
Maladie d'Alzheimer	G30
Maladies cardiovasculaires graves	I00-I78
Maladies du coeur	I00-I09, I11, I13, I20-I51

Tableau explicatif 1 – suite

Causes de décès pour les totalisations de statistiques sur la mortalité, noms et codes de la CIM-10

Causes de décès	Codes de la CIM-10
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques	I00-I09
Cardiopathie hypertensive	I11
Cardionéphropathie hypertensive	I13
Cardiopathies ischémiques	I20-I25
Infarctus aigu du myocarde	I21-I22
Autres cardiopathies ischémiques aiguës	I24
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques	I20, I25
Athérosclérose cardiovasculaire, décrite ainsi	I25.0
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique	I20, I25.1-I25.9
Autres cardiopathies	I26-I51
Endocardite aiguë et subaiguë	I33
Maladies du péricarde et myocardite aiguë	I30-I31, I40
Insuffisance cardiaque	I50
Toutes autres formes de cardiopathie	I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51
Hypertension essentielle et néphropathie hypertensive	I10, I12, I15
Maladies cérébrovasculaires	I60-I69
Athérosclérose	I70
Autres maladies du système circulatoire	I71-I78
Anévrisme aortique et dissection	I71
Autres maladies des artères, des artérioles et des capillaires	I72-I78
Autres troubles du système circulatoire	I80-I99
Grippe et pneumopathie	J09-J18
Grippe	J09-J11
Pneumopathie	J12-J18
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures	J20-J22
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë	J20-J21
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision	J22
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures	J40-J47
Bronchite, chronique et non précisée	J40-J42
Emphysème	J43
Asthme	J45-J46
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures	J44, J47
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques	J60-J66, J68
Pneumopathie due à des substances solides et liquides	J69
Autres maladies du système respiratoire	J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98
Ulcère gastro-duodénal	K25-K28
Maladies de l'appendice	K35-K38
Hernies	K40-K46
Maladie chronique et cirrhose du foie	K70, K73-K74
Maladie alcoolique du foie	K70
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie	K73-K74
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire	K80-K82
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie	N00-N07, N17-N19, N25-N27
Syndrome néphritique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique	N00-N01, N04
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision	N02-N03, N05-N07, N26
Insuffisance rénale	N17-N19
Autres maladies des reins	N25, N27
Infections rénales	N10-N12, N13.6, N15.1
Hyperplasie de la prostate	N40
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme	N70-N76
Grossesse, accouchement et puerpéralité	O00-O99
Grossesse se terminant par un avortement	O00-O07
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité	O10-O99
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale	P00-P96
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques	Q00-Q99
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs	R00-R99
Toutes autres maladies (résiduel)	D65-E07, E15-E34, E65-F99, G04-G12, G23-G25, G31-H93, K00-K22, K29-K31, K50-K66, K71-K72, K75-K76, K83-M99, N13.0-N13.5, N13.7-N13.9, N14, N15.0, N15.8-N15.9, N20-N23, N28-N39, N41-N64, N80-N98, U04
Accidents (blessures involontaires)	V01-X59, Y85-Y86
Accidents de transport	V01-V99, Y85
Accidents de véhicule à moteur	V02-V04, V09.0, V09.2, V12-V14, V19.0-V19.2, V19.4-V19.6, V20-V79, V80.3-V80.5, V81.0-V81.1, V82.0-V82.1, V83-V86, V87.0-V87.8, V88.0-V88.8, V89.0, V89.2
Autres accidents de transport terrestre	V01, V05-V06, V09.1, V09.3-V09.9, V10-V11, V15-V18, V19.3, V19.8-V19.9, V80.0-V80.2, V80.6-V80.9, V81.2-V81.9, V82.2-V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles	V90-V99, Y85

Tableau explicatif 1 – suite

Causes de décès pour les totalisations de statistiques sur la mortalité, noms et codes de la CIM-10

Causes de décès	Codes de la CIM-10
Accidents non liés au transport	W00-X59, Y86
Chutes	W00-W19
Décharges accidentelles d'armes à feu	W32-W34
Noyade et submersion accidentelles	W65-W74
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes	X00-X09
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances	X40-X49
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles	W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86
Lésions auto-infligées (suicide)	X60-X84, Y87.0
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu	X72-X74
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles	X60-X71, X75-X84, Y87.0
Agressions (homicide)	X85-Y09, Y87.1
Agressions (homicide) par armes à feu	X93-X95
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles	X85-X92, X96-Y09, Y87.1
Intervention de la force publique	Y35, Y89.0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée	Y10-Y34, Y87.2, Y89.9
Décharges d'armes à feu intention non déterminée	Y22-Y24
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles	Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9
Faits de guerre et leurs séquelles	Y36, Y89.1
Complications de soins médicaux et chirurgicaux	Y40-Y84, Y88

Note(s) : Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)

Source(s) : « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics ».

Appendice II

Estimations postcensitaires de la population

Tableau explicatif 1

Estimations postcensitaires de la population, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, provinces et territoires, 1er juillet 2008¹

	Canada	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.
	nombre						
Les deux sexes							
Tous les âges	33 315 976	506 193	139 545	936 737	746 902	7 751 332	12 932 297
moins d'un an ²	377 886	4 898	1 483	9 188	7 402	87 870	140 791
1 à 4 ans ²	1 423 325	18 042	5 374	34 285	27 895	312 642	562 416
5 à 9 ans	1 793 543	25 061	7 606	46 132	37 678	385 045	718 253
10 à 14 ans	2 013 387	27 942	8 833	53 353	42 643	446 949	802 233
15 à 19 ans	2 256 523	32 790	10 296	62 754	48 634	502 801	887 311
20 à 24 ans	2 286 903	31 282	9 169	61 477	47 090	485 221	895 811
25 à 29 ans	2 287 061	28 565	7 891	55 305	45 288	533 052	868 084
30 à 34 ans	2 216 826	30 226	8 004	55 347	46 062	516 020	862 956
35 à 39 ans	2 307 993	34 978	8 791	62 156	49 716	503 695	929 833
40 à 44 ans	2 562 724	40 639	10 353	71 007	56 609	586 988	1 032 287
45 à 49 ans	2 751 603	42 562	11 346	79 555	61 766	650 002	1 073 566
50 à 54 ans	2 523 412	42 400	10 678	75 617	60 828	615 388	944 852
55 à 59 ans	2 152 371	39 932	9 872	67 151	55 175	532 864	800 139
60 à 64 ans	1 806 950	33 932	8 795	59 356	46 881	461 154	673 419
65 à 69 ans	1 343 799	23 704	6 195	43 737	34 289	347 153	504 501
70 à 74 ans	1 058 456	18 001	5 107	33 657	25 968	263 109	406 991
75 à 79 ans	902 177	13 782	4 002	27 069	21 227	225 810	348 013
80 à 84 ans	666 437	9 308	2 858	19 781	16 272	161 393	260 765
85 à 89 ans	391 312	5 604	1 883	12 892	10 162	89 596	149 905
90 ans et plus	193 288	2 545	1 009	6 918	5 317	44 580	70 171
Masculin							
Tous les âges	16 519 001	248 432	68 116	454 868	366 635	3 838 941	6 377 127
moins d'un an ²	193 755	2 487	754	4 708	3 825	45 010	72 170
1 à 4 ans ²	731 662	9 391	2 717	17 473	14 261	160 360	288 744
5 à 9 ans	921 883	12 771	3 889	23 595	19 423	197 635	368 567
10 à 14 ans	1 031 210	14 415	4 544	27 149	21 975	228 819	410 037
15 à 19 ans	1 156 747	16 921	5 225	31 781	24 991	257 433	453 417
20 à 24 ans	1 173 180	15 701	4 591	30 538	24 164	247 825	456 967
25 à 29 ans	1 152 713	14 186	3 780	26 244	22 729	271 848	430 646
30 à 34 ans	1 110 768	14 619	3 836	26 666	22 501	263 866	423 623
35 à 39 ans	1 164 737	16 926	4 420	30 652	24 633	258 318	464 496
40 à 44 ans	1 291 827	19 666	5 149	34 940	27 982	299 554	517 916
45 à 49 ans	1 381 560	21 038	5 540	39 086	30 266	326 782	540 201
50 à 54 ans	1 254 748	20 677	5 173	36 996	29 871	305 195	468 597
55 à 59 ans	1 062 135	19 758	4 855	33 116	27 078	261 818	392 216
60 à 64 ans	887 739	16 851	4 358	29 161	23 261	224 540	328 922
65 à 69 ans	649 984	11 660	3 022	21 128	16 924	167 394	241 544
70 à 74 ans	496 178	8 753	2 441	15 889	12 234	121 926	188 729
75 à 79 ans	404 381	6 256	1 826	11 958	9 352	98 246	155 403
80 à 84 ans	267 768	3 828	1 150	7 757	6 405	62 590	104 334
85 à 89 ans	134 614	1 915	597	4 259	3 366	29 254	51 586
90 ans et plus	51 412	613	249	1 772	1 394	10 528	19 012

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau explicatif 1 – suite

Estimations postcensitaires de la population, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, provinces et territoires, 1er juillet 2008¹

	Canada	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.
	nombre						
Féminin							
Tous les âges	16 796 975	257 761	71 429	481 869	380 267	3 912 391	6 555 170
moins d'un an ²	184 131	2 411	729	4 480	3 577	42 860	68 621
1 à 4 ans ²	691 663	8 651	2 657	16 812	13 634	152 282	273 672
5 à 9 ans	871 660	12 290	3 717	22 537	18 255	187 410	349 686
10 à 14 ans	982 177	13 527	4 289	26 204	20 668	218 130	392 196
15 à 19 ans	1 099 776	15 869	5 071	30 973	23 643	245 368	433 894
20 à 24 ans	1 113 723	15 581	4 578	30 939	22 926	237 396	438 844
25 à 29 ans	1 134 348	14 379	4 111	29 061	22 559	261 204	437 438
30 à 34 ans	1 106 058	15 607	4 168	28 681	23 561	252 154	439 333
35 à 39 ans	1 143 256	18 052	4 371	31 504	25 083	245 377	465 337
40 à 44 ans	1 270 897	20 973	5 204	36 067	28 627	287 434	514 371
45 à 49 ans	1 370 043	21 524	5 806	40 469	31 500	323 220	533 365
50 à 54 ans	1 268 664	21 723	5 505	38 621	30 957	310 193	476 255
55 à 59 ans	1 090 236	20 174	5 017	34 035	28 097	271 046	407 923
60 à 64 ans	919 211	17 081	4 437	30 195	23 620	236 614	344 497
65 à 69 ans	693 815	12 044	3 173	22 609	17 365	179 759	262 957
70 à 74 ans	562 278	9 248	2 666	17 768	13 734	141 183	218 262
75 à 79 ans	497 796	7 526	2 176	15 111	11 875	127 564	192 610
80 à 84 ans	398 669	5 480	1 708	12 024	9 867	98 803	156 431
85 à 89 ans	256 698	3 689	1 286	8 633	6 796	60 342	98 319
90 ans et plus	141 876	1 932	760	5 146	3 923	34 052	51 159

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau explicatif 1 – suite

Estimations postcensitaires de la population, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, provinces et territoires, 1er juillet 2008¹

	Canada	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.	Nt
	nombre							
Les deux sexes								
Tous les âges	33 315 976	1 205 517	1 013 792	3 591 391	4 383 860	33 116	43 699	31 595
moins d'un an ²	377 886	15 485	13 737	50 856	44 276	373	721	805
1 à 4 ans ²	1 423 325	57 770	49 394	177 542	171 079	1 480	2 658	2 749
5 à 9 ans	1 793 543	74 135	61 636	209 770	219 897	1 913	3 050	3 367
10 à 14 ans	2 013 387	81 791	67 503	222 679	250 836	2 029	3 239	3 357
15 à 19 ans	2 256 523	88 940	76 798	249 031	287 827	2 343	3 768	3 230
20 à 24 ans	2 286 903	85 186	74 085	285 689	303 206	2 299	3 504	2 884
25 à 29 ans	2 287 061	80 397	68 481	293 883	297 502	2 112	3 848	2 653
30 à 34 ans	2 216 826	76 444	61 252	272 599	279 900	2 203	3 462	2 351
35 à 39 ans	2 307 993	77 773	59 269	266 970	306 589	2 513	3 434	2 276
40 à 44 ans	2 562 724	84 257	66 878	271 440	333 996	2 739	3 410	2 121
45 à 49 ans	2 751 603	93 972	77 628	291 065	361 542	3 293	3 588	1 718
50 à 54 ans	2 523 412	87 390	74 774	263 269	340 808	3 013	2 978	1 417
55 à 59 ans	2 152 371	74 482	61 679	204 374	300 790	2 491	2 366	1 056
60 à 64 ans	1 806 950	61 680	49 524	158 084	250 104	1 824	1 506	691
65 à 69 ans	1 343 799	45 180	38 731	112 036	186 029	988	829	427
70 à 74 ans	1 058 456	36 160	33 354	87 495	147 194	660	518	242
75 à 79 ans	902 177	32 418	30 066	74 322	124 463	455	397	153
80 à 84 ans	666 437	25 962	24 279	52 801	92 513	210	238	57
85 à 89 ans	391 312	16 930	15 521	31 511	57 037	114	132	25
90 ans et plus	193 288	9 165	9 203	15 975	28 272	64	53	16
Masculin								
Tous les âges	16 519 001	599 598	503 012	1 832 911	2 173 400	16 924	22 645	16 392
moins d'un an ²	193 755	7 855	6 958	26 182	22 828	186	358	433
1 à 4 ans ²	731 662	29 638	25 515	91 451	88 523	788	1 391	1 411
5 à 9 ans	921 883	38 280	31 632	108 366	113 520	985	1 463	1 757
10 à 14 ans	1 031 210	41 989	34 488	114 106	129 365	994	1 655	1 674
15 à 19 ans	1 156 747	45 259	39 503	128 192	149 091	1 277	1 963	1 694
20 à 24 ans	1 173 180	43 786	38 065	150 528	156 506	1 177	1 858	1 474
25 à 29 ans	1 152 713	41 135	34 412	155 254	148 213	1 095	1 867	1 304
30 à 34 ans	1 110 768	38 751	30 679	143 549	138 556	1 029	1 831	1 262
35 à 39 ans	1 164 737	39 381	29 771	139 699	152 272	1 201	1 834	1 134
40 à 44 ans	1 291 827	42 609	33 496	140 258	166 104	1 324	1 725	1 104
45 à 49 ans	1 381 560	47 913	38 774	148 623	178 889	1 657	1 874	917
50 à 54 ans	1 254 748	44 286	37 364	135 149	167 512	1 612	1 525	791
55 à 59 ans	1 062 135	36 919	31 157	103 888	148 124	1 315	1 306	585
60 à 64 ans	887 739	30 509	24 712	79 347	123 807	1 004	903	364
65 à 69 ans	649 984	21 737	18 871	55 043	91 450	555	437	219
70 à 74 ans	496 178	16 790	15 720	41 596	71 343	346	270	141
75 à 79 ans	404 381	14 316	13 635	34 139	58 735	226	208	81
80 à 84 ans	267 768	10 249	10 153	21 923	39 161	89	101	28
85 à 89 ans	134 614	5 708	5 525	11 258	21 030	46	56	14
90 ans et plus	51 412	2 488	2 582	4 360	8 371	18	20	5

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau explicatif 1 – suite

Estimations postcensitaires de la population, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, provinces et territoires, 1er juillet 2008¹

	Canada	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.	Nt
	nombre							
Féminin								
Tous les âges	16 796 975	605 919	510 780	1 758 480	2 210 460	16 192	21 054	15 203
moins d'un an ²	184 131	7 630	6 779	24 674	21 448	187	363	372
1 à 4 ans ²	691 663	28 132	23 879	86 091	82 556	692	1 267	1 338
5 à 9 ans	871 660	35 855	30 004	101 404	106 377	928	1 587	1 610
10 à 14 ans	982 177	39 802	33 015	108 573	121 471	1 035	1 584	1 683
15 à 19 ans	1 099 776	43 681	37 295	120 839	138 736	1 066	1 805	1 536
20 à 24 ans	1 113 723	41 400	36 020	135 161	146 700	1 122	1 646	1 410
25 à 29 ans	1 134 348	39 262	34 069	138 629	149 289	1 017	1 981	1 349
30 à 34 ans	1 106 058	37 693	30 573	129 050	141 344	1 174	1 631	1 089
35 à 39 ans	1 143 256	38 392	29 498	127 271	154 317	1 312	1 600	1 142
40 à 44 ans	1 270 897	41 648	33 382	131 182	167 892	1 415	1 685	1 017
45 à 49 ans	1 370 043	46 059	38 854	142 442	182 653	1 636	1 714	801
50 à 54 ans	1 268 664	43 104	37 410	128 120	173 296	1 401	1 453	626
55 à 59 ans	1 090 236	37 563	30 522	100 486	152 666	1 176	1 060	471
60 à 64 ans	919 211	31 171	24 812	78 737	126 297	820	603	327
65 à 69 ans	693 815	23 443	19 860	56 993	94 579	433	392	208
70 à 74 ans	562 278	19 370	17 634	45 899	75 851	314	248	101
75 à 79 ans	497 796	18 102	16 431	40 183	65 728	229	189	72
80 à 84 ans	398 669	15 713	14 126	30 878	53 352	121	137	29
85 à 89 ans	256 698	11 222	9 996	20 253	36 007	68	76	11
90 ans et plus	141 876	6 677	6 621	11 615	19 901	46	33	11

1. Ces estimations postcensitaires, établies à partir des données du recensement de 2006, sont ajustées pour le sous-dénombrement net et incluent les résidents non-permanents.

2. En 2008, la population âgée de "moins d'un an" et "1 à 4 ans" a été ajustée avec les données des naissances de 2008 de la Division de la statistique de la santé, Statistique Canada.

Source(s) : Statistique Canada, Division de la démographie (tableau CANSIM 051-0001 diffusé le 29 septembre 2010) et Division de la statistique de la santé.